Matemàtiques I

1r de Batxillerat

TEMA 3

Equacions i inequacions

Jordi Irazuzta jordi.irazuzta@inselspallaresos.cat

Ignasi Irazuzta iirazuzta@insdespuig.cat

Apunts de teoria

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Ets lliure de compartir i adaptar aquest material, sempre que en reconeguis l'autoria, no en facis un ús comercial i el distribueixis amb la mateixa llicència.

Índex

3 Equacions i inequacions **1**

3.1 Equacions polinòmiques . . . 1

3.1.1 Definicions i conceptes bàsics . . . 1

3.1.2 Equacions de primer i segon grau . . . 2

3.1.3 Equacions de segon grau incompletes . . . 3

3.1.4 Equacions de grau superior . . . 4

3.1.5 Taula resum . . . 6

3.2 Equacions racionals i irracionals . . . 6

3.2.1 Equacions racionals . . . 6

3.2.2 Equacions irracionals . . . 8

3.2.3 Taula resum . . . 10

3.3 Equacions exponencials i logarítmiques . . . 10

3.3.1 Equacions exponencials . . . 10

3.3.2 Equacions logarítmiques . . . 12

3.3.3 Taula resum . . . 14

3.4 Sistemes d'equacions . . . 14

3.4.1 Equacions amb més d'una incògnita . . . 14

3.4.2 Sistemes d'equacions . . . 15

3.4.3 Mètodes de resolució . . . 16

3.4.4 Exemples . . . 17

3.4.5 Taula resum . . . 22

3.5 Inequacions . . . 23

3.5.1 Què és una inequació . . . 23

3.5.2 Inequacions de primer grau . . . 23

3.5.3 Inequacions de segon grau . . . 26

3.5.4 Cas general: dos punts de tall . . . 27

3.5.5 Cas sense punts de tall . . . 32

3.5.6 Cas tangent a l'eix OX . . . 34

3.5.7 Taula resum . . . 36

3.6 Nota històrica . . . 37

TEMA 3

Equacions i inequacions

En aquest tema posem en pràctica tot el que hem après sobre nombres, potències, arrels i logaritmes per resoldre **equacions**: igualtats on hem de trobar els valors que les fan certes. Repassarem les equacions polinòmiques (de primer grau, segon grau, biquadrades i de grau superior), les racionals i irracionals, i les exponencials i logarítmiques. Després resoldrem **sistemes d'equacions** no lineals i **inequacions** de primer i de segon grau, on les solucions ja no són valors aïllats sinó intervals.

El mètode de resolució canvia segons el tipus d'equació, però la idea de fons és sempre la mateixa: transformar l'equació en una forma que ja sabem resoldre, i comprovar sempre les solucions obtingudes a l'equació original.

3.1 Equacions polinòmiques

3.1.1 Definicions i conceptes bàsics

Segurament ja has resolt moltes equacions abans. Comencem posant nom, de manera formal, al que és una equació i a la seva solució.

Definició: equació i incògnita

Sigui $f(x)$ una expressió algebraica. Una **equació** amb una incògnita és una igualtat que, amb les transformacions que calguin, es pot escriure de la forma

$$f(x) = 0.$$

x s'anomena la **incògnita** de l'equació.

Exemple: Equacions

Són exemples d'equacions:

$$x - 3 = 0, \qquad 5x - 5 = x + 7.$$

En el segon cas, la podem transformar:

$$5x - 5 - x - 7 = 0 \quad \Rightarrow \quad 4x - 12 = 0,$$

de manera que obtenim una expressió com la de la definició anterior.

Definició: solució i equivalència

Direm que un valor real a és una **solució** de l'equació $f(x) = 0$ si es compleix que

$$f(a) = 0.$$

Si dues equacions tenen les mateixes solucions, direm que són **equivalents**.

Exemple: Comprovació de solucions

Si prenem les equacions de l'exemple anterior, en tots els casos $a = 3$ n'és una solució:

$$x - 3 = 0 \longrightarrow 3 - 3 = 0,$$

$$5x - 5 = x + 7 \longrightarrow 5 \cdot 3 - 5 = 10 = 3 + 7,$$

$$4 \cdot 3 - 12 = 0.$$

Com que en tots els casos es tracta d'equacions de primer grau (que tenen una única solució), podem assegurar que les tres són equivalents.

3.1.2 Equacions de primer i segon grau

Definició: equació polinòmica

Una equació $p(x) = 0$ és **polinòmica** si $p(x)$ és un polinomi. Parlarem aleshores del **grau de l'equació**, que coincideix amb el grau del polinomi.

Exemple: Equacions de primer grau

Una equació de primer grau es pot escriure de forma equivalent com

$$ax + b = 0, \qquad a \neq 0.$$

Té una única solució, que es pot escriure de manera general com

$$x = -\frac{b}{a}.$$

Fixa't en el cas especial en què $a = 0$ després de simplificar:

$$2x - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow 2x - 3 = 2x - 2 \Rightarrow -1 = 0.$$

No existeix cap valor real que compleixi aquesta igualtat: l'equació no té solució.

Exemple: Equacions de segon grau

Una equació de segon grau es pot escriure com

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0.$$

Les solucions venen donades per la fórmula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

on $\Delta = b^2 - 4ac$ s'anomena **discriminant**. Segons el seu signe distingim tres casos:

- $\Delta > 0$: dues solucions reals diferents.
- $\Delta = 0$: una solució real (doble).
- $\Delta < 0$: cap solució real.

Per exemple, a $4x^2 + 4x + 1 = 0$ el discriminant és $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 0$:

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{0}}{8} = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2} \quad \text{(solució doble)}.$$

3.1.3 Equacions de segon grau incompletes

Una equació de segon grau $ax^2 + bx + c = 0$ és **incompleta** quan li falta el terme de primer grau ($b = 0$) o el terme independent ($c = 0$). En aquests casos no cal la fórmula: les podem resoldre de manera més ràpida.

Cas 1: falta el terme de primer grau (b = 0)

L'equació és de la forma $ax^2 + c = 0$. Aïllem x^2 i fem l'arrel quadrada, recordant que hi ha dos signes:

$$ax^2 + c = 0 \;\Rightarrow\; x^2 = -\frac{c}{a} \;\Rightarrow\; x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Si $-\dfrac{c}{a} > 0$, hi ha dues solucions oposades. Si $-\dfrac{c}{a} < 0$, l'equació no té solució, perquè un quadrat no pot ser negatiu.

Exemple: Equació incompleta sense terme de primer grau

Resolem $2x^2 - 18 = 0$:

$$2x^2 = 18 \;\Rightarrow\; x^2 = 9 \;\Rightarrow\; x = \pm\sqrt{9} = \pm 3.$$

Les solucions són $x_1 = 3$ i $x_2 = -3$.

En canvi, l'equació $x^2 + 4 = 0$ no té solució: ens quedaria $x^2 = -4$, i cap nombre real elevat al quadrat dona un resultat negatiu.

Cas 2: falta el terme independent (c = 0)

L'equació és de la forma $ax^2 + bx = 0$. Traiem factor comú x i fem servir que un producte val zero si i només si algun dels factors val zero:

$$ax^2 + bx = 0 \;\Rightarrow\; x(ax + b) = 0 \;\Rightarrow\; x = 0 \quad \text{o} \quad x = -\frac{b}{a}.$$

Sempre hi ha dues solucions, i una d'elles és $x = 0$.

Exemple: Equació incompleta sense terme independent

Resolem $3x^2 - 12x = 0$. Traiem factor comú $3x$:

$$3x^2 - 12x = 0 \;\Rightarrow\; 3x(x - 4) = 0.$$

- $3x = 0 \;\Rightarrow\; x = 0$
- $x - 4 = 0 \;\Rightarrow\; x = 4$

Les solucions són $x_1 = 0$ i $x_2 = 4$.

Compte: no dividim per x

Seria un error passar de $3x^2 = 12x$ a $3x = 12$ dividint per x: obtindríem només $x = 4$ i perdríem la solució $x = 0$. Per això sempre traiem factor comú.

3.1.4 Equacions de grau superior

Per a graus més grans que 2, sovint cal reduir l'equació a una que ja sabem resoldre.

Exemple: Equacions biquadrades

Una **equació biquadrada** és una equació de grau 4 de la forma

$$ax^4 + bx^2 + c = 0.$$

Per resoldre-la, fem el canvi de variable $t = x^2$. Resolem $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$:

1. Fem el canvi $t = x^2$. L'equació es transforma en

$$t^2 - 10t + 9 = 0.$$

2. Resolem l'equació de segon grau per a t:

$$t = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 36}}{2} = \frac{10 \pm 8}{2}.$$

   Obtenim $t_1 = 9$ i $t_2 = 1$.
3. Desfem el canvi de variable per a cada t (recordant que $x = \pm\sqrt{t}$):
   - $t_1 = 9 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt{9} \Rightarrow x = \pm 3$
   - $t_2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm\sqrt{1} \Rightarrow x = \pm 1$

Per tant, les solucions de l'equació són $x_1 = 3$, $x_2 = -3$, $x_3 = 1$ i $x_4 = -1$.

Exemple: Equacions de grau superior a 2

Per a una equació $P(x) = 0$ amb $\text{grau}(P) \geq 3$, el mètode habitual és factoritzar el polinomi, ja que les solucions de l'equació són les arrels del polinomi.

Resolem $x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = 0$:

1. Busquem arrels enteres (divisors de 27) i apliquem Ruffini. Provem $x = 3$:

	1	−3	−9	27
3		3	0	−27
	1	0	−9	0

2. El polinomi es factoritza com $(x - 3)(x^2 - 9) = 0$.
3. Resolem l'equació de segon grau $x^2 - 9 = 0$, que dona $x = \pm\sqrt{9}$, és a dir, $x = 3$ i $x = -3$.
4. Les solucions són totes les arrels trobades:

$$x = -3 \text{ (simple)} \qquad \text{i} \qquad x = 3 \text{ (doble)}.$$

3.1.5 Taula resum

Tipus	Forma	Solucions
Primer grau	$ax + b = 0,\ a \neq 0$	$x = -\frac{b}{a}$
Segon grau	$ax^2 + bx + c = 0,\ a \neq 0$	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
Segon grau incompleta $(b = 0)$	$ax^2 + c = 0$	$x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$, si $-\frac{c}{a} \geq 0$
Segon grau incompleta $(c = 0)$	$ax^2 + bx = 0$	$x(ax + b) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = -\frac{b}{a}$
Biquadrada	$ax^4 + bx^2 + c = 0$	Canvi $t = x^2$, i després $x = \pm\sqrt{t}$
Grau ≥ 3	$P(x) = 0$	Factoritzar $P(x)$ (per exemple, amb Ruffini)

3.2 Equacions racionals i irracionals

3.2.1 Equacions racionals

Una equació racional és aquella que involucra fraccions algebraiques.

Definició: equació racional

Direm que una equació és **racional** si es pot escriure, amb les transformacions que calguin, com

$$F(x) = 0,$$

on $F(x)$ és una fracció algebraica. Una manera alternativa d'escriure-la és

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0,$$

on $P(x)$ i $Q(x)$ són polinomis.

Les solucions d'aquestes equacions són els valors reals a que anul·len el numerador $(P(a) = 0)$ però que, alhora, **no** anul·len el denominador $(Q(a) \neq 0)$.

Comprovar el domini

El pas més important en una equació racional és comprovar les solucions.

Qualsevol valor a que faci $Q(a) = 0$ (que anul·li el denominador) **no pot ser solució**, encara que també anul·li el numerador.

Exemple: Resolució d'una equació racional (Cas 1)

Resolem l'equació:

$$\frac{x^2-1}{x-1}=1.$$

1. Transformem l'equació a la forma $\dfrac{P(x)}{Q(x)}=0$:

$$\frac{x^2-1}{x-1}-1=0 \;\Rightarrow\; \frac{(x^2-1)-(x-1)}{x-1}=0,$$

$$\frac{x^2-x}{x-1}=0.$$

2. Resolem l'equació del numerador, $P(x)=0$:

$$x^2-x=0 \;\Rightarrow\; x(x-1)=0.$$

   Les solucions candidates són $x=0$ i $x=1$.

3. Comprovem les solucions al denominador $Q(x)=x-1$:

   - $x=0 \Rightarrow Q(0)=0-1=-1\neq 0$. Per tant, $x=0$ **és solució**.
   - $x=1 \Rightarrow Q(1)=1-1=0$. Com que anul·la el denominador, $x=1$ **no és solució**.

L'única solució de l'equació és $x=0$.

Exemple: Resolució d'una equació racional (Cas 2)

Resolem l'equació:

$$\frac{x+1}{x-1} - \frac{4}{x^2-1} = 0.$$

1. Operem per obtenir una única fracció (recordem que $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$):

$$\frac{(x+1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{4}{x^2-1} = 0,$$

$$\frac{(x+1)^2 - 4}{x^2-1} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{x^2+2x+1-4}{x^2-1} = 0,$$

$$\frac{x^2+2x-3}{x^2-1} = 0.$$

2. Resolem $P(x) = 0$: $x^2 + 2x - 3 = 0$. Obtenim les solucions $x_1 = 1$ i $x_2 = -3$.
3. Comprovem les solucions al denominador $Q(x) = x^2 - 1$:
   - $x_1 = 1 \Rightarrow Q(1) = 1^2 - 1 = 0$. Com que anul·la el denominador, **no és solució**.
   - $x_2 = -3 \Rightarrow Q(-3) = (-3)^2 - 1 = 8 \neq 0$. Per tant, $x = -3$ **és solució**.

L'única solució de l'equació és $x = -3$.

3.2.2 Equacions irracionals

Definició: equació irracional

Direm que una equació és **irracional** si conté la incògnita sota, almenys, un signe radical. És a dir, si la incògnita està dins d'alguna arrel.

El mètode general per resoldre aquestes equacions és aïllar l'arrel (o una de les arrels) i elevar els dos membres de la igualtat al quadrat (o a l'índex de l'arrel) per eliminar el radical.

Solucions falses

Elevar al quadrat els dos membres d'una igualtat **no és una operació equivalent**:

$$A = B \;\Rightarrow\; A^2 = B^2, \qquad \text{però} \qquad A^2 = B^2 \;\Rightarrow\; A = \pm B.$$

Aquest procés pot introduir solucions que no són vàlides (anomenades *solucions falses*). Per això és **obligatori comprovar** totes les solucions candidates a l'equació *original*.

Exemple: Equació irracional amb solució vàlida

Resolem l'equació:

$$x + \sqrt{x^2 + 5} = 1.$$

1. Aïllem l'arrel a un costat de la igualtat:

$$\sqrt{x^2 + 5} = 1 - x.$$

2. Elevem els dos membres al quadrat:

$$\left(\sqrt{x^2 + 5}\right)^2 = (1 - x)^2,$$

$$x^2 + 5 = 1 - 2x + x^2.$$

3. Resolem l'equació resultant (que ja no és irracional):

$$5 = 1 - 2x \;\Rightarrow\; 2x = 1 - 5 \;\Rightarrow\; 2x = -4.$$

   La solució candidata és $x = -2$.

4. **Comprovació (obligatòria).** Substituïm $x = -2$ a l'equació *original*:

$$-2 + \sqrt{(-2)^2 + 5} = -2 + \sqrt{4 + 5} = -2 + \sqrt{9} = -2 + 3 = 1.$$

   Com que $1 = 1$, la solució $x = -2$ **és vàlida**.

Exemple: Equació irracional amb solució falsa

Resolem una petita modificació de l'equació anterior:

$$x - \sqrt{x^2+5} = 1.$$

1. Aïllem l'arrel:

$$-\sqrt{x^2+5} = 1 - x.$$

2. Elevem els dos membres al quadrat:

$$\left(-\sqrt{x^2+5}\right)^2 = (1-x)^2,$$

$$x^2 + 5 = 1 - 2x + x^2.$$

3. Resolem l'equació resultant (fixa't que és la mateixa que a l'exemple anterior):

$$5 = 1 - 2x \;\Rightarrow\; 2x = -4.$$

   La solució candidata és $x = -2$.

4. **Comprovació (obligatòria).** Substituïm $x = -2$ a l'equació *original*:

$$-2 - \sqrt{(-2)^2+5} = -2 - \sqrt{4+5} = -2 - \sqrt{9} = -2 - 3 = -5.$$

   Com que $-5 \neq 1$, la solució $x = -2$ **no és vàlida** (és una solució falsa). L'equació no té cap solució real.

3.2.3 Taula resum

Tipus	Forma	Mètode
Racional	$\dfrac{P(x)}{Q(x)} = 0$	Resoldre $P(x) = 0$ i descartar les solucions amb $Q(x) = 0$
Irracional	Incògnita sota un radical	Aïllar l'arrel, elevar-la a l'índex, i comprovar-ho sempre a l'equació original

3.3 Equacions exponencials i logarítmiques

3.3.1 Equacions exponencials

Definició: equació exponencial

Una equació és **exponencial** si apareix alguna potència amb la incògnita a l'exponent.

Per a aquestes equacions, com amb les irracionals, no hi ha una única estratègia de resolució. El resultat que farem servir, en general, és la propietat d'igualació de potències.

Propietat: igualació de potències

Si $a > 0$ i $a \neq 1$, aleshores

$$a^n = a^m \Leftrightarrow n = m.$$

A més, cal tenir presents les propietats de les potències (com $a^{n+m} = a^n \cdot a^m$) per transformar les expressions algebraiques que apareixen a l'equació.

Exemple: Extracció de factor comú

Resolem l'equació $3^{x+1} + 3^{x+2} = 36$.

1. Descomposem les potències usant les propietats:

$$3^x \cdot 3^1 + 3^x \cdot 3^2 = 36.$$

2. Traiem factor comú 3^x:

$$3^x(3 + 9) = 36.$$

3. Resolem l'equació per a 3^x:

$$3^x \cdot 12 = 36 \Rightarrow 3^x = \frac{36}{12} = 3.$$

4. Apliquem la propietat d'igualació (ja que $3 = 3^1$):

$$3^x = 3^1 \Rightarrow x = 1.$$

En algunes ocasions no és possible igualar les bases. En aquests casos, cal aplicar la definició de logaritme per aïllar l'exponent.

Exemple: Resolució aplicant logaritmes

Resolem l'equació $2^{x+2} = 5$.

1. Com que 5 no és una potència clara de 2, apliquem la definició de logaritme ($\log_a B = C \Leftrightarrow a^C = B$):

$$x + 2 = \log_2 5.$$

2. Aïllem x:

$$x = -2 + \log_2 5.$$

3. (*Opcional*) Càlcul i comprovació numèrica:

$$x \simeq -2 + 2{,}3219 \simeq 0{,}3219.$$

   Si substituïm a l'equació original:

$$2^{0{,}3219+2} = 2^{2{,}3219} \simeq 4{,}9999\ldots \approx 5.$$

La solució és $x = -2 + \log_2 5$.

3.3.2 Equacions logarítmiques

Definició: equació logarítmica

De forma semblant a les equacions exponencials, direm que una equació és **logarítmica** quan la incògnita apareix dins d'algun logaritme, ja sigui a la base o a l'argument.

Comprovar les solucions

L'argument d'un logaritme **sempre ha de ser positiu**.

És **obligatori comprovar** totes les solucions obtingudes sobre l'equació *inicial*, i descartar aquelles que facin que un argument sigui zero o negatiu.

Com abans, caldrà tenir en compte les propietats dels logaritmes per transformar l'equació en una expressió del tipus $\log_b M = \log_b N$. En aquest cas, podrem afirmar que $M = N$.

Exemple: Agrupant termes

Resolem $\log x - \log 4 = \log(x-2)$.

1. Apliquem la propietat de la resta de logaritmes:
$$\log \frac{x}{4} = \log(x-2).$$
2. Tenim una igualtat de logaritmes de la mateixa base, així que igualem els arguments:
$$\frac{x}{4} = x - 2.$$
3. Resolem l'equació de primer grau resultant:
$$x = 4(x-2) \;\Rightarrow\; x = 4x - 8,$$
$$3x = 8 \;\Rightarrow\; x = \frac{8}{3}.$$
4. **Comprovació.** Verifiquem que tots els arguments de l'equació original són positius:
   - $\log x \Rightarrow \log \frac{8}{3}$. Vàlid, $\frac{8}{3} > 0$.
   - $\log(x-2) \Rightarrow \log\left(\frac{8}{3} - 2\right) = \log \frac{2}{3}$. Vàlid, $\frac{2}{3} > 0$.

Com que tots els arguments són positius, la solució $x = \frac{8}{3}$ **és vàlida**.

Exemple: Llei de Hicks-Hyman

La llei de Hicks-Hyman descriu el temps de reacció (T) en funció del nombre d'opcions (n):

$$T = a + b \cdot \log_2 n,$$

on a i b són constants.

Suposem $a = 0{,}6\,\text{s}$ i $b = 0{,}1\,\text{s}$. Volem saber quantes opcions n calen per a un temps de reacció de $T = 0{,}8\,\text{s}$.

1. Substituïm els valors coneguts a l'equació:

$$0{,}8 = 0{,}6 + 0{,}1 \cdot \log_2 n.$$

2. Aïllem el logaritme:

$$0{,}8 - 0{,}6 = 0{,}1 \cdot \log_2 n \;\Rightarrow\; 0{,}2 = 0{,}1 \cdot \log_2 n,$$

$$\frac{0{,}2}{0{,}1} = \log_2 n \;\Rightarrow\; 2 = \log_2 n.$$

3. Apliquem la definició de logaritme $(\log_a B = C \Leftrightarrow a^C = B)$:

$$n = 2^2 = 4.$$

Per tant, per tenir un temps de reacció mitjà de 0,8 segons calen 4 opcions.

3.3.3 Taula resum

Tipus	Propietat clau	Fórmula
Exponencial (bases iguals)	Igualació de potències	$a^n = a^m \Leftrightarrow n = m$
Exponencial (bases diferents)	Definició de logaritme	$a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$
Logarítmica	Igualació d'arguments	$\log_a M = \log_a N \Leftrightarrow M = N$

3.4 Sistemes d'equacions

3.4.1 Equacions amb més d'una incògnita

Fins ara hem resolt equacions amb una sola incògnita, x. Però una equació pot tenir més d'una incògnita, com ara

$$x + y = 5, \qquad x^2 + y^2 = 25, \qquad xy = 6.$$

Definició: solució d'una equació amb diverses incògnites

Una **solució** d'una equació amb diverses incògnites és un conjunt de valors, **un per a cada incògnita**, que fan certa la igualtat.

Quan les incògnites són x i y, escrivim una solució com el parell (x, y), amb el valor de x primer i el de y després.

Exemple: l'equació $x + y = 5$

El parell $(2, 3)$ és solució, perquè $2 + 3 = 5$. També ho són $(0, 5)$, $(-1, 6)$ o $\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right)$.

De fet, triem el valor de x que triem, n'hi ha prou de prendre $y = 5 - x$ per obtenir una solució. Per tant, l'equació té **infinites solucions**.

En general, una equació amb dues o més incògnites té infinites solucions. Hi ha excepcions: per exemple, $x^2 + y^2 = 0$ només té la solució $(0, 0)$, i $x^2 + y^2 = -1$ no en té cap, perquè una suma de quadrats no pot ser negativa.

3.4.2 Sistemes d'equacions

Definició: sistema d'equacions

Un **sistema d'equacions** és un conjunt d'equacions amb les mateixes incògnites, de les quals busquem les solucions comunes.

Una **solució del sistema** és un conjunt de valors que és solució de **totes** les equacions alhora. **Resoldre** el sistema vol dir trobar totes les seves solucions o bé veure que no en té cap.

Per exemple, el parell $(4, 3)$ és solució del sistema

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$$

perquè compleix les dues equacions. Substituïm $x = 4$ i $y = 3$ a cada una:

$$\begin{aligned} &\text{1a equació: } 4 - 3 = 1 \\ &\text{2a equació: } 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \end{aligned}$$

En canvi, el parell $(3, 4)$ compleix la segona equació, però no la primera:

$$\begin{aligned} &\text{1a equació: } 3 - 4 = -1 \neq 1 \\ &\text{2a equació: } 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \end{aligned}$$

Per tant, $(3, 4)$ no és solució del sistema.

Ja coneixeu els **sistemes lineals**, en què totes les equacions són de primer grau, de dues equacions amb dues incògnites o de tres equacions amb tres incògnites. Ara treballarem amb **sistemes no lineals**: sistemes en què alguna de les equacions no és de primer grau.

Exemple: sistemes no lineals

En aquests sistemes hi apareixen quadrats, productes d'incògnites, fraccions, arrels, potències o logaritmes:

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases} \qquad \begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ \sqrt{x + y} + y = 7 \end{cases} \qquad \begin{cases} \log x + \log y = 2 \\ x - y = 15 \end{cases}$$

Tantes equacions com incògnites

Treballarem amb sistemes que tenen **tantes equacions com incògnites**, sobretot de dues equacions amb dues incògnites.

Una sola equació amb dues incògnites sol tenir infinites solucions. Quan n'hi afegim una segona, les solucions han de complir totes dues equacions alhora, i això en redueix molt el nombre: els sistemes que veurem tenen **un nombre finit de solucions** (una, dues, quatre...) o **cap**. Només hi ha infinites solucions en casos especials, per exemple quan una equació és equivalent a l'altra, com a $x + y = 2$ i $2x + 2y = 4$ (la segona és la primera multiplicada per 2). En aquests casos és com si només tinguéssim una equació, i per això torna a haver-hi infinites solucions.

3.4.3 Mètodes de resolució

Els sistemes no lineals es resolen amb els mateixos mètodes que els lineals. Nosaltres farem servir la **substitució** i la **igualació**. La idea és sempre la mateixa: obtenir una **equació amb una sola incògnita**, que ja sabem resoldre.

Mètode de substitució

1. Aïllem una incògnita en una de les equacions (la que sigui més senzilla).
2. Substituïm l'expressió obtinguda a l'altra equació, que queda amb una sola incògnita.
3. Resolem aquesta equació.
4. Per a cada valor trobat, calculem l'altra incògnita amb l'expressió del pas 1.

Mètode d'igualació

1. Aïllem la mateixa incògnita a les dues equacions.
2. Igualem les dues expressions: obtenim una equació amb una sola incògnita.
3. Resolem aquesta equació.
4. Per a cada valor trobat, calculem l'altra incògnita amb qualsevol de les dues expressions.

Parells de solucions i comprovació

- Cada valor d'una incògnita dona el seu valor de l'altra: les solucions s'escriuen per **parells** (x, y), i no es poden barrejar els valors d'un parell amb els d'un altre.
- Si en el procés elevem al quadrat, multipliquem per una expressió amb incògnites o fem servir logaritmes, poden aparèixer solucions falses. Cal **comprovar** les solucions al sistema original, igual que fèiem amb les equacions.

3.4.4 Exemples

Exemple 1: equació de segon grau (substitució)

Resolem el sistema

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$$

1. Aïllem y a la primera equació: $y = x - 1$.
2. Substituïm a la segona equació i resolem:

$$\begin{aligned} x^2 + (x-1)^2 &= 25 \\ x^2 + x^2 - 2x + 1 &= 25 \\ 2x^2 - 2x - 24 &= 0 \\ x^2 - x - 12 &= 0 \end{aligned}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+48}}{2} = \frac{1 \pm 7}{2}$$
$$\Rightarrow \; x_1 = 4, \quad x_2 = -3$$

3. Calculem $y = x - 1$ per a cada valor:
   - $x_1 = 4 \;\Rightarrow\; y_1 = 3$
   - $x_2 = -3 \;\Rightarrow\; y_2 = -4$

El sistema té dues solucions: $(4, 3)$ i $(-3, -4)$.

Exemple 2: una paràbola i una recta (igualació)

Resolem el sistema

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

1. Les dues equacions ja tenen y aïllada. Igualem les dues expressions:

$$x^2 - 4x + 3 = x - 1$$
$$x^2 - 5x + 4 = 0$$
$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2}$$
$$\Rightarrow \; x_1 = 4, \quad x_2 = 1$$

2. Calculem $y = x - 1$ per a cada valor:

   - $x_1 = 4 \;\Rightarrow\; y_1 = 3$
   - $x_2 = 1 \;\Rightarrow\; y_2 = 0$

El sistema té dues solucions: $(4, 3)$ i $(1, 0)$.

Gràficament, la primera equació és una paràbola i la segona una recta, i les solucions del sistema són els seus **punts de tall**, $(1, 0)$ i $(4, 3)$. Ho pots veure al Laboratori d'equacions escrivint $x^2 - 4x + 3$ i $x - 1$ als dos membres: les abscisses dels punts de tall són les solucions de $x^2 - 4x + 3 = x - 1$.

Exemple 3: un producte d'incògnites i una biquadrada (substitució)

Resolem el sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6 \end{cases}$$

1. Aïllem y a la segona equació: $y = \dfrac{6}{x}$. Podem dividir per x perquè $x \neq 0$: si fos $x = 0$, la segona equació diria $0 = 6$.
2. Substituïm a la primera equació i multipliquem per x^2:

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{36}{x^2} &= 13 \\ x^4 + 36 &= 13x^2 \\ x^4 - 13x^2 + 36 &= 0 \end{aligned}$$

   És una equació biquadrada. Amb el canvi $t = x^2$:

$$\begin{aligned} t^2 - 13t + 36 = 0 \;\Rightarrow\; t &= \frac{13 \pm 5}{2} \\ \Rightarrow\; t_1 = 9, \quad t_2 &= 4 \end{aligned}$$

   i, desfent el canvi, $x = \pm 3$ i $x = \pm 2$.
3. Calculem $y = \dfrac{6}{x}$ per a cada valor:
   - $x = 3 \Rightarrow y = 2, \quad x = -3 \Rightarrow y = -2$
   - $x = 2 \Rightarrow y = 3, \quad x = -2 \Rightarrow y = -3$

El sistema té quatre solucions: $(3, 2)$, $(-3, -2)$, $(2, 3)$ i $(-2, -3)$.

Exemple 4: una equació irracional (substitució)

Resolem el sistema

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ \sqrt{x+y} + y = 7 \end{cases}$$

1. Aïllem x a la primera equació: $x = y + 1$.
2. Substituïm a la segona equació. Aïllem l'arrel i elevem al quadrat:

$$\begin{aligned} \sqrt{2y+1} + y &= 7 \\ \sqrt{2y+1} &= 7 - y \\ 2y + 1 &= 49 - 14y + y^2 \\ y^2 - 16y + 48 &= 0 \end{aligned}$$

$$y = \frac{16 \pm \sqrt{256 - 192}}{2} = \frac{16 \pm 8}{2}$$
$$\Rightarrow \; y_1 = 12, \quad y_2 = 4$$

3. Calculem $x = y + 1$: obtenim els parells $(13, 12)$ i $(5, 4)$.
4. **Comprovació.** Hem elevat al quadrat, així que comprovem les dues candidates a la segona equació, $\sqrt{x+y} + y = 7$ (la primera es compleix sempre, perquè hem calculat $x = y + 1$):

$$(13, 12)\text{: } \sqrt{13+12} + 12 = 5 + 12 = 17 \neq 7$$
$$(5, 4)\text{: } \sqrt{5+4} + 4 = 3 + 4 = 7$$

   El parell $(13, 12)$ és una solució falsa, que ha aparegut en elevar al quadrat. El parell $(5, 4)$ sí que és solució.

El sistema té una única solució: $(5, 4)$.

Exemple 5: equacions exponencials

Resolem el sistema

$$\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 32 \\ 3^x = 3 \cdot 3^y \end{cases}$$

1. Transformem cada equació amb les propietats de les potències i la igualació de potències:

$$\begin{aligned} 2^x \cdot 2^y = 2^{x+y} = 2^5 &\Rightarrow x + y = 5 \\ 3^x = 3^{1+y} &\Rightarrow x = 1 + y \end{aligned}$$

2. Ens queda un sistema lineal. Substituïm $x = 1 + y$ a la primera equació:

$$1 + y + y = 5 \Rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = 2$$

   i, per tant, $x = 1 + 2 = 3$.

El sistema té una única solució: $(3, 2)$.

Exemple 6: equacions logarítmiques (substitució)

Resolem el sistema

$$\begin{cases} \log x + \log y = 2 \\ x - y = 15 \end{cases}$$

1. A la primera equació apliquem la propietat del producte i la definició de logaritme:

$$\log(xy) = 2 \;\Rightarrow\; xy = 10^2 = 100$$

2. Aïllem x a la segona equació, $x = y + 15$, i substituïm:

$$\begin{aligned} (y+15)\,y &= 100 \\ y^2 + 15y - 100 &= 0 \\ y &= \frac{-15 \pm \sqrt{225+400}}{2} \\ &= \frac{-15 \pm 25}{2} \\ &\Rightarrow\; y_1 = 5, \quad y_2 = -20 \end{aligned}$$

3. Calculem $x = y + 15$: obtenim els parells $(20, 5)$ i $(-5, -20)$.
4. **Comprovació.** Els arguments dels logaritmes han de ser positius. Substituïm cada parell a la primera equació, $\log x + \log y = 2$:

$$\begin{aligned} (20,5)&\text{: } \log 20 + \log 5 = \log 100 = 2 \\ (-5,-20)&\text{: } \log(-5) \text{ no existeix} \end{aligned}$$

   El parell $(20, 5)$ és solució (també compleix $20 - 5 = 15$). El parell $(-5, -20)$ no ho és.

El sistema té una única solució: $(20, 5)$.

3.4.5 Taula resum

Mètode	Com es fa	Quan és útil
Substitució	S'aïlla una incògnita en una equació i se substitueix a l'altra	Quan una incògnita és fàcil d'aïllar (equacions de primer grau, $xy = k$...)
Igualació	S'aïlla la mateixa incògnita a les dues equacions i s'igualen	Quan la mateixa incògnita ja és aïllada, o és fàcil d'aïllar, a les dues equacions
En tots dos casos	S'obté una equació amb una incògnita; es calculen els parells (x, y)	Cal comprovar les solucions si s'ha elevat al quadrat, s'ha multiplicat per una expressió amb incògnites o hi ha logaritmes

3.5 Inequacions

3.5.1 Què és una inequació

Definició: inequació

Una **inequació** és una desigualtat entre dues expressions algebraiques en què apareix una incògnita. Fem servir els signes $<$, $\leq$, $>$ i $\geq$.

Una **solució** d'una inequació és un valor de la incògnita que fa certa la desigualtat. **Resoldre** la inequació vol dir trobar **totes** les solucions.

Exemple: la inequació $2x + 1 > 7$

Provem alguns valors:

$$\begin{aligned} x = 5: &\quad 2 \cdot 5 + 1 = 11 > 7 \quad \text{(és solució)} \\ x = 3: &\quad 2 \cdot 3 + 1 = 7 \not> 7 \quad \text{(no és solució)} \\ x = 1: &\quad 2 \cdot 1 + 1 = 3 \not> 7 \quad \text{(no és solució)} \end{aligned}$$

De fet, són solució **tots** els nombres més grans que 3. La inequació té infinites solucions, que escrivim amb un interval: $(3, +\infty)$.

A diferència de les equacions, que normalment tenen un nombre finit de solucions, les inequacions solen tenir-ne infinites. Per això les escrivim amb intervals o unions d'intervals. Recordem que:

- Amb $<$ o $>$, l'extrem **no** hi és inclòs i fem servir un parèntesi: $x < 4 \Rightarrow (-\infty, 4)$.
- Amb $\leq$ o $\geq$, l'extrem **sí** que hi és inclòs i fem servir un claudàtor: $x \leq 4 \Rightarrow (-\infty, 4]$.
- Per als extrems $-\infty$ i $+\infty$ sempre fem servir parèntesis.

3.5.2 Inequacions de primer grau

Les inequacions de primer grau es resolen com les equacions de primer grau: traiem parèntesis i denominadors, agrupem els termes amb x en un membre i aïllem la x. Les transformacions que podem fer són:

- **Sumar o restar** el mateix nombre o expressió als dos membres: la desigualtat **no canvia**.
- **Multiplicar o dividir** els dos membres per un nombre **positiu**: la desigualtat **no canvia**.
- **Multiplicar o dividir** els dos membres per un nombre **negatiu**: la desigualtat **canvia de sentit**.

Compte: multiplicar o dividir per un nombre negatiu

Sabem que $2 < 3$. Si multipliquem els dos nombres per -1, obtenim -2 i -3, i ara és -2 el més gran:

$$2 < 3 \quad \Rightarrow \quad -2 > -3$$

A la recta real, canviar el signe és com mirar-se en un mirall col·locat al 0: l'ordre dels nombres s'inverteix. Per això, **quan multipliquem o dividim per un nombre negatiu, hem de girar la desigualtat**: $<$ passa a ser $>$, i $\leq$ passa a ser $\geq$ (i al revés).

Exemple 1: $3x - 2 \leq 10$

Passem el -2 a l'altre membre i dividim per 3:

$$\begin{aligned} 3x - 2 &\leq 10 \\ 3x &\leq 12 \\ x &\leq \frac{12}{3} = 4 \end{aligned}$$

Hem dividit per 3, que és **positiu**, i per tant la desigualtat **no** canvia. La solució és

$$(-\infty, 4].$$

Comprovem-ho amb un valor de dins de l'interval i un de fora:

$$\begin{aligned} x = 0: &\quad 3 \cdot 0 - 2 = -2 \leq 10 \quad \text{(és solució)} \\ x = 5: &\quad 3 \cdot 5 - 2 = 13 \not\leq 10 \quad \text{(no és solució)} \end{aligned}$$

Exemple 2: $2(x-3) \leq 5x+3$

Traiem el parèntesi i agrupem:

$$\begin{aligned} 2x-6 &\leq 5x+3 \\ 2x-5x &\leq 3+6 \\ -3x &\leq 9 \end{aligned}$$

Ara hem de dividir per -3, que és **negatiu**: **girem la desigualtat**.

$$x \geq \frac{9}{-3} = -3$$

La solució és

$$[-3, +\infty).$$

Comprovem-ho amb un valor de dins de l'interval i un de fora:

$$\begin{aligned} x=0: \quad & 2(0-3) \overset{?}{\leq} 5\cdot 0+3 \\ \Rightarrow \quad & -6 \leq 3 \quad \text{(és solució)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x=-4: \quad & 2(-4-3) \overset{?}{\leq} 5(-4)+3 \\ \Rightarrow \quad & -14 \not\leq -17 \quad \text{(no és solució)} \end{aligned}$$

Per no haver de girar la desigualtat

Podem agrupar els termes amb x al membre on el coeficient queda positiu. A l'exemple 2:

$$\begin{aligned} 2x-6 &\leq 5x+3 \\ -6-3 &\leq 5x-2x \\ -9 &\leq 3x \\ -3 &\leq x \end{aligned}$$

Obtenim el mateix resultat, $x \geq -3$, sense haver dividit per cap nombre negatiu.

Una altra manera de mirar-ho


Tornem a la inequació de l'exemple 1, $3x-2 \leq 10$. Si passem el 10 a l'esquerra, obtenim la inequació equivalent

$$3x-12 \leq 0.$$

Si dibuixem la recta $y = 3x-12$, les solucions són els valors de x on la recta és **per sota** de l'eix OX o el toca:

Com llegim les gràfiques d'aquest apartat

- Tros de la gràfica que **compleix** la desigualtat.
- **Solució**, marcada sobre l'eix OX.
- Punt **ple**: l'extrem **hi és inclòs** ($\leq$ o $\geq$).
- Punt **buit**: l'extrem **no hi és inclòs** ($<$ o $>$).



Aquesta idea, mirar on la gràfica és per sobre o per sota de l'eix OX, és la que farem servir per resoldre les inequacions de segon grau.

3.5.3 Inequacions de segon grau

Una inequació és de **segon grau** quan, passant tots els termes a un membre i simplificant, la podem escriure en la **forma canònica**

$$ax^2 + bx + c < 0, \qquad a \neq 0,$$

o bé la mateixa expressió amb $\leq$, $>$ o $\geq$.

El primer pas sempre és portar la inequació a aquesta forma, deixant un 0 en un dels membres. Per exemple:

$$2x^2 \geq x + 3 \quad \Rightarrow \quad 2x^2 - x - 3 \geq 0.$$

Idea clau

La gràfica de $y = ax^2 + bx + c$ és una **paràbola**. Per tant:


- $ax^2 + bx + c > 0$ vol dir buscar on la paràbola és **per sobre** de l'eix OX.
- $ax^2 + bx + c < 0$ vol dir buscar on la paràbola és **per sota** de l'eix OX.
- Amb $\geq$ o $\leq$, també hi afegim els punts on la paràbola **talla** l'eix OX.

Per saber on és per sobre i on és per sota, en tenim prou de conèixer dues coses: la **forma** de la paràbola i els seus **punts de tall** amb l'eix OX.


La forma de la paràbola

Forma de la paràbola segons el signe de a

- Si $a > 0$, la paràbola és **còncava** $(\cup)$: és oberta cap amunt i les dues branques pugen.
- Si $a < 0$, la paràbola és **convexa** $(\cap)$: és oberta cap avall i les dues branques baixen.



$y = x^2 - 2x - 3$: $a = 1 > 0$, còncava $(\cup)$



$y = -x^2 + 2x + 3$: $a = -1 < 0$, convexa $(\cap)$

Per què depèn només de a? Quan x és molt gran (positiu o negatiu), el terme ax^2 és molt més gran que els altres i decideix el signe. Com que x^2 sempre és positiu, el signe de $ax^2 + bx + c$ per a valors grans de x és el signe de a.

Compte amb els noms

No tots els llibres fan servir el mateix conveni: n'hi ha que diuen *convexa* a la forma $\cup$ i *còncava* a la forma $\cap$. Per evitar confusions, sempre podem dir **oberta cap amunt** o **oberta cap avall**.

Els punts de tall amb l'eix OX

Els punts de tall són les solucions de l'equació $ax^2+bx+c = 0$. Depenen del signe del discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- Si $\Delta > 0$, la paràbola talla l'eix OX en **dos punts**.
- Si $\Delta < 0$, la paràbola **no talla** l'eix OX.
- Si $\Delta = 0$, la paràbola toca l'eix OX en **un sol punt**: hi és **tangent**.

Estudiem cada cas per separat.

3.5.4 Cas general: dos punts de tall

Quan $\Delta > 0$, l'equació $ax^2 + bx + c = 0$ té dues solucions, $x_1 < x_2$, i la recta real queda dividida en tres trossos.

Pas a pas


1. Portem la inequació a la **forma canònica**: $ax^2 + bx + c$ comparat amb 0.
2. Mirem el **signe de** a: si $a > 0$, la paràbola és $\cup$; si $a < 0$, és $\cap$.
3. Resolem l'equació $ax^2 + bx + c = 0$ per trobar els **punts de tall** $x_1 < x_2$.
4. Fem un **esbós** de la paràbola: talla l'eix OX a x_1 i x_2 i té la forma del pas 2.
5. Fem la **taula de signes**: amb els punts de tall dividim la recta en intervals i hi anotem el signe que llegim a l'esbós ($+$ si la paràbola és per sobre de l'eix, $-$ si és per sota i 0 als punts de tall). Si no tenim l'esbós, trobem el signe de cada interval calculant el polinomi en un valor qualsevol de dins.
6. **Llegim la solució** a la taula: per a > 0, els intervals amb $+$; per a < 0, els intervals amb $-$.
7. Decidim els **extrems**: amb $\geq$ o $\leq$, els punts de tall (amb signe 0) hi són inclosos i fem servir claudàtors; amb $>$ o $<$, no hi són inclosos i fem servir parèntesis.

Si $a > 0$ ($\cup$), la paràbola és per sota de l'eix **entre** les arrels i per sobre **fora** de les arrels. Si $a < 0$ ($\cap$), és al revés.

Exemple 1: $x^2 - x - 6 < 0$

Ja és en forma canònica. Com que $a = 1 > 0$, la paràbola és **còncava** $(\cup)$. Busquem els punts de tall:

$$x^2 - x - 6 = 0$$
$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2}$$
$$x_1 = -2, \quad x_2 = 3$$



Fem la taula de signes. Els signes es llegeixen a la gràfica; també els podem trobar amb un valor de prova a cada interval:

x	$(-\infty,-2)$	-2	$(-2,3)$	3	$(3,+\infty)$
Prova	-3		0		4
$x^2 - x - 6$	6	0	-6	0	6
Signe	$+$	0	$-$	0	$+$
< 0?	no	no	**sí**	no	no

Volem que sigui < 0: ens quedem amb l'interval amb signe $-$, **entre** les arrels. Com que la desigualtat és estricta, els punts de tall (signe 0) no hi són inclosos:

$$(-2,3)$$


Exemple 2: $2x^2 \geq x + 3$

Primer la portem a la forma canònica:

$$2x^2 - x - 3 \geq 0$$

Com que $a = 2 > 0$, la paràbola és **còncava** $(\cup)$. Busquem els punts de tall:

$$2x^2 - x - 3 = 0$$
$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{4} = \frac{1 \pm 5}{4}$$
$$x_1 = -1, \quad x_2 = \frac{3}{2}$$



Fem la taula de signes:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3/2)$	$3/2$	$(3/2, +\infty)$
Signe	$+$	0	$-$	0	$+$
≥ 0?	**sí**	**sí**	no	**sí**	**sí**

Volem que sigui ≥ 0: els intervals amb signe $+$, **fora** de les arrels, i també els punts de tall (signe 0), perquè la desigualtat inclou l'igual:

$$(-\infty, -1] \cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$$


Comprovem-ho amb un valor de dins i un de fora:

$$x = 2: \quad 2 \cdot 2^2 = 8 \geq 2 + 3 = 5 \quad \text{(és solució)}$$
$$x = 0: \quad 2 \cdot 0^2 = 0 \not\geq 0 + 3 = 3 \quad \text{(no és solució)}$$

Exemple 3: $-x^2 + 4x - 3 > 0$

Ara $a = -1 < 0$: la paràbola és **convexa** $(\cap)$. Busquem els punts de tall:

$$\begin{aligned} -x^2 + 4x - 3 &= 0 \\ x^2 - 4x + 3 &= 0 \\ x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \\ x_1 = 1, &\quad x_2 = 3 \end{aligned}$$



Fem la taula de signes. Com que la paràbola és oberta cap avall, el signe + ara és **entre** les arrels:

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1,3)$	3	$(3, +\infty)$
Signe	$-$	0	$+$	0	$-$
> 0?	no	no	**sí**	no	no

Volem que sigui > 0: l'interval amb signe +, sense els extrems:

$$(1,3)$$

Comprovem-ho: per a $x = 2$ tenim $-4 + 8 - 3 = 1 > 0$, que és solució; per a $x = 0$ tenim $-3 \not> 0$, que no ho és.

Una altra manera: fer que a sigui positiu

Si multipliquem per -1 (i **girem la desigualtat**), l'exemple 3 queda


$$-x^2 + 4x - 3 > 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 - 4x + 3 < 0,$$

que té $a > 0$. Ara busquem on la paràbola $\cup$ és per sota de l'eix, que és entre les arrels: $(1,3)$. És el mateix resultat.

Exemple 4: $x^2 > 9$ (incompleta)

La forma canònica és $x^2 - 9 > 0$, amb $a = 1 > 0$ ($\cup$). Els punts de tall són

$$x^2 - 9 = 0 \;\Rightarrow\; x^2 = 9 \;\Rightarrow\; x = \pm 3$$



Fem la taula de signes:

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 3)$	3	$(3, +\infty)$
Signe	$+$	0	$-$	0	$+$
> 0?	**sí**	no	no	no	**sí**

Volem que sigui > 0: els intervals amb signe $+$, **fora** de les arrels:

$$(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$$

Compte: és un error freqüent escriure «$x > \pm 3$». Per exemple, $x = -4$ és solució, perquè $(-4)^2 = 16 > 9$, i en canvi $x = 0$ no ho és, perquè $0^2 = 0 \not> 9$.

3.5.5 Cas sense punts de tall

Quan $\Delta < 0$, l'equació $ax^2 + bx + c = 0$ no té solució i la paràbola **no talla** l'eix OX. Per tant:

- Si $a > 0$ ($\cup$), la paràbola és **sempre per sobre** de l'eix: $ax^2 + bx + c > 0$ per a qualsevol x.
- Si $a < 0$ ($\cap$), la paràbola és **sempre per sota** de l'eix: $ax^2 + bx + c < 0$ per a qualsevol x.


La inequació, doncs, o bé es compleix per a **tots** els nombres reals, o bé **no té cap solució**.

Exemple 5: $x^2 + 2x + 3 > 0$

Com que $a = 1 > 0$, la paràbola és **còncava** $(\cup)$. Busquem els punts de tall:

$$x^2 + 2x + 3 = 0$$
$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 - 12 = -8 < 0$$

No hi ha punts de tall: la paràbola és sempre per sobre de l'eix.



Sense punts de tall, la taula té un sol interval, tota la recta:

x	$\mathbb{R}$
Signe	$+$
> 0?	**sí**

La desigualtat es compleix sempre. La solució és $\mathbb{R}$, és a dir, $(-\infty, +\infty)$.


En canvi, la inequació $x^2 + 2x + 3 \leq 0$ **no té solució**: la paràbola mai és per sota de l'eix ni el toca.

Exemple 6: $-x^2 + 2x - 5 \geq 0$

Ara $a = -1 < 0$: la paràbola és **convexa** $(\cap)$. Busquem els punts de tall:

$$\begin{aligned} -x^2 + 2x - 5 &= 0 \\ \Delta &= 2^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-5) \\ &= 4 - 20 = -16 < 0 \end{aligned}$$

No hi ha punts de tall: la paràbola és sempre per sota de l'eix.



La taula té un sol interval:

x	$\mathbb{R}$
Signe	$-$
≥ 0?	no

Mai és ≥ 0, i per tant la inequació **no té solució**. Ho escrivim $\emptyset$ (conjunt buit).

En canvi, $-x^2 + 2x - 5 < 0$ es compleix per a tots els nombres reals: la solució és $\mathbb{R}$.

3.5.6 Cas tangent a l'eix OX

Quan $\Delta = 0$, l'equació $ax^2 + bx + c = 0$ té una sola solució (doble), x_0. La paràbola **toca** l'eix OX en aquest punt, que és el vèrtex, però **no el travessa**: a banda i banda de x_0 queda sempre al mateix costat de l'eix.


Exemple 7: $x^2 - 4x + 4$ comparat amb 0

Com que $a = 1 > 0$, la paràbola és **còncava** $(\cup)$. Busquem els punts de tall:


$$x^2 - 4x + 4 = 0$$
$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 = 0$$
$$x = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{(arrel doble)}$$

De fet, $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. La paràbola toca l'eix a $x = 2$ i, a la resta de punts, és per sobre. A la taula de signes es veu que el signe **no canvia** en passar per l'arrel doble:

x	$(-\infty, 2)$	2	$(2, +\infty)$
Signe	$+$	0	$+$



$x^2 - 4x + 4 > 0$



$x^2 - 4x + 4 \leq 0$

Segons la desigualtat, obtenim quatre resultats diferents:

Inequació	**Què llegim a la taula?**	**Solució**
$x^2 - 4x + 4 > 0$	signe $+$	$\mathbb{R} \setminus \{2\}$, és a dir, $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$
$x^2 - 4x + 4 \geq 0$	signe $+$ o 0	$\mathbb{R}$
$x^2 - 4x + 4 < 0$	cap signe $-$	no té solució $(\emptyset)$
$x^2 - 4x + 4 \leq 0$	només el 0, a $x = 2$	$x = 2$

Exemple 8: $-x^2 + 6x - 9 \geq 0$

Ara $a = -1 < 0$ ($\cap$) i

$$\begin{aligned} -x^2 + 6x - 9 &= 0 \\ x^2 - 6x + 9 &= 0 \\ (x-3)^2 = 0 &\Rightarrow x = 3 \end{aligned}$$

La paràbola és per sota de l'eix i només el toca a $x = 3$:

x	$(-\infty, 3)$	3	$(3, +\infty)$
Signe	$-$	0	$-$
≥ 0?	no	**sí**	no

L'únic punt on és ≥ 0 és el de tangència, i la solució és $x = 3$.

Compte amb l'igual

En el cas tangent, el punt x_0 és solució només si la desigualtat inclou l'igual ($\geq$ o $\leq$). Amb $>$ o $<$ l'hem de treure.

3.5.7 Taula resum

Escrivim $p(x) = ax^2 + bx + c$. Per a $a > 0$ (paràbola $\cup$), amb arrels $x_1 < x_2$ quan $\Delta > 0$ i arrel doble x_0 quan $\Delta = 0$:

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$p(x) > 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$	$\mathbb{R}$
$p(x) \geq 0$	$(-\infty, x_1] \cup [x_2, +\infty)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$p(x) < 0$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	$\emptyset$
$p(x) \leq 0$	$[x_1, x_2]$	només x_0	$\emptyset$

Si $a < 0$, podem multiplicar per -1 i girar la desigualtat per tornar a aquesta taula. De tota manera, més que memoritzar la taula, és millor fer sempre un **esbós de la paràbola** i llegir-hi la solució.

I si el grau és més gran?

Per a inequacions polinòmiques de grau més gran que 2, factoritzem el polinomi i estudiem el seu signe en cada interval. Ho fem a l'apartat de càlcul de dominis.

3.6 Nota històrica

La història de la resolució d'equacions és, en essència, la història de l'àlgebra: l'esforç continu de la humanitat per trobar valors desconeguts a partir de relacions conegudes, un pilar fonamental del pensament científic i tecnològic.

Els primers intents es remunten a les civilitzacions antigues. Els **babilonis** (cap al 1800 aC) ja resolien problemes pràctics de repartiment de terres o herències que, en termes moderns, equivalen a **equacions lineals i quadràtiques**, mitjançant receptes algorítmiques, sense la notació simbòlica que fem servir avui. Els grecs, com Euclides i Diofant, van abordar aquests problemes des d'un punt de vista més geomètric.

El pas decisiu cap a l'àlgebra com a disciplina es va donar al **món arabo-islàmic medieval**. Al segle IX, el matemàtic persa **Al-Khwarizmí** (d'on prové la paraula "algoritme") va escriure el tractat *Al-Jabr* (d'on prové "àlgebra"), amb mètodes sistemàtics per resoldre equacions lineals i quadràtiques. El seu enfocament, que buscava mètodes generals, va marcar l'inici de l'àlgebra abstracta.

El següent gran salt es va produir a la **Itàlia del Renaixement** (segle XVI), amb una de les històries més dramàtiques de les matemàtiques: la resolució de les **equacions cúbiques i quàrtiques**. Matemàtics com **Tartaglia** i **Cardano** van trobar la fórmula general per a les equacions de grau 3, i **Ferrari**, alumne de Cardano, la de grau 4. Irònicament, la fórmula de la cúbica va forçar matemàtics com **Bombelli** a treballar amb arrels quadrades de nombres negatius, donant el primer impuls al naixement dels nombres complexos.

Durant segles es va buscar una fórmula similar (basada en arrels) per a les equacions de grau 5. El misteri no es va resoldre fins al segle XIX, quan **Ruffini** i, de manera concloent, **Niels Henrik Abel**, van demostrar que aquesta fórmula general no existeix. Poc després, **Évariste Galois** va desenvolupar una teoria que explicava exactament per què algunes equacions polinòmiques tenen solució per radicals i d'altres no, canviant el focus de l'àlgebra de "trobar solucions" a "entendre l'estructura".

Paral·lelament, la necessitat de simplificar càlculs complexos en astronomia i navegació va portar, al segle XVII, **John Napier** a inventar els **logaritmes**: un avenç revolucionari, ja que convertia multiplicacions i divisions (feixugues) en sumes i restes. Les **equacions exponencials** van sorgir com la relació inversa dels logaritmes, i va ser **Leonhard Euler**, al segle XVIII, qui va consolidar la relació entre les funcions exponencials, logarítmiques i trigonomètriques, donant-los la seva forma moderna.

Avui aquestes equacions són el llenguatge bàsic de la ciència: les polinòmiques descriuen trajectòries; les racionals, relacions i proporcions; les irracionals, distàncies i temps; i les exponencials i logarítmiques modelen tot allò que creix o decreix de forma proporcional a la seva mida, des de la demografia i les finances fins a la desintegració radioactiva o l'escala de pH.