

Exercicis i problemes

Llistat d'exercicis per practicar i consolidar els continguts del bloc. Segueix l'ordre dels apunts i inclou exercicis de diferents nivells de dificultat.

1. El conjunt dels nombres reals i la recta real

1. Classifica cada nombre indicant a quins conjunts pertany ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$; un nombre pot pertànyer a més d'un):

- | | |
|-------------------|------------------|
| a) -7 | b) $\frac{3}{4}$ |
| c) $\sqrt{16}$ | d) $\sqrt{5}$ |
| e) 0 | f) $2,5$ |
| g) $-\frac{9}{3}$ | h) π |

2. Digues si cada afirmació és certa o falsa, i justifica-ho breument:

- a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- b) $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
- c) Tot nombre enter és racional.
- d) $0,\overline{6}$ és irracional.

3. Ordena de més petit a més gran: -3 , $\frac{7}{2}$, $-1,5$, 4 , 0 .

4. Sense calculadora, decideix quin nombre és més gran, $\frac{2}{3}$ o $0,68$ passant-los primer tots a decimal i després tots a fracció.

5. Situa aproximadament sobre una recta real els nombres -2 , $1,5$, π i $-\sqrt{2}$ (n'hi ha prou amb dues xifres decimals d'aproximació).

2. Intervals i valor absolut

6. Escribeu en forma d'interval, classifica'l (obert, tancat, semiobert, semirecta) i representa'l sobre la recta real:

- a) Nombres reals més grans que 2 i menors o iguals que 7 .
- b) Nombres reals menors que -1 .
- c) Nombres reals més grans o iguals que 0 .
- d) Nombres reals entre -3 i 3 , ambdós inclosos.

7. Per a cada interval, indica'n el tipus, escriu la desigualtat equivalent i representa'l sobre la recta real:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a) $[-3, 5)$ | b) $(2, +\infty)$ |
| c) $(-\infty, 4]$ | d) $(0, 1)$ |

8. Calcula:

- | | |
|--------------|--------------|
| a) $ 7 $ | b) $ -7 $ |
| c) $ 0 $ | d) $ 3 - 8 $ |
| e) $ 8 - 3 $ | f) $- -4 $ |

9. Calcula la distància entre cada parell de punts:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a) $a = 2$, $b = 9$ | b) $a = -5$, $b = -1$ |
| c) $a = 4$, $b = -3$ | d) $a = 6$, $b = -2$ |

10. Troba l'interval (e_1, e_2) format pels punts que estan a una distància menor que r del punt a :

- a) $a = 5, r = 3$
- b) $a = -2, r = 4$
- c) $a = 0, r = 1,5$

11. Resol i escriu la solució com a interval o, quan calgui, com a unió d'interval·ls. Recorda que $d(x, a) = |x - a|$, de manera que les dues notacions són equivalents:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) $ x - 3 < 5$ | b) $d(x, -2) < 4$ |
| c) $ x - 1 \leq 6$ | d) $d(x, -5) < 2$ |
| e) $ x - 2 > 3$ | f) $d(x, -1) \geq 4$ |
| g) $d(x, 4) > 1$ | h) $ x + 3 \geq 2$ |

(Als apartats e)-h) la solució és el complementari d'un entorn: els punts que queden lluny del centre, no a prop.)

12. Troba a i r tals que l'interval solució de $|x - a| < r$ (o $\leq$, segons el cas) sigui:

- a) $(1, 9)$
- b) $(-4, 4)$
- c) $[-3, 11]$

13. Resol $|2x - 6| < 10$. (Indicació: pots treure factor comú 2 dins el valor absolut abans d'aïllar.)

14. Resol $|3x + 9| \leq 21$.

15. Resol les inequacions lineals següents (sense valor absolut) i expressa la solució com a interval:

- | | |
|------------------|----------------------|
| a) $3x - 4 > 11$ | b) $-2x + 7 \leq 1$ |
| c) $5x - 3 < 7$ | d) $-4x - 1 \geq 11$ |

16. Resol:

- a) $\frac{x}{2} - 3 > 1$
- b) $2(x - 1) \leq 3x + 4$
- c) $\frac{2x - 1}{3} \geq 5$

17. (aplicat) La temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) d'una sala es manté dins un marge de $\pm 1,5$ $^{\circ}\text{C}$ respecte al valor de consigna de 21 $^{\circ}\text{C}$. Escriu aquesta condició amb un valor absolut i troba l'interval de temperatures possibles.

18. (aplicat) Una peça mecànica ha de tenir una longitud de 50 mm amb una tolerància màxima de 0,2 mm.

- a) Escriu la condició amb valor absolut que ha de complir la longitud ℓ .
- b) Troba l'interval de longituds acceptades.

19. (aplicat) Dos vaixells naveguen per una mateixa ruta rectilínia; les seves posicions respecte a un far són $p_1 = 12$ km i $p_2 = -5$ km (negatiu si són a l'altre costat del far).

- a) Calcula la distància entre els dos vaixells.
- b) Una boia està ancorada a la posició $p = 3$ km. Un tercer vaixell s'ha de mantenir a una distància màxima de 8 km de la boia: escriu la condició amb valor absolut i troba l'interval de posicions on es pot trobar.

20. (aplicat) En una carretera recta, el punt quilomètric 0 marca l'entrada d'un poble i una antena de telefonia està situada al punt $p = 7$ km. La normativa obliga que qualsevol habitatge estigui a **més** de 2 km de l'antena. (Considerem la carretera com una recta il·limitada.)

- a) Escriu amb un valor absolut la condició que ha de complir la posició x d'un habitatge.
- b) Troba el conjunt de posicions permeses i expressa'l com a unió d'interval·ls.
- c) Un habitatge construït al punt quilomètric 8,5 compleix la normativa?

21. Troba tots els $x \in \mathbb{R}$ que compleixen alhora $|x - 4| < 6$ i $x > 1$. Expressa la solució com a interval (intersecció).

22. Escriu com un sol interval el conjunt de nombres reals que compleixen $-3 \leq x < 5$ o bé $4 < x \leq 9$ (unió). Simplifica el resultat.

23. Donats els conjunts A i B , calcula $A \cap B$ i $A \cup B$, i expressa el resultat com a interval (o unió d'intervals) sempre que es pugui:

a) $A = [-2, 5]$, $B = (1, 8]$

b) $A = (-\infty, 3]$, $B = (0, +\infty)$

c) $A = [-4, -1]$, $B = [2, 6]$

d) $A = (-3, 4)$, $B = [0, +\infty)$

24. Troba el conjunt de nombres reals que compleixen alhora les dues condicions

$$|x - 1| < 4 \quad \text{i} \quad |x + 2| > 1$$

Resol cada inequació per separat i després interseca les dues solucions.

3. Aproximacions i errors

25. Sigui $e = 2,718281828 \dots$ el nombre d'Euler. Trunca'l i arrodoneix-lo a 2 i a 4 xifres decimals.

26. Indica el nombre de xifres significatives de:

a) 0,0072

b) 308,40

c) 1,0500

d) 6000 (suposa que ve de mesurar amb precisió de milers)

27. El valor exacte d'una magnitud és $x = 12,763$ i s'aproxima per $x' = 12,8$. Calcula l'error absolut i l'error relatiu (en tant per cent, arrodonit a 2 xifres decimals).

28. Un topògraf mesura la longitud d'un pont i obté $x' = 248$ m, mentre que el valor exacte és $x = 250$ m.

a) Calcula l'error absolut.

b) Calcula l'error relatiu en tant per cent.

29. (*aplicat*) Es mesuren dues longituds amb el mateix error absolut d'1 cm: la llargada d'un llapis (15 cm) i la d'un camp de futbol (100 m). Calcula l'error relatiu en cada cas i comenta quina mesura és relativament més precisa.

30. Un nombre s'ha arrodonit a les centèsimes i s'ha obtingut $x' = 7,42$. Entre quins valors es pot trobar el valor exacte x ? Expressa la resposta en forma d'interval i vigila quins extrems s'inclouen i quins no.

31. Cada valor següent s'ha obtingut per arrodoniment. Dona una fita de l'error absolut i una fita de l'error relatiu (en tant per cent, amb dues xifres decimals):

a) $x' = 3,25$ (a les centèsimes)

b) $x' = 48,6$ (a les dècimes)

c) $x' = 1200$ (a les desenes)

d) $x' = 0,038$ (a les mil·lèsimes)

32. Volem aproximar $\pi = 3,14159265 \dots$ per arrodoniment, de manera que l'error relatiu sigui inferior al 0,01%. Quantes xifres decimals cal conservar com a mínim? Justifica-ho amb la fita de l'error i comprova després què passa si en conserves una menys.

33. (*aplicat*) La velocitat de la llum és $c = 299\,792\,458$ m/s, que sovint s'aproxima per $c' = 300\,000\,000$ m/s. Calcula l'error relatiu comès, en tant per cent (arrodoneix a 2 xifres decimals). (*Enllaça amb la notació científica que ve tot seguit.*)

4. Potències

34. Calcula:

a) 2^5

b) $(-3)^4$

c) -3^4

d) 5^0

e) 10^{-2}

f) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

5. Arrels i radicals

49. Calcula, si existeix, cada arrel. Si no existeix a $\mathbb{R}$, digues-ho:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a) $\sqrt{25}$ | b) $\sqrt[3]{-27}$ |
| c) $\sqrt{-9}$ | d) $\sqrt[4]{16}$ |
| e) $\sqrt[5]{-32}$ | f) $\sqrt[3]{0}$ |

50. Digues quantes arrels reals té cada equació i escriu-les:

- | | |
|---------------|---------------|
| a) $x^2 = 49$ | b) $x^3 = -8$ |
| c) $x^2 = -4$ | d) $x^4 = 81$ |

51. Escriu cada radical com una potència d'exponent fraccionari:

- | | |
|------------------|--------------------|
| a) $\sqrt[3]{5}$ | b) $\sqrt[4]{2^3}$ |
| c) $\sqrt{7}$ | d) $\sqrt[5]{x^2}$ |

52. Escriu cada potència com un radical:

- | | |
|--------------|--------------|
| a) $3^{1/2}$ | b) $2^{2/3}$ |
| c) $x^{3/4}$ | d) $5^{1/4}$ |

53. Simplifica reduint l'índex tant com sigui possible:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a) $\sqrt[6]{4}$ | b) $\sqrt[4]{9}$ |
| c) $\sqrt[8]{16}$ | d) $\sqrt[6]{27}$ |

54. Extreu tots els factors possibles de cada radical (suposa $x > 0$, $a > 0$):

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a) $\sqrt{75}$ | b) $\sqrt[3]{54}$ |
| c) $\sqrt{200}$ | d) $\sqrt[3]{128}$ |
| e) $\sqrt{x^5}$ | f) $\sqrt[3]{8x^4}$ |
| g) $\sqrt[4]{\frac{x^8}{16}}$ | h) $\sqrt{18a^3}$ |

55. Introdueix els factors dins del radical i simplifica (suposa $x > 0$, $a > 0$):

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| a) $3\sqrt{2}$ | b) $2\sqrt[3]{5}$ |
| c) $x\sqrt{x}$ | d) $4\sqrt[3]{2}$ |
| e) $\frac{2}{a}\sqrt{\frac{a^3}{4}}$ | f) $\frac{1}{2}\sqrt{20}$ |

56. Opera primer el radicand i després extreu els factors que puguis:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a) $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{9}}$ | b) $\sqrt{\frac{x}{4} + 2x}$, amb $x \geq 0$ |
| c) $\sqrt[3]{27x^2 + 27}$ | d) $\sqrt{4x^2 + 4x + 1}$ |

57. Sense calculadora, ordena de més petit a més gran, passant-los prèviament a índex comú: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{5}$, $\sqrt[3]{4}$.

58. Multiplica i simplifica:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ | b) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}$ |
| c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$ | d) $\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{8}$ |

59. Divideix i simplifica:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ | b) $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$ |
| c) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ | d) $\frac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}}$ |

60. Opera i simplifica, portant primer els radicals a índex comú:

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$

b) $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt{3}}$

61. Simplifica:

a) $\sqrt{\sqrt{16}}$

b) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}$

c) $(\sqrt[3]{5})^2$

d) $(\sqrt{7})^4$

62. Expressa cada expressió com un sol radical i simplifica:

a) $\sqrt{5}\sqrt{5}$

b) $\sqrt[3]{2\sqrt{2}}$

c) $\frac{(\sqrt[3]{16})^2}{\sqrt{32}}$

d) $\sqrt{3\sqrt[3]{3}}$

63. Suma o resta els radicals (ja són semblants):

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

b) $7\sqrt[3]{3} - 2\sqrt[3]{3}$

c) $2\sqrt{5} - 6\sqrt{5} + \sqrt{5}$

64. Extreu factors per identificar els radicals semblants i suma'ls:

a) $\sqrt{8} + \sqrt{18}$

b) $\sqrt{50} - \sqrt{32}$

c) $2\sqrt{12} + 3\sqrt{27}$

65. Calcula i simplifica (suposa $a > 0$, $x > 0$):

a) $3\sqrt{20} - 2\sqrt{45} + \sqrt{80}$

b) $4\sqrt[3]{8a} - \sqrt[3]{27a}$

c) $\sqrt{9x} + \sqrt{25x} - \sqrt{4x}$

66. Racionalitza el denominador:

a) $\frac{5}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

c) $\frac{6}{\sqrt{2}}$

d) $\frac{1}{\sqrt{7}}$

67. Racionalitza:

a) $\frac{4}{2\sqrt{3}}$

b) $\frac{3}{\sqrt{12}}$

c) $\frac{10}{3\sqrt{5}}$

68. Racionalitza utilitzant el conjugat:

a) $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$

b) $\frac{3}{\sqrt{7}+1}$

c) $\frac{2}{3-\sqrt{2}}$

69. Racionalitza i simplifica:

a) $\frac{5}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$

b) $\frac{1}{\sqrt{n}}$, amb $n \in \mathbb{N}$

c) $\frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$, amb $a, b \in \mathbb{N}$ i $a \neq b$

70. Racionalitza el denominador (arrel cúbica):

a) $\frac{2}{\sqrt[3]{x}}$

c) $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}}$

e) $\frac{1}{\sqrt[3]{3x}}$, amb $x > 0$

b) $\frac{5}{\sqrt[3]{x^2}}$

d) $\frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{10}}$

f) $\frac{10}{\sqrt[3]{25}}$

71. Racionalitza, indicant per quin factor cal multiplicar en cada cas:

a) $\frac{6}{\sqrt[4]{x^3}}$

b) $\frac{2}{\sqrt[5]{x^2}}$, amb $x > 0$

c) $\frac{2}{\sqrt[3]{4x^2}}$, amb $x > 0$

d) $\frac{3}{2\sqrt[4]{x^3}}$, amb $x > 0$

e) $\frac{a}{\sqrt[n]{a^{n-1}}}$, amb $a > 0$ i $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

72. Simplifica combinant diverses propietats: $\sqrt{18} + \frac{4}{\sqrt{2}} - \sqrt{50}$.

73. (aplicat) Els catets d'un triangle rectangle fan $a = \sqrt{18}$ i $b = \sqrt{32}$. Calcula, simplificant el resultat, la hipotenusa $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

74. (aplicat) El costat d'un quadrat mesura $\ell = 3\sqrt{2}$ cm. Calcula, simplificant:

a) L'àrea del quadrat.

b) La diagonal (recorda que la diagonal d'un quadrat de costat ℓ és $\ell\sqrt{2}$).

75. Comprova, amb $a = 9$ i $b = 4$, que $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en general. Calcula els dos costats i compara.

76. Simplifica $\frac{\sqrt{x^5}}{\sqrt{x}}$, amb $x > 0$, sense radicals al denominador i amb l'exponent més senzill possible.

6. Logaritmes

6.1 Definició i càlcul directe

77. Escriu en forma de logaritme:

a) $2^5 = 32$

c) $5^0 = 1$

b) $10^3 = 1000$

d) $3^{-2} = \frac{1}{9}$

78. Escriu en forma de potència:

a) $\log_2 16 = 4$

c) $\log_3 1 = 0$

b) $\log 100 = 2$

d) $\log_5 5 = 1$

79. Calcula sense calculadora:

- | | |
|-----------------|----------------|
| a) $\log_2 8$ | b) $\log_3 81$ |
| c) $\log 10000$ | d) $\log_5 1$ |
| e) $\log_7 7$ | f) $\ln e$ |

80. Calcula sense calculadora, escrivint prèviament el nombre com una potència de la base:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a) $\log_2 \frac{1}{4}$ | b) $\log_3 \frac{1}{27}$ |
| c) $\log_5 \sqrt{5}$ | d) $\log_2 \sqrt[3]{4}$ |

6.2 Propietats amb valors numèrics

81. Aplica la propietat del logaritme d'un producte per desenvolupar:

- a) $\log_2 (4 \cdot 8)$
b) $\log (5 \cdot 20)$
c) $\log_3 (x \cdot y)$, amb $x, y > 0$

82. Aplica la propietat del logaritme d'un quocient:

- a) $\log_2 \frac{32}{4}$
b) $\log \frac{1000}{10}$
c) $\log_5 \frac{x}{25}$, amb $x > 0$

83. Aplica la propietat de la potència:

- | | |
|------------------|--------------------|
| a) $\log_2 8^5$ | b) $\log_3 9^{-2}$ |
| c) $\log (10^7)$ | d) $\log_a a^n$ |

84. Aplica la propietat de l'arrel:

- a) $\log_2 \sqrt[3]{8}$
b) $\log_5 \sqrt{25}$
c) $\log_3 \sqrt[4]{81}$

85. Desenvolupa aplicant totes les propietats necessàries: $\log_2 \left(\frac{8\sqrt{2}}{4} \right)$.

86. Desenvolupa: $\log \left(\frac{100 \cdot \sqrt{10}}{1000} \right)$.

87. Redueix a un sol logaritme:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a) $\log_2 5 + \log_2 3$ | b) $\log 20 - \log 4$ |
| c) $3 \log_5 2$ | d) $\frac{1}{2} \log_3 9$ |

88. Redueix a un sol logaritme i calcula'n el valor: $2 \log_2 3 - \log_2 \frac{9}{4}$.

89. Utilitza el canvi de base per expressar en base 10 (deixa'l indicat, sense calcular-lo):

- a) $\log_2 7$
b) $\log_5 12$

6.3 Propietats amb expressions literals

En tots els exercicis d'aquest apartat, suposem $a > 0$, $a \neq 1$, i totes les variables (x, y, z) estrictament positives.

a) $\log_a (x^3 y^2)$ b) $\log_a \frac{x^2}{y^3}$
c) $\log_a \frac{xy}{z}$ d) $\log_a \sqrt{x}$

a) $\log_a \frac{x^3 \sqrt{y}}{z^2}$ b) $\log_a \sqrt{\frac{x}{y}}$
c) $\log_a \frac{x^2 \sqrt[3]{y}}{z}$ d) $\log_a (x\sqrt{yz})$

a) $2 \log_a x + 3 \log_a y$ b) $\log_a x - \frac{1}{2} \log_a y$
c) $\log_a x + \log_a y - \log_a z$ d) $4 \log_a x$

a) $3 \log_a x - \log_a y - 2 \log_a z$

b) $\frac{1}{2} (\log_a x + \log_a y)$

c) $2 \log_a x - \frac{1}{3} \log_a y$

d) $\frac{1}{3} \log_a x + \frac{2}{3} \log_a y - \log_a z$

a) $\log_a 6$
c) $\log_a \frac{3}{2}$
e) $\log_a 18$

b) $\log_a 12$
d) $\log_a \sqrt{2}$
f) $\log_a \frac{8}{9}$

a) $\log 5$
c) $\log 50$
e) $\log \sqrt{2}$

b) $\log 4$
d) $\log 0,2$
f) $\log 40$

$$\log_a x^2 - \log_a \sqrt{x} + \log_a \frac{1}{x}$$
$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$

98. Demuestra que $\log_{a^2} x = \frac{1}{2} \log_a x$. (Indicació: aplica el canvi de base a la base a .)

99. (*aplicat*) Un capital de $C_0 = 5\,000$ € s'inverteix a un interès compost anual del 4%. Quants anys calen, aproximadament, perquè el capital arribi a $C_f = 7\,000$ €? (*Usa $C_f = C_0(1+i)^t$ i el logaritme per aïllar t .*)

100. (*aplicat*) La magnitud M d'un terratrèmol (escala de Richter) es relaciona amb l'energia alliberada E mitjançant $M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right)$, amb E_0 constant. Si un terratrèmol allibera 1000 vegades més energia que un altre ($E = 1000 E_1$), quant més gran és la seva magnitud M respecte a M_1 ? (*Calcula $M - M_1$.*)

101. (*repàs*) Simplifica combinant potències i arrels: $\sqrt{2^6} \cdot 2^{-1}$.

102. (*repàs*) Calcula, en notació científica: $(2 \cdot 10^3)^2 \cdot (5 \cdot 10^{-2})$.

103. (*repàs*) Simplifica $\sqrt{\frac{4 \cdot 10^{-2}}{9}}$ i expressa el resultat com una fracció.

104. (*repàs*) Troba l'interval solució de $|x - 3| < \sqrt{16}$.

105. (*repàs*) Calcula l'error relatiu, en tant per cent, de l'aproximació $\sqrt{2} \approx 1,414$ (arrodoneix a 3 xifres decimals).

106. (*repàs · aplicat*) Una població de bacteris es multiplica per 2 cada hora, segons $N(t) = N_0 \cdot 2^t$, amb $N_0 = 500$.

a) Quants bacteris hi ha al cap de 5 hores?

b) Quantes hores calen perquè la població arribi a 64 000 bacteris?

107. (*repàs · aplicat*) Un dipòsit cúbic té un volum de $V = 125 \text{ m}^3$.

a) Calcula, sense calculadora, l'aresta del cub ($V = a^3 \Rightarrow a = \sqrt[3]{V}$).

b) Si es vol doblar el volum, quina hauria de ser la nova aresta a' ? Deixa-la com a radical simplificat.

108. (*repàs · aplicat*) La intensitat sonora β (en decibels) es calcula com $\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$, amb $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ el llindar d'audició. Calcula la intensitat sonora, en decibels, d'un so amb $I = 10^{-4} \text{ W/m}^2$.

109. (*repàs global*) Simplifica pas a pas fins a obtenir un únic nombre:

$$\frac{\sqrt{50} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}} + \log_2 16 - |-3|$$

110. (*repàs global*) Considera $A = \frac{3^2 \cdot \sqrt{4}}{3}$ i $B = \log_2 \left(\frac{32}{4} \right)$.

a) Calcula el valor numèric de A i de B .

b) Troba l'interval solució de $|x - A| < B$.

111. Digues si cada afirmació és certa o falsa. Si és falsa, dona un contraexemple:

a) $\sqrt{a^2} = a$ per a tot $a \in \mathbb{R}$.

b) $|a + b| = |a| + |b|$ per a tot $a, b \in \mathbb{R}$.

c) $\log(x + y) = \log x + \log y$ per a tot $x, y > 0$.

d) $\sqrt[3]{a}$ existeix per a tot $a \in \mathbb{R}$.

e) Si $|x| < 3$, aleshores $x < 3$.

f) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ per a tot $a, b \in \mathbb{R}$.

112. (*aplicat*) El període d'oscil·lació T d'un pèndol simple de longitud L ve donat per

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}},$$

on g és l'acceleració de la gravetat (constant). Demostra que, per aconseguir que el període es dupliqui, cal multiplicar la longitud del pèndol per 4.
