

## Seminar 3

(S3.1) Fie  $A$  o mulțime infinită. Demonstrați următoarele, pentru orice mulțime  $B$ :

- (i) Dacă există o funcție injectivă  $f : A \rightarrow B$ , atunci  $B$  este infinită.
- (ii) Dacă  $A \subseteq B$ , atunci  $B$  este infinită.

**Demonstrație:**

- (i) Presupunem prin reducere la absurd că  $B$  este finită. Așadar, există o bijecție  $g : B \rightarrow \{1, \dots, n\}$  pentru un  $n \in \mathbb{N}$ . Obținem că funcția  $h : A \rightarrow \{1, \dots, n\}$ ,  $h = g \circ f$  este injectivă. Prin urmare,  $A \sim h(A) \subseteq \{1, \dots, n\}$ . Rezultă că există (pas justificat mai jos!)  $k \leq n$  astfel încât  $h(A) \sim \{1, \dots, k\}$ , așadar  $A \sim \{1, \dots, k\}$  și deci  $A$  este finită. Am obținut o contradicție.

Rămâne de arătat, deci, că pentru orice  $k \in \mathbb{N}$  și orice  $X \subseteq \{1, \dots, k\}$  avem că  $X$  este finită. Demonstrăm prin inducție după  $k$ . Pentru  $k = 0$ , avem  $X \subseteq \{1, \dots, 0\} = \emptyset$  și deci  $X = \emptyset$ , așadar  $X$  este finită. Pentru trecerea de la  $k$  la  $k + 1$ , presupunem că avem  $X \subseteq \{1, \dots, k + 1\}$ . Atunci  $Y := X \cap \{1, \dots, k\} \subseteq \{1, \dots, k\}$  și deci există  $l$  cu  $Y \sim \{1, \dots, l\}$ . Atunci fie  $X = Y$  și atunci  $X \sim \{1, \dots, l\}$ , fie  $X = Y \cup \{k + 1\}$  și atunci  $X \sim \{1, \dots, l + 1\}$ . În ambele cazuri,  $X$  este finită.

- (ii) Funcția incluziune  $\iota : A \rightarrow B$ ,  $\iota(a) = a$  este injectivă. Aplicăm (i) pentru a concluziona că  $B$  este infinită.

□

(S3.2) Demonstrați următoarele:

- (i) Reuniunea unei familii cel mult numărabile de mulțimi cel mult numărabile este mulțime cel mult numărabilă.
- (ii) Reuniunea unui număr finit ( $\geq 2$ ) de mulțimi numărabile este numărabilă.

### Demonstrație:

- (i) Fie  $(A_i)_{i \in I}$  o familie cel mult numărabilă de mulțimi cel mult numărabile. Așadar,  $I$  este nevidă și cel mult numărabilă și mulțimile  $A_i, i \in I$  sunt cel mult numărabile. Conform (S2.4), există pentru fiecare  $i \in I$  o funcție injectivă  $f_i : A_i \rightarrow \mathbb{N}$ .

Definim  $f : \bigcup_{i \in I} A_i \rightarrow \mathbb{N} \times I$  astfel:

dacă  $a \in \bigcup_{i \in I} A_i$ , alegem  $i_a \in I$  cu  $a \in A_{i_a}$  și definim  $f(a) = (f_{i_a}(a), i_a)$ .

Rezultă ușor că  $f$  este injectivă: dacă  $a, b \in \bigcup_{i \in I} A_i$  sunt a.î.  $(f_{i_a}(a), i_a) = (f_{i_b}(b), i_b)$ , atunci  $i_a = i_b$  și  $f_{i_a}(a) = f_{i_a}(b)$ , deci  $a = b$ , deoarece  $f_{i_a}$  este injectivă.

Conform Corolarului 1.10,  $\mathbb{N} \times I$  este numărabilă. Aplicând din nou (S2.4), obținem că  $\bigcup_{i \in I} A_i$  este cel mult numărabilă.

- (ii) Fie  $n \geq 2$ ,  $A_1, \dots, A_n$  mulțimi numărabile și  $A := A_1 \cup \dots \cup A_n$ . Aplicând (i) pentru  $I = \{1, \dots, n\}$ , obținem că  $A$  este cel mult numărabilă. Deoarece  $A_1 \subseteq A$  și  $A_1$  este infinită, rezultă, din (S3.1).(ii), că  $A$  este infinită. Prin urmare,  $A$  este numărabilă.

□

**(S3.3)** Demonstrați că  $\mathbb{Q}$  este numărabilă.

**Demonstrație:** Pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$ , fie  $A_n := \{\frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}\}$  și  $f_n : \mathbb{Z} \rightarrow A_n, f_n(m) = \frac{m}{n}$ .

Este evident că  $f_n$  este bijectivă. Cum  $\mathbb{Z}$  este numărabilă, rezultă că  $A_n$  este numărabilă pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$ . Deoarece  $\mathbb{Q} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$ , aplicăm (S3.2).(i) și faptul că  $\mathbb{Q}$  este infinită pentru a obține numărabilitatea lui  $\mathbb{Q}$ .

□

**(S3.4)** Arătați că  $\mathbb{R}$  nu este numărabilă.

**Demonstrație:** Cum știm din (S1.3) că intervalul  $(0, 1)$  și  $\mathbb{R}$  sunt echipotente, este suficient să arătăm că intervalul  $(0, 1)$  nu este numărabil. Presupunem, prin reducere la absurd, că există o bijecție  $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$ . Vom reprezenta funcția  $f$  folosind tabelul de mai jos:

$$\begin{array}{c|l} 0 & 0, a_{0,0}a_{0,1}a_{0,2}a_{0,3} \dots \\ 1 & 0, a_{1,0}a_{1,1}a_{1,2}a_{1,3} \dots \\ 2 & 0, a_{2,0}a_{2,1}a_{2,2}a_{2,3} \dots \\ 3 & 0, a_{3,0}a_{3,1}a_{3,2}a_{3,3} \dots \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

Așa cum se observă, pentru orice  $i, j \in \mathbb{N}$ ,  $a_{i,j}$  este a  $(j+1)$ -a zecimală a lui  $f(i)$ . Deoarece  $f$  este surjectivă, fiecărui număr din codomeniul acesteia,  $(0, 1)$ , îi este asociat un număr

natural. Cu alte cuvinte, toate numerele reale ce compun intervalul  $(0, 1)$  ar trebui să se regăsească în coloana a doua a tabelului de mai sus. Vom arăta că aceasta este imposibil, construind un număr  $x \in (0, 1)$  ce nu se poate găsi în coloana a doua a niciunei linii din tabel. Fie  $x := 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots d_j \dots$ , unde fiecare cifră  $d_j$  din reprezentarea zecimală a lui  $x$  este obținută astfel:

$$d_j := \begin{cases} 2, & \text{dacă } a_{j,j} = 1 \\ 1, & \text{dacă } a_{j,j} \neq 1. \end{cases}$$

Având în vedere construcția numărului  $x$ , prima zecimală a acestuia va fi diferită de prima zecimală a lui  $f(0)$ , a doua zecimală va fi diferită de a doua zecimală a lui  $f(1)$ , ..., a  $n$ -a zecimală a lui  $x$  va fi diferită de a  $n$ -a zecimală a lui  $f(n-1)$ , și așa mai departe. În concluzie, numărului  $x$  nu îi este asociat un număr natural  $a$  a.î.  $x = f(a)$ , deci  $f$  nu este o bijecție. Contradicție.  $\square$

**(S3.5)** Fie următoarele propoziții exprimate în limbaj natural:

- (i) Merg în parc dacă îmi termin treaba și nu apare altceva.
- (ii) Este necesar să nu plouă ca să putem observa stelele.
- (iii) Treci examenul la logică numai dacă înțelegi subiectul.
- (iv) Treci examenul la logică dacă rezolvi destule probleme.

Transpuneți-le în formule ale limbajului formal al logicii propoziționale.

**Demonstrație:**

- (i) Fie  $\varphi$  = Merg în parc dacă îmi termin treaba și nu apare altceva. Considerăm propozițiile atomice:

$$p = \text{Merg în parc.} \quad q = \text{Îmi termin treaba.} \quad r = \text{Apare altceva.}$$

$$\text{Atunci } \varphi = (q \wedge (\neg r)) \rightarrow p.$$

- (ii) Fie  $\psi$  = Este necesar să nu plouă ca să putem observa stelele. Considerăm propozițiile atomice:

$$s = \text{Plouă.} \quad t = \text{Putem observa stelele.}$$

$$\text{Atunci } \psi = t \rightarrow \neg s.$$

- (iii) Fie  $\theta = \text{Treci examenul la logică numai dacă înțelegei subiectul}$ . Considerăm propozițiile atomice:

$$w = \text{Treci examenul la logică.} \quad z = \text{Înțelege subiectul.}$$

$$\text{Atunci } \theta = w \rightarrow z.$$

- (iv) Fie  $\chi = \text{Treci examenul la logică dacă rezolvi destule probleme}$ . Considerăm propozițiile atomice:

$$u = \text{Treci examenul la logică.} \quad v = \text{Rezolvi destule probleme.}$$

$$\text{Atunci } \chi = v \rightarrow u.$$

□