

MA0609 — Tópicos en Teoría de Números

Basado en las clases impartidas por Adrián Barquero y Darío Mena

Notas tomadas por Ignacio Rojas

Verano 2021

Estas notas no están respaldadas por los profesores y han sido modificadas (a menudo de manera significativa) después de las clases. No están lejos de ser representaciones precisas de lo que realmente se dio en clase y en particular todos los errores son casi seguramente míos.

La teoría de curvas elípticas tiene al día de hoy más de 50 años de ser desarrollada continuamente. Fermat estudió ecuaciones que tenían relación con curvas elípticas y es hasta el día de hoy que se pueden ver las relaciones con estos temas. Este tema se puede ver desde las distintas áreas de la matemática: análisis, álgebra, geometría... Hay métodos para el uso de firmas digitales y seguridad en tarjetas de crédito que están relacionados con curvas elípticas.

En fin, este tema es de mucho interés en la actualidad. Nosotros nos centraremos en los números racionales siguiendo la línea del libro de Silverman & Tate [3]. En concreto los temas a tratar son los siguientes:

- (a) Introducción a geometría proyectiva.
- (b) Curvas cúbicas y ecuaciones en forma normal de Weierstrass.
- (c) Suma de puntos y la ley de grupo en curvas elípticas.
- (d) Puntos de orden finito y el teorema Nagell-Lutz.
- (e) La estructura del grupo de puntos racionales en una curva elíptica y el teorema Mordell-Weil.

Requisitos

Se asume un conocimiento básico de teoría de números. Se utilizarán conceptos de teoría de grupos y variable compleja a un nivel básico.

Índice general

Índice general	2
1 Curvas elípticas	3
1.1. Día 1 20210105	3
1.2. Día $n+1$ 20210113	7
1.3. Día $n+2$ 20210114	10
2 Análisis de Fourier	13
2.1. Día k 20210203	13
2.2. Día $k+1$ 20210204	19
2.3. Día $k+2$ 20210208	21
2.4. Día $k+3$ 20210209	28
2.5. Día $k+4$ 20210210	33
2.6. Día $k+5$ 20210211	33
2.7. Ínterin Tarea	36
2.8. Día $k+j$ 20210215	39
2.9. Día $k+j+1$ 20210216	40
2.10. Día $k+j+2$ 20210217	40
Índice Analítico	43
Bibliografía	45

Capítulo 1

Curvas elípticas

1.1. Día 1 | 20210105

Introducción a la geometría proyectiva

La vista algebraica

En general hay más de una manera en la que uno puede construir el plano proyectivo y más generalmente el espacio proyectivo en varias dimensiones. A manera de motivación, a la hora de estudiar ciertos problemas en matemática, se llega a observar que es suficiente trabajar con objetos en términos de clases de equivalencia.

Por ejemplo un problema que se discute en el Silverman y Tate [3], al estudiar las soluciones racionales de la ecuación

$$x^N + y^N = 1,$$

se puede ver que si $x = \frac{a}{c}$ y $y = \frac{b}{d}$ son soluciones racionales en su forma más reducida ($\text{mcd}(a, c) = \text{mcd}(b, d) = 1$, y $c, d > 0$) entonces debe ocurrir que $c = d$. Esto se logra después de un breve análisis de divisibilidad. Concluimos que la solución debe tener la forma $x = \frac{a}{c}$ y $y = \frac{b}{c}$.

Esta solución satisface que $a^N + b^N = c^N$ por lo que la solución $(\frac{a}{c}, \frac{b}{c})$ del problema en términos racionales genera una solución (a, b, c) de la ecuación homogénea $x^N + y^N = z^N$. La clave aquí es que como la ecuación es homogénea, cualquier múltiplo de (a, b, c) , (ta, tb, tc) con $t \in \mathbb{R}$, va a ser una solución al mismo problema. Pero como estas soluciones se obtienen de manera relativamente trivial, podríamos querer considerarlas como equivalentes. Este tipo de razonamiento lleva a la definición algebraica del plano proyectivo.

1. CURVAS ELÍPTICAS

Definición 1.1.1. El plano proyectivo sobre un cuerpo K es el cociente del conjunto $\{(a, b, c) \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}\}$ por la relación

$$(a, b, c) \sim (a', b', c') \iff \exists t \in K^\times (a = ta', b = tb', c = tc').$$

Denotamos entonces

$$\mathbb{P}_K^2 = \{x \in K^3 \setminus \{0\}\} / \sim,$$

y la clase de equivalencia de (a, b, c) la denotamos $[a, b, c]$ y se llamarán sus coordenadas homogéneas.

¿Qué pasa si incluimos el cero en nuestra definición del plano proyectivo?

Bueno, volviendo al ejemplo que presentamos, nos gustaría que nuestras soluciones estén en correspondencia. Claramente $(0, 0, 0)$ resuelve la ecuación homogénea, pero no la que tiene forma racional. Quizás de manera más interesante, $(1, -1, 0)$ resuelve la ecuación homogénea con exponente impar. Pero esta no da una solución de la ecuación racional, entonces podríamos pensar por ejemplo que tenemos $((a_j, b_j, c_j)) \subseteq \mathbb{R}^3$ una sucesión de soluciones reales que converge a $(1, -1, 0)$ y $c_j > 0$. Esta sucesión si genera soluciones $\left(\frac{a_j}{c_j}, \frac{b_j}{c_j}\right)$ de la ecuación racional y cuando $j \rightarrow \infty$ entonces este par ordenado tiende a $(\infty, -\infty)$. Podemos entonces pensar que las tripletas con tercera coordenada nula corresponden con soluciones que se encuentran en el infinito. Esta clase de puntos en el infinito es fundamental y lo estudiaremos más adelante.

Definición 1.1.2. El espacio proyectivo en n dimensiones sobre un cuerpo K es el conjunto

$$\mathbb{P}_K^n = \{x \in K^{n+1} \setminus \{0\}\} / \sim$$

donde la equivalencia es $x \sim x' \iff \exists t \in K^\times (x = tx')$. De igual manera denotamos la clase de x como $[x]$. Las coordenadas de $[x]$ igualmente se llamarán coordenadas homogéneas.

Más adelante vamos a definir curvas en el espacio proyectivo. En este momento vamos a definir lo que entenderemos como una recta en el plano proyectivo. En principio verificar que un punto proyectivo $[a, b, c]$ está en una recta proyectiva consiste en ver que cualquier elemento de la clase de equivalencia satisface la ecuación mencionada.

Definición 1.1.3 (Recta en el plano proyectivo). Una recta en el plano proyectivo \mathbb{P}_K^2 es el conjunto de puntos $[a, b, c]$ cuyas coordenadas satisfacen una ecuación de la forma

$$\alpha X + \beta Y + \gamma Z = 0,$$

donde $\alpha, \beta, \gamma \in K$ no son todos nulos.

En el plano usual, una recta es el conjunto de puntos que satisface una ecuación $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$. En el caso proyectivo, la definición de recta que obtuvimos es básicamente lo que obtendríamos de esta ecuación al hacerla homogénea.

Una visión geométrica

Sabemos que en \mathbb{R}^2 vale que dos puntos determinan una única recta y similarmente dos rectas se intersecan en un único punto salvo cuando son paralelas. Entonces buscamos extender el concepto de obtener una noción más completa, ¿quisiéramos poder decir que cualesquiera dos rectas se intersecan en un punto!

La idea va a ser asociar a cada recta en el plano una *dirección*. Al hacer esto, estaríamos agregándole un poco más de *información* a una recta. Entonces una recta va a ser el conjunto de puntos *y una dirección*. Para nosotros, dos rectas paralelas tendrán la misma dirección y como decimos ahora que la dirección es parte de la recta, las paralelas *coinciden en la intersección*.

Extendemos el concepto de recta agregando “la dirección” como un punto. Si trabajamos sobre \mathbb{R} , habrá que agregar un número infinito de puntos. Porque si agregamos sólo un punto en el infinito como dirección entonces dos pares de rectas paralelas se intersecan en el mismo punto. En particular dos rectas distintas se intersecarían en dos puntos y eso contradice el hecho de que dos rectas distintas se intersecan en un único punto. Esto nos lleva a una idea geométrica para definir el plano proyectivo.

Definición 1.1.4 (Plano afín sobre K). Sea K un cuerpo, el plano afín sobre K es el conjunto $\mathbb{A}_K^2 = \{ (x, y) \in K^2 \}$.

Definición 1.1.5 (Espacio afín n -dimensional). El espacio afín sobre un cuerpo K es el conjunto $\mathbb{A}_K^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n \}$.

Observe ahora la diferencia aquí con el plano proyectivo, se necesitaban tres coordenadas. Aquí en el plano afín necesitamos sólo dos. Análogamente en el espacio proyectivo de n dimensiones, necesitamos $n + 1$ coordenadas, mientras que en el n -espacio afín usamos n coordenadas.

Definición 1.1.6 (Plano proyectivo sobre K (geometricamente)). El plano proyectivo se define como el conjunto

$$\mathbb{P}_K^2 = \mathbb{A}_K^2 \cup \{ \text{direcciones en } \mathbb{A}_K^2 \}.$$

Consideramos que dos rectas en \mathbb{A}_K^2 tienen la misma dirección cuando son paralelas.

Por tanto una dirección se puede considerar como una clase de equivalencia de rectas. Definimos una equivalencia en el conjunto de las rectas en \mathbb{A}_K^2 al considerar dos rectas como equivalentes cuando son paralelas. Así las direcciones en \mathbb{A}_K^2 son las clases de equivalencia de rectas paralelas.

Entonces los puntos de \mathbb{P}_K^2 correspondientes a las direcciones, los llamamos “puntos en el infinito”. Al conjunto de puntos en el infinito de hecho lo consideramos una recta en \mathbb{P}_K^2 , se le llama recta en el infinito.

Ejemplo 1.1.7. La noción de punto en el infinito se puede asociar con la idea de ver un par de líneas de tren. Desde un punto de vista, cuando se ve en la dirección de las líneas en una situación adecuada, pareciera que en el horizonte las líneas se tocan.

TO DO: Agregar imagen vectorizada de líneas de tren tocándose.

Bajo esta versión geométrica, una recta en \mathbb{P}_K^2 se define de una manera distinta.

Definición 1.1.8 (Recta proyectiva (geometricamente)). Una recta en \mathbb{P}_K^2 es la unión de puntos de una recta en \mathbb{A}_K^2 con su correspondiente dirección.

De acuerdo con esta definición, dos rectas en el plano proyectivo sí se intersecan en un *único punto*. Si dos rectas no son paralelas se intersecan en únicamente un punto del plano afín y sus direcciones son distintas. Entonces el punto en el infinito que agregamos a ambas rectas no coincide. En el caso que las rectas sean paralelas, no se intersecan en ningún punto del plano afín. Pero pertenecen a la misma clase de equivalencia y por tanto tienen el mismo punto en el infinito asociado. El último caso es el de la recta en el infinito que interseca a todas las rectas pues todas llevan una dirección asociada.

Para reconciliar las definiciones establecemos la equivalencia entre ellas. Redefinimos el conjunto de direcciones que originalmente lo consideramos como un conjunto de clases de equivalencia. Basta considerar sólo aquellas rectas que pasan por el origen, de la cual sólo hay una por cada clase de equivalencia. Vamos a usar estas rectas para describir el conjunto de direcciones a manera de “representantes canónicos”.

Las rectas que pasan por el origen tienen la forma $Ay = Bx$ donde A, B no son ambos cero. Ciertamente (A, B) y (A', B') definen la misma recta cuando existe $t \in K^\times$ tal que $A = tA'$ y $B = tB'$. Aquellos con mente sagaz habrán reconocido esta idea como una que hicimos recién. El conjunto de direcciones en \mathbb{A}_K^2 se puede describir como el conjunto de puntos $[A, B] \in \mathbb{P}_K^1$ donde

$$[A, B] = \{ (tA, tB) \in K^2 \setminus \{ (0, 0) \}, t \in K^\times \}.$$

Concluimos que $\mathbb{P}_K^2 = \mathbb{A}_K^2 \cup \mathbb{P}_K^1$ donde $[A, B]$ corresponde con la dirección de la recta $Ay = Bx$. De manera totalmente análoga se puede ver que $\mathbb{P}_K^n = \mathbb{A}_K^n \cup \mathbb{P}_K^{n-1}$.

1.2. Día n+1 | 20210113

Hemos concluido la lección anterior observando ejemplos de intersecciones entre curvas. Para lograr que dos curvas de grados d_1 y d_2 se intersecaran en $d_1 \cdot d_2$ puntos, necesitábamos trabajar tanto en el plano proyectivo como en \mathbb{C} . Continuamos con otro ejemplo:

Ejemplo 1.2.1. Consideramos las curvas

$$\begin{aligned} C_1 : x + y &= 2, \\ C_2 : x^2 + y^2 &= 2. \end{aligned}$$

La recta C_1 interseca al círculo de forma tangencial en el punto $(1, 1)$. De hecho si




Figura 1.1: aaa

homogenizamos y buscamos las intersecciones de las curvas proyectivas

$$\begin{aligned} \tilde{C}_1 : x + y &= 2z, \\ \tilde{C}_2 : x^2 + y^2 &= 2z^2, \end{aligned}$$

entonces despejamos $z = \frac{x+y}{2}$. Lo que nos lleva a $x^2 + y^2 = 2 \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$. Despejando vale que $(X - Y)^2 = 0$ y no podría ocurrir que X, Y son ambos cero y $X = Y$. Esto nos lleva al punto $[X, X, X] = [1, 1, 1] \in \tilde{C}_1 \cap \tilde{C}_2$ y este punto corresponde al punto afín que ya habíamos encontrado.

Nosotros esperábamos dos puntos de intersección, pero no hay manera ni siquiera pasando por los complejos. Sólo obtenemos un punto de intersección y esto ocurre

1. CURVAS ELÍPTICAS

porque la recta interseca de manera tangencial. Este problema es el análogo al de una variable, recuerde que el teorema fundamental del álgebra garantiza la existencia cierto número de raíces para los polinomios. Lo que no hemos mencionado es la *multiplicidad* de la raíz. En este caso vemos que la misma ecuación $(X - Y)^2 = 0$ nos dice que la raíz tiene multiplicidad dos.

En conclusión sólo encontramos un punto de intersección, incluso después de haber buscado posibles puntos en el infinito. Esto es porque $[1, 1, 1]$ se debe contar con multiplicidad dos y corresponde con el hecho de que ambas curvas se intersecan de manera tangencial en este punto. De hecho, se ve reflejado en que al resolver el sistema de ecuaciones obtuvimos la ecuación $(X - Y)^2 = 0$.

Este no es el único caso en que esto puede ocurrir y el siguiente ejemplo lo ilustra.

Ejemplo 1.2.2. Considere ahora la curvas

$$\begin{aligned}C_1 : y &= x, \\C_2 : y^2 &= x^3.\end{aligned}$$

agregar figura Estas curvas se intersecan en dos puntos del plano afín. Al homogenizar obtenemos

$$\begin{aligned}\tilde{C}_1 : X - Y &= 0, \\ \tilde{C}_2 : X^3 - Y^2Z &= 0,\end{aligned}$$

y resolviendo llegamos a $X^3 - X^2Z = 0$ y de aquí que $X = 0$ ó $X = Y = Z$. Si $X = 0$, entonces $Y = 0$ y así Z queda libre lo que nos lleva a los puntos $[1, 1, 1]$ y $[0, 0, 1]$. A diferencia del caso anterior, no hay multiplicidades mayores a uno. Aquí lo que ocurre es que uno de los puntos de intersección es un punto que no es suave. Las rectas cuyas direcciones aproximan la identidad tienen dos puntos de intersección con la curva cuspidal, entonces en el límite, el punto singular $[0, 0, 1]$ tiene multiplicidad dos. agregar figura

Ejemplo 1.2.3. Esta vez consideramos las curvas

$$\begin{aligned}C_1 : x + y + 1 &= 0, \\C_2 : 2x^2 + xy - y^2 + 4x + y + 2 &= 0.\end{aligned}$$

Aquel que esté atento podrá notar que

$$2x^2 + xy - y^2 + 4x + y + 2 = (x + y + 1)(2x - y + 2)$$

y así $C_1 \subseteq C_2$ lo que nos dice que la cantidad de puntos de intersección es infinita. Pero entonces las situaciones así no deben entrar en la consideración de los puntos de intersección de manera tan vaga. En el caso de $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ hay infinitos puntos por lo que debemos especificar lo que buscamos.

Definición 1.2.4. Sea $C : f(x, y) = 0$ una curva con $f \in K[x, y]$. Si factorizamos f como un producto de polinomios irreducibles $f = \prod_{j=1}^n p_j$, entonces los componentes de la curva C son las curvas $C_j : p_j(x, y) = 0$. Diremos que C es irreducible cuando tenga un único componente. Es decir, sólo si el polinomio f es irreducible.

Ejemplo 1.2.5. De las curvas estudiadas en el ejemplo anterior, la curva C_1 es irreducible al ser un polinomio lineal y la segunda curva se puede factorizar en dos componentes. Ambas rectas son las componentes irreducibles de esta curva.

Definición 1.2.6. Diremos que dos curvas afines C_1, C_2 no tienen componentes en común si sus componentes irreducibles son distintos.

Un resultado básico en teoría de curvas que no vamos a demostrar es el siguiente:

Proposición 1.2.7. Si C_1, C_2 son dos curvas afines sin componentes en común, entonces $C_1 \cap C_2$ es un conjunto finito.

Observación 1.2.8. De manera análoga al caso afín, se definen componentes de curvas proyectivas y la noción de dos curvas proyectivas sin componentes comunes.

El teorema de Bezout es más general que este resultado. Con lo que hemos visto hasta ahora, lo podemos enunciar. **bajé a agarrar agua**

Por ahora mencionamos las siguientes propiedades:

- (a) Si $P \notin C_1 \cap C_2$, entonces $I(C_1 \cap C_2, P) = 0$.
- (b) Si $P \in C_1 \cap C_2$ y P es un punto no singular de C_1 y C_2 , y si adicionalmente C_1 y C_2 tienen direcciones tangenciales diferentes en P , entonces $I(C_1 \cap C_2, P) = 1$. En este caso, se dice que C_1 y C_2 se intersecan en P de manera transversal.
- (c) Si $P \in C_1 \cap C_2$ y C_1 y C_2 no se intersecan transversalmente, entonces $I(C_1 \cap C_2, P) \geq 2$.

Teorema 1.2.9 (Bezout). Sean $C_1, C_2 \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ sin componentes en común. Entonces vale que

$$\sum_{P \in C_1 \cap C_2} I(C_1 \cap C_2, P) = \deg(C_1) \deg(C_2).$$

1. CURVAS ELÍPTICAS

En particular si C_1, C_2 son suaves y únicamente tienen intersecciones transversales, entonces

$$|C_1 \cap C_2| = \deg(C_1) \deg(C_2)$$

y en todo momento se tiene la desigualdad $|C_1 \cap C_2| \leq \deg(C_1) \deg(C_2)$.

1.3. Día n+2 | 20210114

Multiplicidad de la intersección de dos curvas

Vamos a estudiar algunas propiedades y ejemplos de cálculo de la multiplicidad o índice de intersecciones $I(C_1 \cap C_2, P)$. Vamos a comenzar con un teorema que establece la existencia de la multiplicidad de la intersección y nos permite hacer cálculos.

Rápidamente para poder simplificar la notación introducimos los conceptos de variedad.

Definición 1.3.1. La variedad afín de f es el conjunto de ceros de f dentro del espacio afín \mathbb{A}^2 . Denotamos

$$V(f) = \{x \in \mathbb{A}^2 : f(x) = 0\}$$

y análogamente la variedad proyectiva de F es su conjunto de ceros dentro del espacio proyectivo. Este conjunto es

$$V(F) = \{X \in \mathbb{P}^2 : F(X) = 0\}.$$

Teorema 1.3.2. Considere $V(f), V(g)$ dos curvas afines en $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ y $P \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ dado. Entonces existe un número $I(V(f) \cap V(g), P)$ definido de manera única tal que las siguientes propiedades se satisfacen:

- (a) $I(V(f) \cap V(g), P) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, a menos que P esté en un componente común de $V(f), V(g)$ y en ese caso $I(V(f) \cap V(g), P) = \infty$.
- (b) $I(V(f) \cap V(g), P) = 0$ si y sólo si $P \notin V(f) \cap V(g)$.
- (c) Dos rectas distintas se intersecan con multiplicidad uno en su punto de intersección.
- (d) $I(V(f) \cap V(g), P) = I(V(g) \cap V(f), P)$.
- (e) Si $f = \prod p_i^{\alpha_i}$ y $g = \prod q_i^{\beta_i}$, entonces

$$I(V(f) \cap V(g), P) = \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j I(V(p_i) \cap V(q_j), P).$$

(f) $I(V(f) \cap V(g), P) = I(V(f) \cap V(g + hf), P)$ para $h \in \mathbb{C}[x, y]$.

Definición 1.3.3. El número $I(V(f) \cap V(g), P)$ se llama multiplicidad de la intersección de $V(f)$ y $V(g)$ en P .

Ejemplo 1.3.4. (a) x^2 con y

(b) círculo con recta

(c) cuspidal con identidad

Definición 1.3.5. Sea f un polinomio con coeficientes en \mathbb{C} y $P \in V(f)$. La multiplicidad de f en P

Capítulo 2

Análisis de Fourier

2.1. Día k | 20210203

La transformada de Fourier

Trabajaremos en \mathbb{R}^d con m la medida de Lebesgue, las funciones a considerar son $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ y suponemos que son Borel medibles. De aquí tenemos el espacio

$$L^p(\mathbb{R}^d) = \left\{ f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \text{ medible, } \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx < \infty \right\}$$

para $p \in [1, \infty[$. En el caso cuando $p = \infty$ tenemos que $\|f\|_\infty = \text{esssup}(f)$ como el $\inf_{C>0} \{m(|f| \geq C) = 0\}$ y definimos L^∞ de manera análoga a L^p como $\{\|f\|_\infty < \infty\}$. Trabajamos también con el espacio C_0 ... **estaba cambiando el word wrap**

Así, f es integrable cuando f_r y f_i lo sean.

Si $z \in \mathbb{C}$, $z = x + iy$ definimos el módulo complejo como $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. El módulo complejo cumple algunas propiedades tales como la desigualdad triangular para integrales $|\int f dx| \leq \int |f| dx$. Recordemos la identidad de Euler, si $x \in \mathbb{R}$ entonces $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$ y este número tiene módulo 1.

Definición 2.1.1. Sea $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, definimos su transformada de Fourier como

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

Note que $|\hat{f}(\xi)| \leq \|f\|_1$.

Teorema 2.1.2. El mapeo $f \mapsto \hat{f}$ es una aplicación continua entre L^1 y L^∞ . Vale que $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$. Además si $f \in L^1$ entonces \hat{f} es una función uniformemente continua.

2. ANÁLISIS DE FOURIER

Prueba

Note que inmediatamente de la definición tenemos $|\hat{f}(\xi)| \leq \|f\|_1$ para $\xi \in \mathbb{R}^d$ lo que implica $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$.

Por otro lado considere la cantidad

$$\begin{aligned} |\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| &= \left| \int f(x) e^{-2\pi i \langle x | \xi + h \rangle} dx - \int f(x) e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} dx \right| \\ &\leq \int |f(x)| |e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} (e^{-2\pi i \langle x | h \rangle} - 1)| dx \\ &= \int |f(x)| |e^{-2\pi i \langle x | h \rangle} - 1| dx. \end{aligned}$$

La cantidad $|e^{-2\pi i \langle x | h \rangle} - 1|$ tiende a cero conforme $h \rightarrow 0$ por lo que aplicando el teorema de convergencia dominada tenemos que $|\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$ independiente de ξ .

Lema 2.1.3 (Riemann-Lebesgue). Si $f \in L^1$, entonces $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ cuando $\|\xi\| \rightarrow \infty$. Es decir, $\hat{f} \in C_0$.

Prueba

Sea $R = \times_{i \in [d]} [a_i, b_i] \subseteq \mathbb{R}^d$ un rectángulo en \mathbb{R}^d . Si $f = 1_R$ entonces tenemos que $f = \prod_{i \in [d]} 1_{[a_i, b_i]}$. **aaaa me perdí**
Vale entonces

$$\hat{1}_{[a,b]}(\xi) = \int_a^b e^{-2\pi i x \xi} dx = \int_a^b (\cos(-2\pi x \xi) + i \sin(-2\pi x \xi)) dx.$$

Esta cantidad resulta ser $\frac{-1}{2\pi i \xi} (e^{-2\pi i b \xi} - e^{-2\pi i a \xi})$ que tiende a cero cuando $|\xi| \rightarrow \infty$. Así $\hat{1}_R(\xi) \rightarrow 0$ cuando $\|\xi\| \rightarrow \infty$.

Para $f \in L^1$ en general, aproximamos con funciones simples cuyas indicadoras son sobre rectángulos.

Recuerde que la convolución de funciones en L^1 es

$$f * g(x) = \int f(x - y)g(y)dy.$$

La convolución es cerrada en L^1 , es asociativa y conmutativa.

Teorema 2.1.4. Tome $f \in L^p, g \in L^1$ para $p \in [1, \infty]$. Entonces $f * g \in L^p$ y $\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$.

De este resultado extraemos que la convolución hereda las propiedades más bonitas de sus operandos.

Prueba

Por Minkowski tenemos

()

finish

Proposición 2.1.5. Para $f, g \in L^1$ vale que:

(a) $\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f)\mathcal{F}(g)$.

(b) $\mathcal{F}(\tau_h f)(\xi) = e^{-2\pi i \langle h | \xi \rangle} \mathcal{F}(f)(\xi)$. Es decir, traslación se convierte en modulación.

(c) Si $A \in O(d)$, el grupo ortogonal en d dimensiones, entonces

$$\mathcal{F}(f(A \cdot))(\xi) = \mathcal{F}(f(A\xi)).$$

(d) Si $f_\lambda(x) = \frac{1}{\lambda^d} f\left(\frac{x}{\lambda}\right)$ entonces $\mathcal{F}(f_\lambda)(\xi) = \mathcal{F}(f)(\lambda\xi)$.

(e) $\mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\xi) = 2\pi i \xi_j \mathcal{F}(f)(\xi)$, cuando $f_j \in L^1$. Y para el otro lado, $\mathcal{F}(-2\pi i x_j f)(\xi) = \frac{\partial}{\partial \xi_j} \mathcal{F}(f)(\xi)$ cuando $x_j f \in L^1$.

Prueba

Primero, la transformada de la convolución es

$$\int_{\mathbb{R}^d} (f * g)(x) e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} dx = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) g(y) dy \right) e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} dx.$$

Como $x = x - y + y$ separamos la exponencial por linealidad del producto escalar en $e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} = e^{-2\pi i \langle x-y | \xi \rangle} e^{-2\pi i \langle y | \xi \rangle}$. Ahora, separamos las integrales en

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) e^{-2\pi i \langle x-y | \xi \rangle} dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}^d} g(y) e^{-2\pi i \langle y | \xi \rangle} dy \right) = \mathcal{F}(f)\mathcal{F}(g).$$

2. ANÁLISIS DE FOURIER

Para el segundo inciso, la acción del operador de traslación sobre f es $f(x) \mapsto f(x - h)$, entonces tenemos que

$$\mathcal{F}(\tau_h f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x - h) e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} dx.$$

Aplicando el cambio de variables $x \mapsto x + h$ llegamos a

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle x + h | \xi \rangle} dx = e^{-2\pi i \langle h | \xi \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} dx = e^{-2\pi i \langle h | \xi \rangle} \mathcal{F}(f)(\xi).$$

Tomemos $A \in O(d)$, entonces

$$\mathcal{F}(f(Ax))(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(Ax) e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} dx.$$

Mapeamos x a $A^{-1}x$ que coincide con $A^T x$ y como A es ortogonal, entonces $|\det A| = 1$. Así la transformada Es

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle A^T x | \xi \rangle} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle x | A\xi \rangle} dx = \mathcal{F}(f)(A\xi).$$

Tomamos ahora la transformada de la dilatación y vemos que

$$\mathcal{F}(f_\lambda)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{\lambda^d} f\left(\frac{x}{\lambda}\right) e^{-2\pi i \langle A^T x | \xi \rangle} dx.$$

Luego tomando el cambio de variables $x \mapsto \lambda x$, el término λ^{-d} está listo para cancelar al determinante y así resulta en

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle \lambda x | \xi \rangle} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle x | \lambda \xi \rangle} dx \mathcal{F}(f)(\lambda \xi).$$

Ver [4] pgs 385-386 o usar integración por partes

Note que a partir del último punto, podemos iterar con derivadas de orden superior

cuando todo esté bien definido. Vale por ejemplo que

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}\right)(\xi) = (2\pi i \xi_j)(2\pi i \xi_k) \mathcal{F}(f)(\xi).$$

Naturalmente nos preguntamos,

¿Se puede recuperar f por medio de $\mathcal{F}(f)$?

Cuando se trabaja con series de Fourier, se puede recuperar f por medio de sus coeficientes de Fourier. Lo esperado es que $f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi$. Pero \hat{f} no necesariamente es integrable.

La clase de Schwartz

Indistintamente hablaremos de la derivada parcial de f respecto a x_j como $\partial_j f$ o $D_j f$. La m -ésima derivada será en su lugar $\partial_j^m f$ o $D_j^m f$. Introducimos brevemente la notación multi-índice, si $\alpha \in \mathbb{N}^d$ entonces

$$D^\alpha f = D_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot D_d^{\alpha_d} f.$$

Por ejemplo $D^{(3,1,4)} f = \frac{\partial^8 f}{\partial x_1^3 \partial x_2 \partial x_3^4}$. También tenemos $\alpha! = \prod \alpha_j!$ y $x^\alpha = \prod x_j^{\alpha_j}$.

Definición 2.1.6. Una función f está en la clase de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ si es infinitamente diferenciable y todas sus derivadas decrecen rápidamente a infinito. Es decir para α, β multi-índices vale

$$\sup_{\mathbb{R}^d} |x^\alpha D^\beta f(x)| = \rho_{\alpha, \beta}(f) < \infty.$$

Inmediatamente de la definición $\mathcal{C}_c^\infty \subseteq \mathcal{S}$, también $\rho_{\alpha, \beta}$ es una seminorma lo que nos puede llevar a una topología. El conjunto $\{\rho_{\alpha, \beta}\}$ es una familia contable. Entonces $(f_n) \rightarrow 0$ en \mathcal{S} cuando $\rho_{\alpha, \beta}(f_n) \rightarrow 0$ para α, β son cualquier multi-índice. Podemos ver que \mathcal{S} es un espacio de Fréchet, la métrica que se puede definir es

$$d(f, g) = \sum_{j \in \mathbb{N}} \frac{\rho_j(f - g)}{2^j (1 + \rho_j(f - g))},$$

donde (ρ_j) es una enumeración de las seminormas.

Teorema 2.1.7. *Ocorre que \mathcal{S} es denso en L^p para $p \in [1, \infty[$.*

Note que si valiese que $\mathcal{S} \subseteq L^p$ entonces, como $\mathcal{C}_c^\infty \subseteq \mathcal{S}$ y \mathcal{C}_c^∞ es denso ya entonces estaríamos listos. Basta probar que el espacio de Schwartz está en L^p .

2. ANÁLISIS DE FOURIER

Prueba

Tome $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$\begin{aligned} \int |f|^p dx &= \int (1 + |x|^{d+1}) \frac{|f|}{1 + |x|^{d+1}} \\ &\leq \int \frac{c(|f| + \sum_{j \in [d]} |x_j|^{2d+2} |f|)^p}{(1 + |x|^{d+1})^p} dx \\ &\leq \int \frac{c(\rho_{0,0} f + \sum_{j \in [d]} \rho_{(2d+2)e_j,0} f)^p}{(1 + |x|^{d+1})^p} dx \\ &\leq c_2 \int \frac{dx}{(1 + |x|^{d+1})^p} < \infty \end{aligned}$$

no terminé

En particular, el espacio de Schwartz está contenido en L^1 y por tanto podemos definir la transformada de Fourier en \mathcal{S} .

Teorema 2.1.8. El mapeo $f \mapsto \hat{f}$ es continuo sobre \mathcal{S} y cumple:

(a) $\int f \hat{g} = \int \hat{f} g.$

(b) Vale la fórmula de inversión

$$f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi.$$

Precisamos un par de lemas antes de probar este resultado. Note que la fórmula de inversión tiene *casi* la misma forma que la fórmula que la transformada ordinaria. En cierto sentido $f(x) = \hat{\hat{f}}(-x)$.

Lema 2.1.9. Si $f(x) = e^{-\pi \|x\|^2}$, entonces $\hat{f} = f$.

Prueba

me salté la prueba, DO

Ahora podemos probar el teorema de la fórmula de inversión.

Prueba

Tenemos que para $f \in \mathcal{S}$ y α, β multi-índices vale que

$$\begin{aligned}\xi^\alpha D^\beta \hat{f}(\xi) &= (\prod \xi_j^{\alpha_j})(D_{\xi_1}^{\beta_1} \dots D_{\xi_d}^{\beta_d}) \hat{f}(\xi) \\ &= C(\mathcal{F}((D_{\xi_1}^{\beta_1} \dots D_{\xi_d}^{\beta_d})(\prod_{j \in [d]} x_j^{\beta_j}))) \dots\end{aligned}$$

$D^\alpha(x^\beta f)$ es una suma de monomios por derivadas de f .

2.2. Día k+1 | 20210204

La transformada de Fourier en L^2

anotación sobre el conjugado y extensión a L^2 .

En L^2 por tanto existe una extensión de la transformada de Fourier. Los límites en el enunciado del teorema son consecuencia de la continuidad de la transformada pues lo que tenemos es que $f \mathbf{1}(B(0, R)) \rightarrow f$ y $\hat{f} \mathbf{1}(B(0, R)) \rightarrow \hat{f}$ donde ambas convergen en L^2 . Esto se conoce como extender el operador por densidad y más adelante veremos cómo extender esto a L^p para $p > 2$.

Vimos que en L^1 no necesariamente hay inversa de la transformada porque esta no necesariamente es integrable. Tomemos $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, esperamos que $f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi$ en algún sentido de convergencia. Sin embargo no estamos asumiendo que \hat{f} es integrable, puede que dicha integral ni siquiera tenga sentido. Aún siendo f la indicadora de un intervalo, la integral en cuestión no existe.

Ejemplo 2.2.1. Si $f = \mathbf{1}([-a, a])$, entonces $\hat{f}(\xi) = \frac{\sin(\pi a \xi)}{\pi a \xi}$ y esta función no es integrable en el sentido de Lebesgue.

Dado esto, necesitamos aplicar métodos de sumabilidad.

Definición 2.2.2. Sea $\varepsilon > 0$, definimos la media de Abel de f como

$$A_\varepsilon f = \int_{\mathbb{R}^d}$$

Definición 2.2.3. Si definimos $G_\varepsilon f = \int f(x) e^{-\varepsilon \|x\|^2} dx$ para $\varepsilon > 0$, entonces decimos que $\int f$ es Gauss sumable a ℓ si $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} G_\varepsilon f = \ell$.

2. ANÁLISIS DE FOURIER

Ambos promedios se pueden escribir de la forma

$$M_{\varepsilon, \Phi} f = M_{\varepsilon} f = \int_{\mathbb{R}^d} \Phi(\varepsilon x) f(x) dx$$

con $\Phi \in \mathcal{C}_0$ y $\Phi(0) = 1$.

Entonces la idea es modificar un poco las cosas para obtener cierta convergencia. Para lo que queremos hacer, necesitamos las transformadas de Fourier de $e^{-\varepsilon \|x\|^2}$ y $e^{-\varepsilon \|x\|}$. Sabemos que $\mathcal{F}(e^{-\pi \|x\|^2})(\xi) = e^{-\pi \|\xi\|^2}$ por lo que para tener la de ε basta con hacer una dilatación. Si llamamos $g(x) = e^{-\pi \|x\|^2}$, entonces $e^{-\varepsilon \|x\|^2} = g\left(\sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}} x\right)$ y como $\mathcal{F}(\lambda^{-d} h(\lambda^{-1} x)) = \hat{h}(\lambda \xi)$, entonces tendremos que

$$\mathcal{F}(e^{-\varepsilon \|x\|^2})(\xi) = \text{calc.}$$

Teorema 2.2.4. En general, si $a > 0$, tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi a \|x\|^2} e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} dx = a^{-\frac{d}{2}} e^{-\frac{\pi}{a} \|\xi\|^2}.$$

También vale que

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi a \|x\|} e^{-2\pi i \langle x | \xi \rangle} dx = c(d) \frac{a}{(a^2 + \|\xi\|^2)^{\frac{d+1}{2}}}$$

$$\text{con } c(d) = \frac{\Gamma\left(\frac{d+1}{2}\right)}{\pi^{\frac{d+1}{2}}}.$$

Prueba

Ejercicio

Para simplificarnos los cálculos, llamemos $W = W(\xi, a) = \mathcal{F}(e^{-4\pi^2 a \|\cdot\|^2})$ y $P = P(\xi, a) = \mathcal{F}(e^{-2\pi a \|\cdot\|})$. A W lo conocemos como el núcleo de Gauss-Weierstrass y P como el núcleo de Poisson.

Así, queremos probar que las medias de Abel y Gauss de $\int \hat{f} \exp(2\pi i \langle x | \xi \rangle) d\xi$ convergen a f en norma y casi por doquier. Esto nos diría que

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} w(\xi) d\xi$$

lo que nos permite recuperar f por medio de su transformada.

Tomemos $\Phi \in \mathcal{C}_0 \cap L^1$, con $\Phi(0) = 1$. Llame $\varphi = \hat{\Phi}$ y $\varphi_\lambda = \lambda^{-d}\varphi(\lambda^{-1}x)$ para λ positivo. Con esta notación vale que

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= \exp(-4\pi^2 \|x\|^2) \Rightarrow \varphi_\varepsilon = W(\text{algo}), \\ \Phi(x) &= \exp(-2\pi \|x\|) \Rightarrow \varphi_\varepsilon = P(\xi, \varepsilon).\end{aligned}$$

Teorema 2.2.5. Si $f, \Phi \in L^1(\mathbb{R}^d)$ y $\varphi = \hat{\Phi}$, entonces

$$\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} \Phi(\varepsilon \xi) d\xi = \int f(x) \varphi_\varepsilon(x - \xi) dx, \quad \varepsilon > 0.$$

En particular, $\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} e^{-2\pi \varepsilon \|\xi\|} d\xi = \int f(x) P(x - \xi, \varepsilon) dx$.

La prueba del teorema se basa en la fórmula $\int f \hat{g} = \int \hat{f} g$ a f y a $\Phi(\varepsilon x) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle}$. Resta por notar que los núcleos con los que estamos trabajando, ambos integran a uno. La prueba de estos hechos es un **ejercicio**.

Teorema 2.2.6. Si $\varphi \in L^1$ con $\int \varphi = 1$ y para $\varepsilon > 0$ definimos $\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$, entonces si $f \in L^p \cup \mathcal{C}_0$ para $1 \leq p < \infty$, vale que

$$\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

Por otro lado, cuando f sólo está en \mathcal{C}_0 , la convergencia es en norma de L^∞ . En particular $\int f(\xi) P(x - \xi, \varepsilon) d\xi$ y $\int f(\xi) W(x - \xi, \varepsilon) d\xi$ convergen a f en L^p cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.

2.3. Día k+2 | 20210208

Un breve resumen

Teníamos una función $\Phi \in L^1$, con $\hat{\Phi} = \varphi$ y $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\varphi(\varepsilon^{-1}x)$. El efecto del ε en el argumento es dilatar un poco el dominio mientras que el exterior dilata el rango, más su uso es normalizar el determinante del Jacobiano en \mathbb{R}^d .

En el contexto del teorema 2.2.5, la integral

$$\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} \Phi(\varepsilon \xi) d\xi$$

se conoce como la Φ -media ó Φ -promedio de $\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi$. Lo que quisiéramos es que el término $f * \varphi_\varepsilon$, al que la Φ -media es igual, sea convergente a f en algún sentido. Porque así tendremos que las medias de la integral convergen lo que nos dará convergencia de la transformada en algún sentido.

Ejemplo 2.3.1. Nosotros teníamos varios ejemplos de estas funciones.

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= e^{-2\pi\|x\|}, \quad \varphi(\xi) = \frac{c_d}{(1 + \|\xi\|^2)^{\frac{d+1}{2}}}, \quad \Phi(\varepsilon x) = e^{-2\pi\varepsilon\|x\|}, \quad \varphi_\varepsilon(\xi) = \frac{\varepsilon c_d}{(\varepsilon^2 + \|\xi\|^2)^{\frac{d+1}{2}}}, \\ \Phi^g(x) &= e^{-\pi\|x\|^2}, \quad \varphi^g(\xi) = e^{-\pi\|\xi\|^2}, \quad \Phi^g(\varepsilon x) = e^{-\pi\varepsilon^2\|x\|^2}, \quad \varphi_\varepsilon^g(\xi) = \varepsilon^{-d} e^{-\pi\varepsilon^{-2}\|\xi\|^2}.\end{aligned}$$

A la función $P(\xi, \varepsilon) = \varphi_\varepsilon(\xi)$, se le conoce como el núcleo de Poisson y es la transformada de Fourier de $\Phi(\varepsilon x)$. Mientras que

$$W(\xi, \varepsilon) = (4\pi\varepsilon)^{-\frac{d}{2}} e^{-\frac{\|\xi\|^2}{4\varepsilon}} = \varphi_{2\sqrt{\pi\varepsilon}}^g(\xi)$$

es una dilatación de φ_g y la transformada de $\Phi^g(2\sqrt{\pi\varepsilon}x) = e^{-4\pi^2\varepsilon\|x\|^2}$. A esta función se le conoce como el núcleo de Gauss-Weierstrass.

Con estos dos núcleos podemos aplicar el teorema 2.2.5. Nada más recordamos un lema antes de proseguir.

Lema 2.3.2. *Vale que $\int W(\xi, \varepsilon) d\xi = \int P(\xi, \varepsilon) d\xi = 1$ para $\varepsilon > 0$.*

La integral del núcleo de Poisson requiere de cambios a coordenadas polares mientras que el de Poisson sí requiere integración compleja o técnicas que veremos más adelante. Probamos ahora el teorema 2.2.6.

Prueba

Lo primero es notar que

$$\int \varphi_\varepsilon(x) dx = \int \frac{1}{\varepsilon^d} \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) dx \stackrel{y=\frac{x}{\varepsilon}}{=} \int \varphi(y) dy = 1.$$

Y con esta observación vemos que

$$f * \varphi_\varepsilon - f = \int f(x-y) \varphi_\varepsilon(y) dy - f(x) \int \varphi_\varepsilon(y) dy = \int (f(x-y) - f(x)) \varphi_\varepsilon(y) dy,$$

donde buscamos estimar la norma L^p de la última cantidad.

Estamos ante una situación favorable pues φ_ε está controlado ya que tiene integral 1, y como f es “bien portada”, la diferencia debería también tener un

comportamiento razonable. La norma L^p buscada es

$$\begin{aligned}
 \|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p &= \left(\int \left| \int (f(x-y) - f(x)) \varphi_\varepsilon(y) dy \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\
 \text{(Minkowski)} &\leq \int \left(\int (|f(x-y) - f(x)| |\varphi_\varepsilon(y)|)^p dx \right)^{\frac{1}{p}} dy \\
 &= \int \left(\int |f(x-y) - f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} |\varphi_\varepsilon(y)| dy \\
 \left(\begin{smallmatrix} \varepsilon^{-1} y \mapsto y \\ dy \mapsto \varepsilon^{-d} dy \end{smallmatrix} \right) &= \int \left(\int |f(x - \varepsilon y) - f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} |\varphi(y)| dy.
 \end{aligned}$$

Esta última expresión ya se ve mejor pues $\varphi \in L^1$ y la otra integral se puede acotar por $2 \|f\|_p$. Es decir acotamos por un múltiplo de una función integrable. Si podemos ver que esto converge a cero, podemos aplicar el teorema de convergencia dominada.

Si f es continua y de soporte compacto, entonces es fácil ver que $\int |f(x - \varepsilon y) - f(x)|^p dx$ tiende a cero. Al integrar sobre un compacto de medida finita obtenemos la cota de ε por la medida del soporte y por continuidad la diferencia tiende a cero. Luego por densidad^a en L^p , este procedimiento vale para $f \in L^p$.

Concluimos, por el teorema de convergencia dominada, que $\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \rightarrow 0$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.

^aUna prueba de este hecho genera una función explícita a partir del lema de Urysohn.

Pegamos esto con el teorema 2.2.5 para ver que la integral $\int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} w(\xi) d\xi$ va a converger a $f(x)$ en norma L^p . A manera de corolario entonces tenemos:

Corolario 2.3.3. Si $f, \Phi \in L^1$, y $\varphi = \hat{\Phi} \in L^1$ con $\int \varphi = 1$, entonces

$$\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} \Phi(\varepsilon \xi) d\xi \xrightarrow{L^p} f(x), \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

Entonces con esto vemos que la integral de la transformada inversa no converge por si sola sino que requiere ayuda del Φ -promedio. Al menos podemos recuperar de una forma la función original a partir de la transformada de Fourier.

El caso particular de este resultado es usar los núcleos de Gauss-Weierstrass y Poisson.

Corolario 2.3.4. Si $f \in L^1$, entonces vale que:

2. ANÁLISIS DE FOURIER

$$\diamond \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} e^{-4\pi^2 \varepsilon \|\xi\|^2} d\xi \xrightarrow{L^1} f(x) \text{ cuando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

$$\diamond \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} e^{-2\pi \varepsilon \|\xi\|} d\xi \xrightarrow{L^1} f(x) \text{ cuando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Hasta ahora hemos visto que la integral de la transformada de Fourier sólo tiene sentido cuando asumimos que f es integrable, la integral que define la transformada inversa también tiene sentido cuando f es integrable. Pero aún cuando tiene sentido no quiere decir que la integral resulte ser f .

Corolario 2.3.5. *Suponga que ambas f y \hat{f} están en L^1 , entonces vale*

$$f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi$$

casi por doquier.

Prueba

El corolario anterior garantiza que

$$\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} e^{-4\pi^2 \varepsilon \|\xi\|^2} d\xi \xrightarrow{L^1} f(x)$$

donde ahora el término $\hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} e^{-4\pi^2 \varepsilon \|\xi\|^2}$ está dominado. La primera exponencial tiene módulo 1 y la otra es una exponencial real con exponente negativo y así, está acotado por 1. Entonces todo está dominado por \hat{f} que está en L^1 .

Por convergencia dominada, vale que

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} e^{-4\pi^2 \varepsilon \|\xi\|^2} d\xi = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi$$

en L^1 lo que garantiza convergencia casi por doquier.

Recordemos ahora que cuando $f \in L^1$, su transformada es uniformemente continua y si a su vez la transformada está en L^1 , lo mismo ocurre para $\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi$. Eso quiere decir que $f(x)$ es igual casi por doquier a una función uniformemente continua. Para efectos de la medida, f es continua. En cuyo caso, la igualdad $f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi$ pasa de ser casi por doquier a siempre. Si no, se puede modificar en un conjunto de medida cero para que sea continua y la igualdad valga para todo x . Sin embargo, estamos asumiendo algo bastante fuerte que es que $\hat{f} \in L^1$ y eso no siempre es el caso.

Del resultado anterior se desprende que cuando la transformada es cero, f es cero casi por doquier. También podemos verlo incluso del corolario 2.3.3 anterior, pues f va a ser el límite de cosas que son cero.

Corolario 2.3.6 (Unicidad de la transformada). Si $f, g \in L^1$ y $\hat{f} = \hat{g}$, entonces $f = g$ casi por doquier.

Prueba

Sea $h = f - g$, entonces $\hat{h} = 0$. Luego, por el teorema 2.2.6 vale

$$\left\| \int \hat{h}(\xi) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} \Phi(\varepsilon \xi) d\xi - h(x) \right\|_1 \rightarrow 0$$

y como los términos de la izquierda son cero, se sigue que $\|h\|_1 \rightarrow 0$. Concluimos que $h = 0$ casi por doquier.

Convergencia puntual

Hemos hablado de convergencia en norma, pero ahora vamos a hablar de convergencia puntual. Esto porque vamos a eliminar la suposición de que \hat{f} está en L^1 y vamos a usar herramientas distintas. Algunas de estas serán el teorema de diferenciación de Lebesgue, la fórmula de coordenadas polares en \mathbb{R}^d y la desigualdad de Hölder.

Teorema 2.3.7 (Diferenciación de Lebesgue). Si $f \in L^1_{loc}$, entonces

$$\frac{1}{m(B_r(0))} \int_{B_r(0)} (f(x-y) - f(x)) dy \rightarrow 0$$

conforme $r \rightarrow 0$.

Recuerde que f es localmente integrable si integrable en cualquier compacto de \mathbb{R}^d . Y el conjunto de puntos tales que la expresión anterior pero con valor absoluto

$$\frac{1}{m(B_r(0))} \int_{B_r(0)} |f(x-y) - f(x)| dy$$

tiende a cero, se conoce como el conjunto de Lebesgue de f , \mathcal{L}_f . Es sabido que $m(\mathcal{L}_f^c) = 0$. Anotamos $m(B_r(0))$ como $\alpha(d)r^d$ donde $\alpha(d)$ es $m(B_1(0))$, la medida de la bola unitaria en d dimensiones.

Esto quiere decir que podemos reemplazar la medida de la bola por la cantidad r^d . Nos permitimos describir el conjunto de Lebesgue como

$$\mathcal{L}_f = \left\{ x \in \mathbb{R}^d : \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^d} \int_{\|y\| \leq r} |f(x-y) - f(x)| dy = 0 \right\}$$

2. ANÁLISIS DE FOURIER

Teorema 2.3.8. Sea $\varphi \in L^1$ y $\psi(x) = \text{ess sup}_{\|y\| \geq \|x\|} |\varphi(y)|$. Si $\psi \in L^1$ y $f \in L^p$ para $1 \leq p \leq \infty$, entonces

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f * \varphi_\varepsilon)(x) = f(x) \int \varphi(y) dy$$

para $x \in \mathcal{L}_f$.

Vea que ψ decrece en función de la norma de x pues conforme $\|x\|$ crece, a la y se le van agotando las opciones. Note que en particular $f * P_\varepsilon$ y $f * W_\varepsilon$ convergen a $f(x)$ casi por doquier pues al aplicar el teorema, la integral de φ en este caso sería 1.

La idea principal de este resultado es que ψ es una función mucho más grande que φ , entonces cuando está en L^1 hay convergencia casi por doquier ya que x está en el conjunto de Lebesgue. A saber, los núcleos de Poisson y Gauss-Weierstrass cumplen la hipótesis de este teorema.

Previo a comenzar, hacemos un recorrido con coordenadas polares. Si

$$g(r) = \int_{\|x\|=1} |f(x - rt) - f(x)| dt,$$

estamos integrando sobre una esfera de radio r . La fórmula de coordenadas polares es hacer esto pero variando el radio. Reescribimos la condición del conjunto de Lebesgue como

$$r \leq \eta \Rightarrow \frac{1}{r^d} \int_0^r s^{d-1} \int_{\|x\|=1} |f(x - st) - f(x)| dt ds < \delta$$

que se obtiene después de aplicar Fubini y un cambio de variables. La condición anterior se escribe nuevamente como $\int_0^r s^{d-1} g(s) ds \leq \delta r^d$ y llamamos $G(r)$ a toda la integral. G es una función absolutamente continua y diferenciable casi por doquier, su derivada es $G'(r) = r^{d-1} g(r)$.

Prueba

Sea $x \in \mathcal{L}_f$, entonces el correspondiente límite tiende a cero. Así sea $\delta > 0$, existe $\eta > 0$ tal que

$$r \leq \eta \Rightarrow \frac{1}{r^d} \int_{\|y\| \leq r} |f(x - y) - f(x)| dy < \delta.$$

Llamemos $a = \int \varphi = \int \varphi_\varepsilon$ para $\varepsilon > 0$, y queremos ver que $|f * \varphi_\varepsilon(x) - f(x)a|$ tiende a cero. Podemos dividir esta cantidad en dos integrales de la siguiente

manera

$$\left| \int (f(x-y) - f(x)) \varphi_\varepsilon(y) dy \right| \leq \underbrace{\left| \int_{\|y\| < \eta} \right|}_{I_1} + \underbrace{\left| \int_{\|y\| \geq \eta} \right|}_{I_2}.$$

Queremos convertir estas cantidades en algo pequeño cuando ε es pequeño. Estimamos I_1 primero, para ello notamos que $\psi(x)$ es una función radial. Podemos decir $\psi_0(r) = \psi(x)$ cuando $\|x\| = r$ y así ψ_0 decrece respecto a r . Vemos que la integral

$$\int_{\frac{r}{2} \leq \|x\| \leq r} \psi(x) dx$$

tiende a cero cuando $r \rightarrow 0$ porque ψ es integrable. Y cuando $r \rightarrow \infty$, la integral es una cola de una integral de una función en L^1 y por tanto tiende a cero. Como ψ es no negativa, entonces el mínimo valor de la función es el máximo en su dominio. Es decir

$$\int_{\frac{r}{2} \leq \|x\| \leq r} \psi(x) dx \geq \int_{\frac{r}{2} \leq \|x\| \leq r} \psi_0(r) dx = \psi_0(r) \omega_d \left(r^d - \frac{r^d}{2^d} \right) = \psi_0(r) \omega_d r^d \left(\frac{2^d - 1}{2^d} \right)$$

y esta expresión de abajo tiende a cero. Como las potencias de 2 son constantes entonces se sigue que $r^d \psi_0(r) \rightarrow 0$ conforme $r \rightarrow 0$ y $r \rightarrow \infty$. Además $r^d \psi_0(r)$ está acotado para $r > 0$. Acotamos I_1 como

$$I_1 \leq \int_{\|y\| \leq \eta} |f(x-y) - f(x)| \psi_\varepsilon(y) dy = \int_0^\eta r^{d-1} g(r) \varepsilon^{-d} \psi_0 \left(\frac{r}{\varepsilon} \right) dr,$$

y ahí lo que acaba de pasar es que $\psi_\varepsilon(y) = \frac{1}{\varepsilon^d} \psi \left(\frac{y}{\varepsilon} \right)$. Como ψ es radial, es constante en cada esfera y entonces sale de la integral $\int_{\|x\|=1}$ en la representación polar. La $g(r)$ que resulta es la integral nada más. Esta integral se puede evaluar por partes como

$$\int_0^\eta \underbrace{r^{d-1} g(r)}_{G'(r)} \varepsilon^{-d} \psi_0 \left(\frac{r}{\varepsilon} \right) dr = G(r) \varepsilon^{-d} \psi_0 \left(\frac{r}{\varepsilon} \right) \Big|_0^\eta - \int_0^\eta G(r) \frac{d}{dr} \left(\varepsilon^{-d} \psi_0 \left(\frac{r}{\varepsilon} \right) \right) dr$$

y como $G(r)$ está acotado δr^d , la última cantidad está acotada por

$$\delta r^d \varepsilon^{-d} \psi_0 \left(\frac{r}{\varepsilon} \right) \Big|_0^\eta - \int_0^{\frac{\eta}{\varepsilon}} G(\varepsilon s) \varepsilon^{-d} \psi_0'(s) ds.$$

El lector cuidadoso notará que $r^d \varepsilon^{-d} \psi_0\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) = \left(\frac{r}{\varepsilon}\right)^d \psi_0\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)$ y esto, según lo discutido anteriormente, está acotado. También $G(\varepsilon s) \leq \delta(\varepsilon s)^d$ y por tanto acotamos con

$$\delta B - \int_0^{\frac{\eta}{\varepsilon}} \delta s^d \psi'_0(s) \mathbf{d}s = \delta \left(B - \int_0^{\frac{\eta}{\varepsilon}} s^d \psi'_0(s) \mathbf{d}s \right) \leq \delta \left(B - \int_0^{\infty} s^d \psi'_0(s) \mathbf{d}s \right).$$

Ahora, esta integral que queda la trabajamos por partes

$$\begin{aligned} - \int_0^{\infty} s^d \psi'_0(s) \mathbf{d}s &= \overbrace{-s^d \psi_0(s)}^0 \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} d s^{d-1} \psi_0(s) \mathbf{d}s = d \int_0^{\infty} s^{d-1} \psi_0(s) \mathbf{d}s \\ &= d \int_0^{\infty} s^{d-1} \frac{1}{\sigma(\partial B_1(0))} \int_{\|x\|=1} \psi_0(s) \mathbf{d}t \mathbf{d}s \\ &= d \int_0^{\infty} s^{d-1} \frac{1}{\sigma(\partial B_1(0))} \int_{\|x\|=1} \psi_0(st) \mathbf{d}t \mathbf{d}s \\ &= \frac{d}{\sigma(\partial B_1(0))} \int_0^{\infty} s^{d-1} \int_{\|x\|=1} \psi_0(st) \mathbf{d}t \mathbf{d}s \\ &= \frac{d}{\sigma(\partial B_1(0))} \int_{\mathbb{R}^d} \psi(x) \mathbf{d}x = C. \end{aligned}$$

Esto se encarga de I_1 pues dado lo anterior $I_1 \leq \delta(B + C)$. El primer término en la fórmula se anula por el razonamiento que hicimos al principio sobre la función ψ .

Rápidamente, la tercera igual se sigue de la fórmula de coordenadas polares y la que está a continuación es cierta por que ψ es constante en el radio. Ya la penúltima es la fórmula de coordenadas polares y la devolvemos a coordenadas rectangulares para obtener el resultado.

2.4. Día k+3 | 20210209

Continuamos con la prueba de la lección anterior. De momento teníamos que

$$|f * \varphi_\varepsilon(x) - f(x)| \leq I_1 + I_2$$

donde $I_1 \leq \delta C_1$ para $\varepsilon \leq \eta$ donde η sale del teorema 2.3.7 de diferenciación de Lebesgue. Falta por acotar

$$I_2 = \left| \int_{\|y\| \geq \eta} (f(x-y) - f(x)) \varphi_\varepsilon(y) dy \right|$$

y con esto, resumimos la prueba.

La integral la I_2 la cambiamos a todo \mathbb{R}^d multiplicando por la indicadora $\mathbf{1}(\|y\| \geq \eta) = \chi$. Vale que

$$I_2 \leq \left| \int f(x-y) \chi(y) \psi_\varepsilon(y) dy \right| + \left| \int f(y) \chi(y) \psi_\varepsilon(y) dy \right|$$

y aplicando la desigualdad de Hölder acotamos con

$$\leq \|f\|_p \|\chi \psi_\varepsilon\|_q + \|f\|_1 \|\chi \psi_\varepsilon\|_1.$$

Para encargarnos del segundo término vemos que

$$\|\chi \psi_\varepsilon\|_1 = \int_{\|y\| \geq \eta} \psi_\varepsilon(y) dy = \int_{\|y\| \geq \frac{\eta}{\varepsilon}} \psi(y) dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

pues el conjunto es el complemento de una bola que crece conforme ε se haga más pequeño. Entonces a final de cuentas esa cantidad es la cola de la integral de una función en L^1 que para x fijo en el conjunto de Lebesgue hace que se cumpla.

Para el primer término tenemos que

$$\|\chi \psi_\varepsilon\|_q = \left(\int \chi \psi_\varepsilon^q \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int (\chi \psi_\varepsilon)^{\frac{q}{p}} \psi_\varepsilon \right)^{\frac{1}{q}}$$

y acotamos el término con la potencia con su norma infinito de manera que

$$\leq \left(\int \|\chi \psi_\varepsilon\|_\infty^{\frac{q}{p}} \psi_\varepsilon \right)^{\frac{1}{q}} = \|\chi \psi_\varepsilon\|_\infty^{\frac{1}{p}} \|\psi_\varepsilon\|_1^{\frac{1}{q}} = \|\chi \psi_\varepsilon\|_\infty^{\frac{1}{p}} \|\psi\|_1^{\frac{1}{q}}.$$

En este caso tenemos que

$$\|\chi \psi_\varepsilon\|_\infty = \sup_x \chi(x) \psi_\varepsilon(x) = \sup_{\|x\| \geq \eta} \psi_\varepsilon(x) = \sup_{\|x\| \geq \eta} \frac{1}{\varepsilon^d} \psi(\varepsilon^{-1}x) = \frac{1}{\varepsilon^d} \psi_0\left(\frac{\eta}{\varepsilon}\right).$$

2. ANÁLISIS DE FOURIER

Recuerde que ψ era una función radial decreciente, entonces el supremo se alcanza cuando $\|x\| = \eta$ y por esto vale la última igualdad. Modificamos un poco la expresión para obtener

$$\eta^{-d} \left(\frac{\eta}{\varepsilon} \right)^d \psi_0 \left(\frac{\eta}{\varepsilon} \right) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

pues habíamos visto $r^d \psi_0(r)$ tiende a cero conforme $r \rightarrow 0$ ó $r \rightarrow \infty$. Por lo tanto I_2 también tiende a cero cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.

En conclusión $|f * \varphi_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \delta C_1$ cuando $\varepsilon < \eta$ y η sólo depende de φ .

Lo que hemos probado es la convergencia puntual de $f * \varphi_\varepsilon$. Ya habíamos probado la convergencia en L^p y aquí lo que hicimos fue agregar una hipótesis sobre la función que ayuda a la sumabilidad. Nada más pedimos que un supremo sea integrable, y para el caso de los núcleos de Poisson y Gauss-Weierstrass se puede calcular dicho supremo esencial.

Como corolario a este resultado tenemos lo siguiente.

Corolario 2.4.1. Sea $f \in L^1$ y $\hat{f} \geq 0$. Suponga que f es continua en cero, entonces $\hat{f} \in L^1$ y vale $f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi$ casi por doquier.

Anteriormente **agregar referencia** vimos que valía la fórmula de inversión cuando \hat{f} era integrable. Aquí el requisito es que la transformada sea positiva. En esencia, aquí lo que ocurre es que cero es un punto de Lebesgue y gracias a esto aplicamos el teorema anterior.

Prueba

Como $0 \in \mathcal{L}_f$ entonces

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int \hat{f}(\xi) \underbrace{e^{2\pi i \varepsilon \|\xi\|}}_{\text{Poisson}} d\xi = f(0).$$

Si $\hat{f} \geq 0$ entonces aplicamos Fatou pues

$$\begin{aligned} \int \hat{f}(\xi) d\xi &= \int \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \varepsilon \|\xi\|} d\xi \\ \text{(Fatou)} &\leq \int \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \varepsilon \|\xi\|} d\xi = f(0) < \infty. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\hat{f} \in L^1$ y así vale la fórmula de inversión casi por doquier.

Aplicando a los casos particulares de los núcleos de Poisson y Gauss-Weierstrass obtenemos el siguiente corolario.

Corolario 2.4.2. *En virtud del resultado anterior vale que:*

$$(a) \int W(\xi, a) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi = e^{-4\pi^2 a \|x\|^2} \text{ para } a \geq 0.$$

$$(b) \int P(\xi, a) e^{2\pi i \langle x | \xi \rangle} d\xi = e^{-2\pi a \|x\|} \text{ para } a \geq 0.$$

Como los núcleos son positivos y continuos en cero vale el corolario anterior. No está demás recordar cuales son las transformadas de Fourier de los núcleos. Tenemos otro corolario más relacionado a los núcleos.

Corolario 2.4.3 (Propiedades de semigrupo). *Sean $a, b > 0$, entonces vale que:*

$$(a) W(\xi, a + b) = \int W(\xi - y, a) W(y, b) dy = (W(\cdot, a) * W(\cdot, b))(\xi).$$

$$(b) P(\xi, a + b) = \int P(\xi - y, a) P(y, b) dy = (P(\cdot, a) * P(\cdot, b))(\xi).$$

Prueba

Las pruebas son totalmente análogas. Probamos sólo el primer inciso.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(W(\cdot, a) * W(\cdot, b))(\xi) &= \mathcal{F}(W(\xi, a)) \mathcal{F}(W(\xi, b)) \\ &= e^{-4\pi^2 a \|\xi\|^2} e^{-4\pi^2 b \|\xi\|^2} = e^{-4\pi^2 (a+b) \|\xi\|^2} \\ &= \mathcal{F}(W(\cdot, a + b))(\xi) \end{aligned}$$

Por unicidad de la transformada tenemos que las funciones son iguales casi por doquier. **revisar xq/ notación es distinta**

Basicamente tenemos una operación binaria con los núcleos que están indexados por un parámetro. Usualmente dichos parámetros satisfacen relaciones con operaciones razonables, en este caso, la convolución.

La transformada de Fourier en L^p

Hasta ahora, cada vez que estamos calculando una transformada de Fourier, estamos tomando la función en L^1 . Hemos probado que hay convergencia en L^p y en ese caso $f \in L^1 \cap L^p$. También se puede definir en la clase de Schwartz pero ese es un conjunto pequeño. En L^2 se define por medio de densidad pues \mathcal{F} es un operador acotado.

Ahora en L^p , no tenemos un operador acotado el cual extender por medio de densidad. Es un ejercicio clásico de teoría de la medida ver que $L^q \subseteq L^p$ cuando $q > p$

2. ANÁLISIS DE FOURIER

y estamos sobre un espacio de medida finita. Pero cuando la medida es infinita no tenemos relación.

La teoría de Fourier en L^p da muchos problemas para trabajar, es un área de estudio activa. Uno de los métodos actuales es trabajar con sumabilidad de Bochner-Riesz y hay varios núcleos que dan convergencia puntual. Primero comenzamos con algo sencillo.

Consideremos $L^1 + L^2$, podemos definir la transformada en ese espacio de una manera natural. Si $f + g \in L^1 + L^2$ entonces la nueva transformada se define como

$$\mathcal{F}_{1,2}(f + g) = \mathcal{F}_1(f) + \mathcal{F}_2(g)$$

y posteriormente omitimos los subíndices. Hay que ver que esta es una buena definición. ¿Qué pasa si tengo dos funciones que tienen la misma suma? Es decir, ¿qué pasa si $f_0 \in L^1, g_0 \in L^2$ cumplen que $f + g = f_0 + g_0$? Pues en ese caso $f - f_0 = g_0 - g$ y así ambas diferencias están en $L^1 \cap L^2$.

La definición de \mathcal{F} en ambos espacios coincide en la intersección. Esto quiere decir que la transformada de Fourier de ambas funciones también es igual. Llegamos a

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f - f_0) = \mathcal{F}(g_0 - g) &\Rightarrow \hat{f} - \hat{f}_0 = \hat{g}_0 - \hat{g} \\ &\Rightarrow \hat{f} + \hat{g} = \hat{f}_0 + \hat{g}_0 \\ &\Rightarrow \mathcal{F}(f + g) = \mathcal{F}(f_0 + g_0) \end{aligned}$$

y por tanto la transformada de Fourier en la suma está bien definida. Veamos un resultado clásico de teoría de la medida a continuación.

Teorema 2.4.4. Sea $p \in [1, 2]$, entonces $L^1 \cap L^2 \subseteq L^p \subseteq L^1 + L^2$.

Prueba

Basicamente si $f \in L^p$ entonces

$$f \mathbf{1}(|f| \geq 1) + f \mathbf{1}(f \leq 1).$$

El exponente p nos permite usar el criterio de comparacion y así ver que una de las dos está en L^1 y la otra en L^2

Con esto podemos definir \mathcal{F} en L^p para $p \in [1, 2]$ por lo menos, se resumen en lo siguiente.

Teorema 2.4.5. Si $f \in L^1$ y $g \in L^p$ para $p \in [1, 2]$, entonces $f * g \in L^p$ y

$$\mathcal{F}(f * g)(\xi) = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)$$

casi por doquier.

Fubini y Hölder se utilizan para probar este resultado. Más adelante, por medio de dualidad, podremos definir la transformada en general.

Distribuciones

2.5. Día k+4 | 20210210

2.6. Día k+5 | 20210211

La vez pasada hemos hablado sobre distribuciones de soporte compacto. Recordemos la definición [ref y agregar defn sig en día anterior](#)

Definición 2.6.1. Para $u \in \mathcal{D}'$, diremos que $\text{supp}(u)$ es la intersección de los cerrados F tales que si $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty$ con $\text{supp}(\varphi) \subseteq F^c$, entonces $(\varphi, u) = 0$.

También vimos que el dual de \mathcal{C}^∞ , el conjunto \mathcal{E}' de las distribuciones con soporte compacto sólo era un nombre. Queremos ver que en efecto tienen soporte compacto de acuerdo con esta definición. Teníamos también la caracterización

$$u \in \mathcal{D}' \iff \forall K \text{ compacto } \exists C > 0, m \in \mathbb{N} (|(f, u)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha f\|_\infty)$$

para $f \in \mathcal{C}_c^\infty$ con $\text{supp}(f) \subseteq K$. Y la caracterización de \mathcal{E}' resulta ser

$$u \in \mathcal{E}' \iff \exists C > 0, m, N \in \mathbb{N} (|(f, u)| \leq \sum_{|\alpha| \leq m} \rho_{\alpha, N}(f))$$

donde $f \in \mathcal{C}^\infty$ y $\tilde{\rho}_{\alpha, N}(f) = \sup_{\|x\| \leq N} |D^\alpha f(x)|$. Veremos que una distribución que cumple esta condición también cumple tener soporte compacto de acuerdo a lo anterior.

Prueba

Sea $u \in \mathcal{E}'$ y $\varphi \in \mathcal{C}^\infty$ tal que $\text{supp}(\varphi) \subseteq B_N(0)^c$ que es un cerrado. Entonces **no entendí bien** $\text{supp}(D^\alpha f(x)) \subseteq B_{N+1}(0)^c$ lo que dice que $D^\alpha f(x) = 0$ para $x \in \overline{B}_N(0)$ y así $\sup_{\|x\| \leq N} |D^\alpha f(x)| = 0$.

La condición equivalente nos dice que

$$|u(f)| = |(f, u)| \leq \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{\|x\| \leq N} |D^\alpha f(x)| = 0.$$

Esto implica que la acción de u sobre f es cero, fuera del cerrado $\overline{B}_N(0)$ la acción de u es cero y por tanto $\text{supp}(u) \subseteq \overline{B}_N(0)$. Concluimos que u tiene soporte

compacto de acuerdo con la definición nueva.

Ahora supongamos que u es de soporte compacto de acuerdo a la definición. Debemos probar la propiedad **referenciar referenciar**. Sea $\eta \in \mathcal{C}^\infty$ tal que $\eta = 1(B_N(0))(1 - 1(B_{N+1}(0)))$ **escribir mejor**. Si consideramos $h(1 - \eta)$ para $h \in \mathcal{C}_c^\infty$, entonces $h(1 - \eta)$ tiene soporte disjunto con u lo que nos dice que

$$(h, u) = (h\eta, u) + (h(1 - \eta), u) = (h\eta, u).$$

Si bien para una función \mathcal{C}^∞ u no puede actuar, por medio de la igualdad descrita podemos definir la acción. Si $f \in \mathcal{C}^\infty$, entonces $(f, u) = (f\eta, u)$ y así u es un funcional lineal que actúa en \mathcal{C}^∞ . Por la caracterización de las distribuciones en \mathcal{D}' vale que

$$|(f\eta, u)| \leq \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha(f\eta)\|_\infty,$$

donde tenemos que nuestro compacto es $K = \overline{B}_{N+1}(0)$ y $f\eta$ tiene soporte en K . Ahora, ¿qué es $D^\alpha(f\eta)$ en norma L^∞ ? Esto es

$$\sup_x |D^\alpha(f\eta)(x)| = \sup_{\|x\| \leq N+1} |D^\alpha(f\eta)(x)|$$

y esta última cantidad es una suma de productos de derivadas de f con derivadas de η de orden menor o igual a α . Las derivadas de η está acotadas por lo que dicho supremo está acotado por una suma finita de seminormas $\rho_{\gamma, N+1}$ para $|\gamma| \leq m$. **finish**

Ejemplo 2.6.2. Si $F = \overline{B}_\varepsilon(x_0)$ y tenemos f tal que $\text{supp}(f) \subseteq \overline{B}_\varepsilon(x_0)^c$, entonces $(f, \partial_{x_0}) = f(x_0) = 0$. Así el soporte de la delta de Dirac es $\text{supp}(\partial_{x_0}) \subseteq \overline{B}_\varepsilon(x_0)$. Pero esto vale para $\varepsilon > 0$ y así vemos que $\text{supp}(\partial_{x_0}) = \{x_0\}$.

Definición 2.6.3. Diremos que una distribución $u \in \mathcal{D}'$ coincide con la función h en un abierto U si

$$(f, u) = \int f(x)h(x)dx, \quad f \in \mathcal{C}_c^\infty(U).$$

Esto quiere decir que hay distribuciones que *se pueden ver como funciones*. Pero no todas las distribuciones cumplen esto. A este tipo de expresión se le conoce como una transformación integral. Cuando esto ocurre, el soporte de la distribución $u - h$ está contenido en U^c . Aquí $u - h = u - L_h = u - \int(\cdot)h(x)dx$. Como en U la diferencia es cero, entonces su soporte está en U^c .

Ejemplo 2.6.4. Sean $a, b \in \mathbb{R}^d$ y $u = |x|^2 + \delta_a + \delta_b$, entonces

$$(f, u) = \int f(x)|x|^2 dx + f(a) + f(b).$$

Si U es un abierto tal que $a, b \notin U$, entonces u coincide con $|x|^2$ en el abierto U .

Teorema 2.6.5. Si $u \in \mathcal{S}'$ y $\varphi \in \mathcal{S}$, entonces $\varphi * u \in \mathcal{C}^\infty$ y además

$$(\varphi * u)(x) = (\tau_x \tilde{\varphi}, u), \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

También para $\alpha \in \mathbb{N}^d$, existen c_α, k_α tales que sus derivadas crecen a lo sumo polinomialmente:

$$|\partial^\alpha(\varphi * u)(x)| \leq c_\alpha(1 + \|x\|)^{k_\alpha}.$$

Y más aún si $\text{supp}(u)$ es compacto, entonces $\varphi * u$ es de Schwartz.

Definición 2.6.6. $h * u$ se define como $(f, h * u) = (\tilde{h} * f, u)$ con $\tilde{h}(x) = h(-x)$.

Esta es la definición de convolución con distribución. Al final es pasarle el trabajo a la función. El teorema lo que dice es que la distribución convolución se puede ver como una función. Se hace la identificación con la función respecto a la cual se integra.

Prueba

Tomemos $f \in \mathcal{S}$, por definición

$$(f, \varphi * u) = (\tilde{\varphi} * f, u) = u \left(\int \tilde{\varphi}(\cdot - y) f(y) dy \right)$$

y podemos ver ese $\tilde{\varphi}$ como una traslación. Entonces esto es

$$u \left(\int \tau_y \tilde{\varphi}(\cdot) f(y) dy \right) = \int u(\tau_y \tilde{\varphi}) f(y)$$

que se asemeja a *operar con elementos de la base*. Este paso se justifica porque u es continua y \int converge en \mathcal{S} . Esto se resume en $L_{u(\tau, \tilde{\varphi})}(f)$ y así $\varphi * u$ corresponde con $u(\tau, \tilde{\varphi})$.

Para ver que es suave calculamos su derivada parcial

$$(\varphi * u)(x + he_j) - (\varphi * u)(x) = \tau_{-he_j}(\varphi * u) \dots$$

rip

Entonces $D_j(\varphi * u)(x) = u(\tau_x(D_j \tilde{\varphi})) = D_j \varphi * u$. El mismo cálculo muestra que $\varphi * u \in \mathcal{C}^\infty$ y que $D^\gamma(\varphi * u) = (D^\gamma \varphi) * u$ para $\gamma \in \mathbb{N}^d$.

calc violento derivada convolución

A fin de cuentas γ está acotado en norma, entonces podemos ver que esto está acotado por

$$\sum_{|\beta| \leq k} \sup_y (1 + |x|^m + |y|^m) |D^{\alpha+\beta} \tilde{\varphi}(y)|.$$

Tomando supremo en y , el término $|y|^m |D^{\alpha+\beta} \tilde{\varphi}(y)|$ está acotado por la seminorma $\rho_{(m, m, \dots, m), \alpha+\beta}(\tilde{\varphi})$ que es una constante. Después de resolver los supremos y demás, esta cantidad termina acotada por $C(1 + \|x\|^m)$. Por lo tanto hay crecimiento polinomial como buscábamos.

finish con Grafakos pag 147

2.7. Ínterin | Tarea

Ejercicio 2.7.1. Probar prop 4 (rip, cual era esta)

Ver 2.1.5

Ejercicio 2.7.2. Muestre que $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ si y sólo si $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^d)$ y $|D^\alpha f(x)| \leq \frac{C(\alpha, N)}{(1 + \|x\|)^N}$ para $\alpha \in \mathbb{N}^d$ y $N \in \mathbb{N}$.

Prueba

Suponga que f está en la clase de Schwartz, entonces vale que

$$\sup_{\mathbb{R}^d} |x^\alpha D^\beta f(x)| < \infty$$

para $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^d$. Ahora observe que el término *multinomial* cumple que

$$|x^\alpha| \leq C(\alpha, d) \|x\|^{|\alpha|} \leq C(\alpha, d) \sum_{\|\beta\| \leq \|\alpha\|} |x^\beta|.$$

La primera desigualdad es quizás la más extraña dada nuestra falta de costumbre a trabajar con términos multinomiales. Es cuestión de escribir lo que está sucediendo y recordar la equivalencia de normas en \mathbb{R}^d . Vea que

$$\begin{aligned} |x^\alpha| &= |x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_d^{\alpha_d}| = |x_1|^{|\alpha_1|} \dots |x_d|^{|\alpha_d|} \\ &\leq (|x_1| + \dots + |x_d|)^{|\alpha_1| + \dots + |\alpha_d|} \leq (c(d) \|x\|_{\ell^2})^{|\alpha|_{\ell^1}} \\ &= C(\alpha, d) \|x\|^{|\alpha|}. \end{aligned}$$

Observe ahora que un término como $(1 + \|x\|)^N$ se puede expande con el teorema del binomio como

$$(1 + \|x\|)^N = \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} \|x\|^j \leq \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} C(j, d) \sum_{\|\beta\| \leq j} |x^\beta|.$$

Ya con esto podemos ver que

$$\begin{aligned} (1 + \|x\|)^N |D^\alpha f(x)| &\leq \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} C(j, d) \sum_{\|\beta\| \leq j} |x^\beta D^\alpha f(x)| \\ &\leq \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} C(j, d) \sum_{\|\beta\| \leq j} \sup_{\mathbb{R}^d} |x^\beta D^\alpha f(x)| = C(\alpha, d) \end{aligned}$$

que es lo que buscábamos.

Por otro lado, al haber resuelto el la dirección anterior, nos sentimos invitados a tomar $N = \|\alpha\|$. De esta manera note que

$$|x^\alpha| \leq C(\alpha, d) \|x\|^{\|\alpha\|} \leq C(\alpha, d)(1 + \|x\|)^{\|\alpha\|}$$

donde la última desigualdad se sigue de que el binomio contempla al término $\|x\|^{\|\alpha\|}$ junto con todas las potencias anteriores. De esta manera vea que

$$|x^\alpha D^\beta f(x)| \leq C(\alpha, d)(1 + \|x\|)^{\|\alpha\|} |D^\beta f(x)| \leq C(\alpha, d) \tilde{C}(\beta, \|\alpha\|).$$

Por tanto, tomando supremos sobre $x \in \mathbb{R}^d$ vemos que $f \in \mathcal{S}$ según nuestra definición original.

Ejercicio 2.7.3. Muestre que si $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, entonces $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

Previo a mostrar este resultado, precisamos un resultado.

Lema 2.7.4. *Bajo la hipótesis del ejercicio, vale que*

$$D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * D^\alpha g.$$

2. ANÁLISIS DE FOURIER

Prueba

Veamos que $D^{e_j}(f * g) = (D^{e_j}f) * g$. Note que

$$\frac{1}{h}(f(y + he_j) - f(y)) - (\partial_j f)(y) \rightarrow 0$$

conforme $h \rightarrow 0$. Además para cada t , hay una constante que acota la expresión. Integramos respecto a $g(x - y)dy$ y vemos que la expresión

$$\int_{\mathbb{R}^d} \left[\frac{1}{h}(f(y + he_j) - f(y)) - (\partial_j f)(y) \right] g(x - y) dy$$

también tiende a cero conforme $h \rightarrow 0$ después de aplicar el teorema de convergencia dominada. Dado esto, vale que $D^{e_j}(f * g) = (D^{e_j}f) * g$ y dado que α es un multi-índice, el caso general se sigue por iteración de este argumento tanto esta misma entrada como en las demás.

Prueba

Aprovechamos tanto el lema como el ejercicio anterior. Note que

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y)g(y)dy \right| \leq C(N) \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |x - y|)^{-N} (1 + |y|)^{-N-d-1} dy,$$

al estar f, g en la clase de Schwartz según la equivalencia. Ahora como

$$(1 + |x - y|)^{-N} \leq (1 + |y|)^N (1 + |x|)^{-N},$$

podemos reemplazar en la desigualdad previa para ver que

$$|(f * g)(x)| \leq C(N) \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |y|)^N (1 + |x|)^{-N} (1 + |y|)^{-N-d-1} dy = O((1 + |x|)^{-N}).$$

Esto confirma que $f * g$ se comporta como $(1 + \|x\|)^N$ en infinito. Para ver que sus derivadas también se comportan igual, utilizamos el lema anterior e intercambiamos con uno de los operandos. De esta manera corroboramos que todas las derivadas decaen en infinito y por tanto $f * g$ pertenece a la clase de Schwartz.

Ejercicio 2.7.5. Sea $(f_n) \subseteq \mathcal{S}$ tal que $f_n \rightarrow f$ en \mathcal{S} . Muestre que $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f}$ y $\check{f}_n \rightarrow \check{f}$ en \mathcal{S} .

Prueba

Considerando $\rho_{\alpha,\beta}(\hat{f}_n - \hat{f})$, buscamos trabajar con el término $|x^\alpha D^\beta(\hat{f}_n - \hat{f})|$. Entonces cocinamos un poco la derivada aplicando propiedades de la transformada. Vale que

$$D^\beta(\hat{f}_n - \hat{f}) = (-2\pi i)^{\|\beta\|} \mathcal{F}(x^\beta(f_n - f))$$

y entonces agregando el x^α tenemos

$$\begin{aligned} (-2\pi i)^{\|\beta\|} x^\alpha \mathcal{F}(x^\beta(f_n - f)) &= \frac{(-2\pi i)^{\|\beta\|}}{(2\pi i)^{\|\alpha\|}} \mathcal{F}(D^\alpha(x^\beta(f_n - f))) \\ \Rightarrow |x^\alpha D^\beta(\hat{f}_n - \hat{f})| &\leq \left| \frac{(-2\pi i)^{\|\beta\|}}{(2\pi i)^{\|\alpha\|}} \right| |\mathcal{F}(D^\alpha(x^\beta(f_n - f)))| \\ &\leq \left| \frac{(-2\pi i)^{\|\beta\|}}{(2\pi i)^{\|\alpha\|}} \right| \|D^\alpha(x^\beta(f_n - f))\|_{L^1}. \end{aligned}$$

Como la multiplicación por polinomios y las derivadas son aplicaciones cerradas en \mathcal{S} , son continuas por el teorema del gráfico cerrado. Concluimos que cuando $f_n - f \rightarrow 0$, entonces la última expresión también tiende a cero. Tomando supremos obtenemos lo pedido.

Con la transformada inversa el trato es similar gracias al teorema de inversión de Fourier en \mathcal{S} . Si R es el operador de reflexión: $f(x) \mapsto f(-x)$, entonces vale $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}R$ y por tanto podemos usar un argumento similar al anterior.

2.8. Día k+j | 20210215

aaaa

Una aplicación a EDP's

El Laplaciano de una de una distribución es

$$\Delta u = \dots$$

Las soluciones de $\Delta u = 0$ se conocen como distribuciones armónicas.

Corolario 2.8.1. Si $u \in \mathcal{S}'$ es armónica, entonces u es un polinomio.

Prueba

Si $\Delta u = 0$ entonces

$$\sum_{j=1}^n (-2\pi i)^2 \xi_j^2 \hat{u} = 0 \Rightarrow -4\pi^2 \|\xi\|^2 \hat{u} = 0.$$

Como $\text{supp}(\hat{u}) = 0$ entonces $\hat{u} = \sum c_\alpha D^\alpha \delta_0$. Calculando la transformada inversa obtenemos el polinomio.

Operadores en L^p

defn op continuo y norma de operador.

En espacio de funciones, un operador es de tipo convolución si es de la forma

$$Tf = f * g.$$

Diremos que T conmuta con traslaciones o es invariante bajo traslaciones si $T(\tau_y f) = \tau_y(Tf)$, X, Y espacios de funciones medibles, cerrados bajo traslación. Los operadores de tipo convolución conmutan con traslaciones.

Teorema 2.8.2. Sean $1 \leq p, q \leq \infty$ y suponga que $T \in \mathcal{L}(L^p, L^q)$ fp

2.9. Día k+j+1 | 20210216

2.10. Día k+j+2 | 20210217

Entonces integrar una función o su reflexión da lo mismo. Pero también la norma en q' algo

$$\frac{\|T^* f\|_{p'}}{\|f\|_{q'}} = \frac{nm f * \tilde{u}_{p'}}{\|f\|_{q'}} = \frac{nm \tilde{f} * u_{p'}}{\tilde{f}_{q'}} = \dots$$

Tomando supremos sobre f obtenemos $\|T^*\|_{q' \rightarrow p'} = \|T\|_{q' \rightarrow p'}$ y por lo tanto $\|T\|_{q' \rightarrow p'} = \|T\|_{p \rightarrow q}$.

Multiplicadores de Fourier

Teorema 2.10.1. Un operador T está en $\mathcal{M}^{1,1}$ si y sólo si está dado por convolución con una medida de Borel compleja finita. La norma de operador es la variación total de la medida.

Teorema 2.10.2. *Un operador T está en $\mathcal{M}^{2,2}$ si y sólo si está dado por convolución con una distribución temperada tal que la transformada de Fourier de dicha distribución es una función en L^∞ . En este caso $\|T\|_{2 \rightarrow 2} = \|\hat{u}\|_\infty$.*

Índice Analítico

clase de Schwartz, 17
componentes, 9
conjunto de Lebesgue, 25
coordenadas homogéneas, 4
distribuciones armónicas, 39
espacio afín, 5
espacio proyectivo, 4
Gauss sumable, 19
localmente integrable, 25
media de Abel, 19

multiplicidad, 11
multiplicidad de la intersección, 11
núcleo de Gauss-Weierstrass, 20, 22
núcleo de Poisson, 20, 22
plano afín, 5
plano proyectivo, 4, 5
recta en el infinito, 6
transformada de Fourier, 13
variedad afín, 10
variedad proyectiva, 10

Bibliografía

- [1] Loukas Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2014.
- [2] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2009.
- [3] Joseph H. Silverman, John T. Tate, and Springer-Verlag (Nowy Jork). *Rational Points on Elliptic Curves*. Structure and Bonding. Springer-Verlag, 1992.
- [4] Richard L. Wheeden and Antoni Zygmund. *Measure and Integral: An Introduction to Real Analysis, Second Edition*. Chapman & Hall/CRC Pure and Applied Mathematics. CRC Press, 2015.