

Fundamentos Matemáticos II

IGNACIO RUMINOT ABURTO

Última Actualización: 9 de julio de 2026




Índice

1	Límites y Continuidad de funciones	3
1.1	Límites laterales	4
2	Cálculo Diferencial	5
2.1	El problema de la recta tangente	5
2.2	Derivadas de funciones y su cálculo	5
2.3	Derivadas de orden superior	5
2.4	Aplicaciones de la derivada	5
2.4.1	Optimización	5
3	Cálculo Integral	6
3.1	Integrales indefinidas	6
3.2	Métodos de integración	6
3.3	Sumas de Riemann	6
3.4	Integrales definidas	6
3.5	Teorema fundamental del cálculo	6
3.6	Aplicaciones de la integral	6
3.6.1	Área de regiones en el plano	6
3.6.2	Volumen de sólidos de revolución	6
3.6.3	Área superficial de un sólido de revolución	6
4	Álgebra Lineal	7
4.1	Vectores en $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$	7
4.1.1	Operatoria con vectores	7
4.1.2	Producto punto, norma y ángulo entre vectores	7
4.1.3	Ortogonalidad, proyección ortogonal, producto cruz	7
4.2	Matrices	7
4.2.1	Operatoria con matrices	7
4.2.2	Multiplicación de matrices	7
4.2.3	Matriz traspuesta y traza	7
4.2.4	Operaciones elementales por filas	7
4.2.5	Determinante y rango de una matriz	7
4.2.6	Matrices no singulares	7
4.3	Sistemas de ecuaciones lineales	7

1. Límites y Continuidad de funciones

Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$. Observemos que f no está definida en $x = 1$, ya que el denominador se anula. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: **¿podemos decir algo sobre el comportamiento de la función f cerca del punto $x = 1$?** Exploraremos esta idea calculando algunos valores de f para x cercanos a 1:

x	$f(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$
0.9	2.710000
0.99	2.970100
0.999	2.997001
1	Indefinido
1.001	3.003001
1.01	3.030100
1.1	3.310000




Al analizar tanto numéricamente como gráficamente, observamos que a medida que x se aproxima a 1, los valores de $f(x)$ se acercan a 3. Esto nos lleva a la conclusión de que, aunque f no está definida en $x = 1$, podemos afirmar que cuando los valores de x se acercan a 1, los valores de $f(x)$ se acercan a 3. En notación matemática, esto se expresa como:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3 = L.$$


Esto significa que podemos hacer que $f(x)$ esté **tan cerca de 3 como queramos**, siempre y cuando el valor de x esté lo suficientemente cerca (aunque no exactamente) de 1.

¿Qué significa exactamente que $f(x)$ esté cerca de L ? En matemática, **medir** la cercanía de dos números se hace a través de la **distancia** entre ellos, que se define como el **valor absoluto de su diferencia**.

Decir que $f(x)$ está cerca de L significa que la distancia entre $f(x)$ y L es pequeña, es decir, que $|f(x) - L| < \varepsilon$, donde $\varepsilon > 0$ representa una tolerancia o margen de error. Esto significa que los valores de $f(x)$ pertenecen al intervalo $]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$.



Analógamente, decir que x está cerca de a significa que la distancia entre x y a es pequeña, es decir, que $|x - a| < \delta$, donde $\delta > 0$ representa una tolerancia o margen de error. Esto significa que los valores de x pertenecen al intervalo $]a - \delta, a + \delta[$.



Definición 1.1 (Límites)

Se dice que el límite de una función $f(x)$ cuando x tiende a un valor a es igual a un número L , y se denota como

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

si para todo $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.

1.1. Límites laterales

2. Cálculo Diferencial

El Cálculo Diferencial surge históricamente de la ambición de Isaac Newton por descifrar las leyes del cosmos. Al estudiar el movimiento de los planetas, Newton enfrentó un desafío que la geometría clásica no podía resolver: las órbitas celestes cambian de dirección y velocidad en cada punto de su trayectoria. Para comprender la mecánica del universo, Newton necesitaba conocer el comportamiento de un cuerpo no en un intervalo de tiempo, sino en un instante preciso.

La solución a este problema fue la concepción de la derivada a través de la *razón de cambio instantánea*. Newton desarrolló un método para capturar la variación de una magnitud en un intervalo tan pequeño que tiende a desaparecer, permitiendo calcular la inclinación exacta de una trayectoria en un *momento infinitesimal*. Geométricamente, este proceso transforma una recta secante en una recta tangente que toca la curva en un único punto, revelando la velocidad exacta del objeto en ese instante.

Hoy estudiamos esta disciplina porque es la herramienta definitiva para la *optimización*. El cálculo nos permite encontrar los puntos máximos y mínimos de cualquier sistema, desde calcular tensiones críticas en ingeniería hasta maximizar ganancias en economía o precisar dosis en medicina. El cálculo diferencial es el lenguaje que Newton utilizó para leer el universo, otorgándonos la capacidad de predecir el comportamiento inmediato de nuestra realidad y entender la *intensidad con la que fluye* todo lo que nos rodea.

2.1. El problema de la recta tangente

2.2. Derivadas de funciones y su cálculo

2.3. Derivadas de orden superior

2.4. Aplicaciones de la derivada

2.4.1. Optimización

3. Cálculo Integral

3.1. Integrales indefinidas

3.2. Métodos de integración

3.3. Sumas de Riemann

3.4. Integrales definidas

3.5. Teorema fundamental del cálculo

3.6. Aplicaciones de la integral

3.6.1. Área de regiones en el plano

3.6.2. Volumen de sólidos de revolución

3.6.3. Área superficial de un sólido de revolución

4. Álgebra Lineal

4.1. Vectores en R^2 y R^3

4.1.1. Operatoria con vectores

4.1.2. Producto punto, norma y ángulo entre vectores

4.1.3. Ortogonalidad, proyección ortogonal, producto cruz

4.2. Matrices

4.2.1. Operatoria con matrices

4.2.2. Multiplicación de matrices

4.2.3. Matriz traspuesta y traza

4.2.4. Operaciones elementales por filas

4.2.5. Determinante y rango de una matriz

4.2.6. Matrices no singulares

4.3. Sistemas de ecuaciones lineales