

Uvod v geometrijsko topologijo

25. marec 2025

Uvod

Cilj topologije Razumeti prostore in preslikave med njimi.

Preslikave

- Vedno zvezne;
- Pomembne: Homeomorfizmi, vložitve;
- Odprte ali zaprte.

Prostori

- Osnovni interes so metrični prostori;
- Različne konstrukcije dajo prostore, ki niso nujno metrični ali pa ne takoj jasno da so – zato si pomagamo s topološkimi lastnostmi.

Konstrukcije prostorov

- **Podprostor.** Naj bo (X, \mathcal{T}) topološki prostor in $A \subseteq X$. Potem

$$\mathcal{T}_A = \{A \cap U \mid U \in \mathcal{T}\}$$

topologija na A in (A, \mathcal{T}_A) topološki prostor.

- **Vsota (oz. disjunktna unija).** Naj bodo $\{(X_\lambda, \mathcal{T}_\lambda) \mid \lambda \in \Lambda\}$ topološki prostori in $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \times \{\lambda\}$. Potem

$$\mathcal{T} = \{U \subseteq X \mid \forall \lambda \in \Lambda. U \cap X_\lambda \text{ odprta v } X_\lambda\}$$

je topologija na X porojena z bazo $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{T}_\lambda$.

- **Produkt.** Naj bodo $\{(X_\lambda, \mathcal{T}_\lambda) \mid \lambda \in \Lambda\}$ topološki prostori in $\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda = \{(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \mid x_\lambda \in X_\lambda\}$.
 - Na $X \times Y$ definiramo bazo

$$\mathcal{B} = \{U \times V \mid U^{\text{odp}} \subseteq X, V^{\text{odp}} \subseteq Y\}.$$

Topologija $\mathcal{T}_{A \times B}$ na množici $X \times Y$ je topologija porojena z bazo \mathcal{B} .

Opomba. Baza \mathcal{B} pride iz predbase, ki je določena z pogojem, da so projekcije na faktorje zvezne.

- Množico $\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda = \{(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \mid x_\lambda \in X_\lambda\}$ opremimo z najslabšo topologijo, glede na katero so vse projekcije

$$\gamma_\mu : \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow X_\mu, \mu \in \Lambda$$

zvezni.

Predbazo sestavljajo

$$\gamma_\mu^*(U_\mu) = U_\mu \times \prod_{\lambda \neq \mu} X_\lambda, \text{ kjer } U_\mu^{\text{odp}} \subseteq X_\mu.$$

Bazne množice so

$$U_{\mu_1} \times U_{\mu_2} \times \dots \times U_{\mu_k} \times \prod_{\lambda \neq \mu_1, \dots, \mu_k} X_\lambda.$$

- **Kompaktifikacija z 1 točko.**
- „Slika prostora pri zvezni preslikavi“. Naj bo $f : X \rightarrow Y$ preslikava. Gledamo $f_*(X)$. $f_*(X)$ dobi topologijo iz Y . Problem, da topologijo na Y lahko menjamo. Hočemo jo dobiti odvisno od X . Družina $\{f^*(y) \mid y \in f_*(X)\}$ je **razdelitev** množice X . V tej družini so množice paroma disjunktne. Torej ta družina določa ekvivalenčno relacijo na X in obratno, vsaka ekvivalenčna relacija na X določna razdelitev na ekvivalenčne razrede.

1 Kvocientni prostori

1.1 Kvocientna topologija

Definicija. Naj bo X množica, \sim ekvivalenčna relacija na X .


- Za poljuben $x \in X$ označimo $[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}$ **ekvivalenčni razred**, ki pripada x .
- **Kvocientna množica** množice X po relaciji \sim je množica vseh ekvivalenčnih razredov $\{[x] \mid x \in X\} =: X/\sim$.
- Preslikava $q : X \rightarrow X/\sim$, $q(x) = [x]$ je **kvocientna projekcija**.

Opomba. Ekvivalenčni razredi predstavljamo kot točke.

Primer. Naj bo $X = [0, 1]$. Ekvivalenčna relacija \sim določena z

$$0 \sim 1 \quad (1 \sim 0, \forall x \in X. x \sim x).$$

Kako si lahko predstavljamo kvocientno množico X/\sim ? Bodisi kot interval $[0, 1]$ bodisi kot krožnico.



Opomba.

- Pri opisu ekvivalenčne relacije bomo običajno navedli le netrivialne relacije, ki generirajo ekvivalenčno relacijo, ob upoštevanju lastnosti ekvivalenčnih relacij.
- Ekvivalenčna relacija \sim na X določa razdelitev množice X na ekvivalenčne razrede. To razdelitev označimo z $\mathcal{R} = \{[x] \mid x \in X\} \subseteq P(X)$. Kvocientno množico lahko označimo z $X/\sim = X/\mathcal{R}$.
- Če \sim določa le en netrivialen ekvivalenčni razred $A \subseteq X$, $|A| \neq 1$, potem kvocientno množico označimo z X/A .

Če je X topološki prostor in \sim ekvivalenčna relacija na X , želimo X/\sim opremiti z topologijo tako, da bo ta odražala lastnosti prostora X . Posebej želimo, da je kvocientna projekcija $q : X \rightarrow X/\sim$ zvezna.

Pogoj

$$\forall V^{\text{odp}} \subseteq X/\sim. q^*(V)^{\text{odp}} \subseteq X$$

topologije na X/\sim ne določa enolično – če neka topologija na X/\sim temu ustreza, ustreza tudi vsaka šibkejša. Zato je X/\sim smiselno opremiti z najmočnejšo topologijo, pri kateri je q zvezna. Torej za odprte množice v X/\sim vzamemo vse, ki imajo odprte praslike v X .

Definicija. Naj bo (X, \mathcal{T}) topološki prostor in \sim ekvivalenčna relacija na X .

- **Kvocientna topologija** na X/\sim je

$$\mathcal{T}_\sim = \{V \subseteq X/\sim \mid q^*(V) \subseteq X \text{ odprta}\}.$$

Trditev. \mathcal{T}_\sim je topologija na X/\sim .

Opomba. V kvocientni topologiji na X/\sim velja:

$$V^{\text{odp}} \subseteq X/\sim \Leftrightarrow q^*(V)^{\text{odp}} \subseteq X.$$

(\Rightarrow) je zveznost preslikave q ;

(\Leftarrow) je največjost \mathcal{T}_\sim .

Velja tudi:

$$Z^{\text{zap}} \subseteq X/\sim \Leftrightarrow q^*(Z)^{\text{zap}} \subseteq X.$$

Primer. Ali je torej q odprta in zaprta? Ni nujno!

- Naj bo $X = [0, 1]$, $\mathcal{R} = \{[0, 1], 1\}$. Kaj je X/\mathcal{R} ? Ali sta $\{[0]\}$ in $\{[1]\}$ odprti? Ali je q zaprta?
- Naj bo $X = [0, 2]$, $[1, 2]$ edini netrivialni ekvivalenčni razred. Kaj je $X/[1, 2]$? Ali je q odprta?
- Naj bo $X = [0, 1]$, $A = X \cap \mathbb{Q}$, $B = X \setminus \mathbb{Q}$. Kaj je $X/\{A, B\}$? Kaj je kvocientna topologija?

Definicija. Naj bo X množica in \sim ekvivalenčna relacija.

- Za $A \subseteq X$ je njeno **nasičenje** enako

$$q^*(q_*(A)) = \bigcup \{B \in X/\sim \mid A \cap B \neq \emptyset\}.$$

Trditev. Naj bo X topološki prostor, \sim ekvivalenčna relacija, $A \subseteq X$. Velja:

- $q_*(A)$ je odprta/zaprta \Leftrightarrow nasičenje $q^*(q_*(A))$ odprto/zaprto.
- $\forall U^{\text{odp}} \subseteq X. q^*(q_*(U))$ odprto/zaprto $\Rightarrow q$ je odprta/zaprta.

Cilj Imamo nek topološki prostor X in ekvivalenčno relacijo \sim . Če je to mogoče, želimo poiskati nek geometrični model Y za kvocient X/\sim in jasno pokazati, da je $X/\sim \approx Y$.

Primer.

- Naj bo $X = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{Z}$. Kaj je $\mathbb{R}/_A$?
- Naj bo $X = [0, 1]$, $A = \left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\} \cup \{0\}$. Kaj je $\mathbb{R}/_A$? Ali je kompakten?

V obeh primerih imamo števno mnogo krožnic, spetih v eni točki. Ali sta ta prostora homeomorfna?

1.2 Kvocientne preslikave

Cilj Razumeti preslikave iz kvocientov.

Naj bo X topološki prostor, \sim ekvivalenčna relacija.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ q \downarrow & \searrow f := g \circ q & \\ X/\sim & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

Zvezna preslikava $g : X/\sim \rightarrow Y$ določa zvezno preslikavo $f = g \circ q : X \rightarrow Y$.

Če je $x \sim y$ v X , je $[x] = q(x) = q(y) = [y]$ in zato je $f(x) = g(q(x)) = g(q(y)) = f(y)$. Torej ta f je konstantna na ekvivalenčnih razredih, tj. ekvivalentne točke slika v iste.

Želimo obratno: za preslikavo $f : X \rightarrow Y$ poiskati pogoje, da določa preslikavo iz X/\sim v Y .

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ q \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ X/\sim & & \end{array}$$

Če naj diagram komutira, mora biti f konstantna na ekvivalenčnih razredih:

$$\forall x, y \in X. x \sim y \Rightarrow f(x) = f(y).$$

Če to velja, potem definiramo

$$\bar{f}([x]) := f(x).$$

\bar{f} je preslikava, inducirana s f .

Trditev. Naj bo X topološki prostor, \sim ekvivalenčna relacija, $f : X \rightarrow Y$ zvezna preslikava, ki je konstantna na ekvivalenčnih razredih. Potem f določa dobro definirano preslikavo

$$\bar{f} : X/\sim \rightarrow Y,$$

za katero velja:

$$\bar{f} \circ q = f.$$

Poleg tega velja:

- Če je f zvezna, potem je tudi \bar{f} zvezna.
- Če je f surjektivna, je \bar{f} surjektivna.
- Če za $\forall x, y \in X. x \not\sim y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$, potem je \bar{f} injektivna, tj. f loči ekvivalenčne razrede.

Dokaz. Definicija kvocientne topologije. □

Zanima nas, kdaj bo \bar{f} homeomorfizem. Velja:

$\bar{f} : X/\sim \rightarrow Y$ je homeomorfizem, če

- zvezna, bijektivna in inverz zvezen oz.
- bijekcija iz X/\sim v Y in porodi bijekcijo med topologiji na X/\sim in Y .

Torej NTSE

- \bar{f} je homeomorfizem.
- \bar{f} je bijekcija iz X/\sim v Y in porodi bijekcijo med odprtimi množici.
- \bar{f} je bijekcija in velja:

$$\forall V \subseteq Y. V \text{ je odprta} \Leftrightarrow \bar{f}^*(V)^{\text{odp}} \subseteq X/\sim \Leftrightarrow f^*(V)^{\text{odp}} = q^*(\bar{f}^*(V))^{\text{odp}} \subseteq X.$$

Definicija. Naj bosta X, Y topološka prostora in $f : X \rightarrow Y$ preslikava. Če je f surjektivna in če

$$\forall V \subseteq Y. V \text{ je odprta} \Leftrightarrow f^*(V) \subseteq X \text{ je odprta,}$$

potem f imenujemo **kvocientna preslikava**.

Opomba.

- Po definiciji kvocientne topologiji, je kvocientna projekcija kvocientna preslikava. Obratno: vsako kvocientno preslikavo $f : X \rightarrow Y$ lahko obravnavamo kot kvocientno projekcijo pri ekvivalenčni relaciji, določeni z razbitjem X na praslike točk.
- Kvocientna preslikava je vedno zvezna, ni pa nujno odprta niti zaprta.
- Implikacija (\Leftarrow) v definiciji kvocientne preslikave je posebna lastnost, tej včasih rečemo **kvocient v ožjem smislu**. Za zvezno surjekcijo je za njeno kvocientnost potrebno preveriti le ta pogoj.
- Surjektivna preslikava f je kvocientna natanko tedaj, ko

$$\forall Z \subseteq Y. Z \text{ je zaprta} \Leftrightarrow f^*(Z) \subseteq X \text{ je zaprta,}$$

Lema. Naj bo $f : X \rightarrow Y$ zvezna in surjektivna. Če je f odprta ali zaprta, je kvocientna.

Dokaz. Preveriti je treba le kvocientnost v ožjem smislu. □

Izrek (O prepoznavi kvocienta). Naj bosta X, Y topološka prostora in \sim ekvivalenčna relacija na X . Naj bo $f : X \rightarrow Y$ kvocientna preslikava, ki naredi enake identifikacije kot \sim , tj. f je konstantna na ekvivalenčnih razredih in loči ekvivalenčne razrede:

$$\forall x, y \in X. x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

Potem je inducirana preslikava $\bar{f} : X/\sim \rightarrow Y$ homeomorfizem.

2 Osnovni izreki topologije evklidskih prostorov

2.1 Brouwerjev izrek o negibni točki

Definicija. Naj bo $f : X \rightarrow X$ preslikava. Pravimo, da je $a \in X$ **negibna točka** za preslikavo f , če $f(a) = a$.

Opomba.

- Negibne točke lahko povežemo z reševanjem enačb.
Negibna točka je rešitev enačbe $f(x) = x$ oz. $g(x) := f(x) - x = 0$.
- Obstoj negibne točke je odvisen tako od lastnosti prostora X kot od lastnosti preslikave f .
- Banachovo skrčitveno načelo je primer izreka o negibni točki, ki deluje na presek splošnih prostorih (poln metrični prostor), je pa zelo restriktiven glede preslikave (skrčitev). Brouwerjev izrek pa zelo omeji topološki tip prostora, preslikava pa je lahko poljubna (zvezna).

Naj bo $n \in \mathbb{N}$

Izrek A_n (Brouwerjev izrek o negibni točki). Poljubna zvezna preslikava $f : B^n \rightarrow B^n$ ima negibno točko.

Dokaz. **TODO:**

□

Opomba. Enako velja za vsako prostor, ki je homeomorfen B^n .

Definicija. Prostor X **ima lastnost negibne točke** (LNT), če ima vsaka zvezna preslikava $f : X \rightarrow X$ negibno točko.

Opomba. Izrek A_n velja natanko tedaj, ko $B^n \in \text{LNT}$.

Zgled. Pri $n = 1$ dobimo znani izrek o vmesni vrednosti iz Analize 1.

Primer. Ali so sferi imajo LNT?

- $S^1 \notin \text{LNT}$, saj netrivialne rotacije ne fiksirajo nobene točke.
- Preslikava $f : S^m \rightarrow S^m$, $f(x) = -x$ nima negibne točke sledi, da $S^m \notin \text{LNT}$.

Definicija. Naj bo X prostor, $A \subseteq X$. Zvezna preslikava $r : X \rightarrow A$ je **retrakcija**, če je $r|_A = \text{id}_A$. V tem primeru rečemo, da je A **retrakt** prostora X .

Primer. Retrakti.

- Naj bo X prostor, $x_0 \in X$. Trdimo, da je $A = \{x_0\}$ retrakt prostora X in, da je $r : X \rightarrow A$, $f(x) = x_0$ retrakcija.
- $S_+^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_{n+1} \geq 0\}$ je retrakt prostora S^n .
Iskana retrakcija je $r : S^n \rightarrow S_+^n$, $r(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_n, |x_{n+1}|)$.
- Poišči vse retrakcije iz $I = [0, 1]$ na $A = \{0, 1\}$. Namig: zvezna slika povezanega prostora.

Trditev. Naj bo X topološki prostor.

- Retrakt povezanega (s potmi) prostora je povezan (s potmi).
- Retrakt kompaktnega prostora je kompakten prostor.
- Če je $X \in T_2$, je retrakt prostora X zaprt v X .

Dokaz. 1. - 2. **TODO:**

3. Uporabimo, da se zvezni preslikavi $f, g : X \rightarrow Y \in T_2$ ujemata na zaprti množici.

□

Trditev. Naj bo X topološki prostor. Če ima X LNT, ima tudi vsak njegov retrakt LNT.

Dokaz. Definicija retrakta, LNT in inkluzija.

□

Primer. Retrakti diska B^2 . **TODO: Slika.**

Definicija. Prostor Y je **absolutni ekstenzor** za neki razred topoloških prostorov \mathcal{R} (npr. T_2 prostori), če

$$\forall X \in \mathcal{R}. \forall A^{\text{zap}} \subseteq X. \forall f^{\text{zv}} : A \rightarrow Y. \exists F^{\text{zv}} : X \rightarrow Y.,$$

kjer je preslikava F razširitev preslikave f , tj. $F|_A = f$.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & Y \\ i \downarrow & \nearrow F & \\ X & & \end{array}$$

Primer. Enojci so absolutni ekstenzorji.

Opomba. Tietzejev razširitvini izrek.