

## 1 Ekstremi

Kako poiščemo ekstreme funkcije  $f$  na množici  $K$ ?

1. Kandidati v  $\text{Int } K$  so stacionarne točke.
2. Ekstremi na robu  $\partial K$ :
  - (a) Parametriziramo rob.
  - (b) Tvorimo Lagrangeovo funkcijo  $L = f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i$ , kjer  $g_i$  so pogoji, in iščemo njene stac. točke.

## 2 Integrali s parametri

**Običajen integral s parametri.** Naj bo  $F(y) = \int_u^v f(x, y) dx$ ,  $u, v \in I$ ,  $y \in D$ .

	Zveznost	Odvod	Vrstni red integriranja
Zveznost $f(x, y)$ na $I \times I \times D$	+	+	+
Zveznost $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ na $I \times I \times D$		+	

Velja:  $F'(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx + \beta'(y)f(\beta(y), y) - \alpha'(y)f(\alpha(y), y)$

**Posplošeni integral s parametri.** Naj bo  $F(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $y \in D$ .

	Zveznost	Odvod	Vrstni red integriranja
Zveznost $f(x, y)$ na $[a, \infty) \times D$	+	+	+
L.E.K. $y \mapsto \int_a^\infty f(x, y) dx$ na $D$	+		+
Zveznost $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ na $[a, \infty) \times D$		+	
L.E.K. $y \mapsto \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$ na $D$		+	
Obstoj $y \mapsto \int_a^\infty f(x, y) dx$ v $y_0 \in D$		+	

**Definicija.** Integral  $F(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$  **konvergira enakomerno** na  $D$ , če

$$\forall \epsilon > 0. \exists b_0 \geq a. \forall b \geq b_0. \forall y \in D. \left| \int_b^\infty f(x, y) dx \right| < \epsilon.$$

### 2.1 Funkciji gama in beta

**Definicija.**  $\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx$  je **Eulerjeva funkcija gama**. Velja:  $D_\Gamma = (0, \infty)$ .

**Trditev.** Lastnosti Eulerjeve funkcije gama:

- $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ . Če je  $n \in \mathbb{N}$ , potem  $\Gamma(n) = (n-1)!$ .
- $\Gamma(k) = \Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} \ln^k x e^{-x} dx$ ,  $\Gamma \in C^\infty((0, \infty))$ .

**Definicija.**  $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$  je **Eulerjeva funkcija beta**. Velja:  $D_B = (0, \infty) \times (0, \infty)$ .

**Trditev.**  $\frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{\beta+1}{2}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha t \cos^\beta t dt$  za  $\alpha, \beta > -1$ .

**Trditev.**  $B(p, q) = \int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$ .

**Posledica.**  $B(p, 1-p) = \int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{1+t} dt$  za  $0 < p < 1$ .

**Opomba.** Za  $p \in (0, 1)$  velja:

$$B(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}.$$

**Izrek** (Stirlingova formula).

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(s+1)}{s^s e^{-s} \sqrt{2\pi s}} = 1.$$

## 3 Riemannov integral

**Izrek** (Uvedba novih spremenljivk). Naj bo  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ . Našo spremenljivko  $x = (x_1, \dots, x_n) \in D$  podamo kot funkcijo novih, tj.  $(x_1, \dots, x_n) = F(u_1, \dots, u_n)$ , kjer  $F: \Delta \rightarrow D$  difeomorfizem. Potem

$$\int_D f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = \int_\Delta f(F(u_1, \dots, u_n)) |\det JF(u_1, \dots, u_n)| du_1, \dots, du_n.$$

**Vpeljava novih spremenljivk**

	Polarne	Valjne	Sferične	Torusne ( $0 < a < R$ )
$x$	$r \cos \phi$	$r \cos \phi$	$r \cos \phi \cos \psi$	$(R + r \cos \psi) \cos \phi$
$y$	$r \sin \phi$	$r \sin \phi$	$r \sin \phi \cos \psi$	$(R + r \cos \psi) \sin \phi$
$z$		$z$	$r \sin \psi$	$r \sin \psi$
$\det JF$	$r$	$r$	$r^2 \cos \psi$	$r(R + r \cos \psi)$
Omejitve	$\phi \in [0, 2\pi]$	$\phi \in [0, 2\pi]$	$\phi \in [0, 2\pi]$ in $\psi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$\phi, \psi \in [0, 2\pi]$ in $r \in [0, a]$

**Fizikalne količine**

1. Vztrajnostni moment okoli  $z$ -osi:
  - Nehomogeno telo:  $J_z = \int_D (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV$ .
  - Homogeno telo:  $J_z = \frac{m(D)}{V(D)} \int_D (x^2 + y^2) dV$ , ker  $\rho_0 = \frac{m(D)}{V(D)}$ .
2. Težišče ( $x$ -koordinata):
  - Nehomogeno telo:  $x_T(D) = \frac{1}{m(D)} \int_D x \rho(x, y, z) dV$ , kjer  $m(D) = \int_D \rho(x, y, z) dV$ .
  - Homogeno telo:  $x_T(D) = \frac{1}{V(D)} \int_D x dV$

## 4 Splošno

### 4.1 Ideji in nasveti

- Odvod lihe funkcije je soda funkcija. Odvod sode funkcije je liha funkcija.
- $\int_0^{2\pi} \cos^{2k+1} \psi d\psi = 0$  za  $k = 0, 1, \dots$
- Za izračun gravitacijske sile sprojicirajmo vse sile na os rezultante.
- 3D sliko lahko si predstavljamo s pomočjo nivojnic.
- Opazimo simetrije, npr. rotacijsko:  $f(z, x^2 + y^2)$  itd.

### 4.2 Prostornine

- Tetraedr:  $V = \frac{1}{6} S_o h$ .
- Valj:  $V = \pi r^2 h$ ,  $S = 2\pi r h + 2\pi r^2$ .
- Sfera:  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ ,  $S = 4\pi r^2$ .

### 4.3 Taylor

**Taylorjeva formula:**  $f(a+h) = f(a) + (D_h f)(a) + \frac{1}{2!} (D_h^2 f)(a) + \dots + \frac{1}{k!} (D_h^k f)(a) + R_k$ ,

kjer je  $D_h = h_1 D_1 + h_2 D_2 + \dots + h_n D_n$  **odvod v smeri  $h$**  in  $R_k = \frac{1}{(k+1)!} (D_h^{k+1} f)(a + \theta h)$  **ostanek**.

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (R = \infty) & \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R = \infty) \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (R = \infty) & \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad (R = 1) \\ (1+x)^\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (R = 1) \end{aligned}$$

### 4.4 Hiperbolične funkcije

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

## 4.5 Trigonometrija

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} & \sin x \cos y &= \frac{1}{2} (\sin(x+y) + \sin(x-y)) \\ \cos x + \cos y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} & \cos x \cos y &= \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y)) \\ \cos x - \cos y &= -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} & \sin x \sin y &= \frac{1}{2} (\cos(x-y) - \cos(x+y))\end{aligned}$$

## 4.6 Nedoločeni integral

### 4.6.1 Integracija racionalnih funkcij

**Metoda nastavka.** Integriramo  $R(x) = p(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$ .

$$\frac{1}{(x-a)^k} \rightsquigarrow A \ln |x-a|, \quad \frac{1}{(x^2+bx+c)^l} \rightsquigarrow B \ln |x^2+bx+c| + C \arctan \frac{2x+b}{\sqrt{4c-b^2}}, \quad \frac{\tilde{r}(x)}{\tilde{q}(x)},$$

kjer polinom  $\tilde{q}$  dobimo iz polinoma  $q$  z znižanjem potence vsakega faktorja za ena, polinom  $\tilde{r}$  pa ima stopnjo za eno nižjo kot  $\tilde{q}$ . Število neznakov je enako stopnje polinoma  $q$ .

### 4.6.2 Integracija korenčkih funkcij

- Integrale oblike  $\int R(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$  integriramo z uvedbo nove spremenljivke  $t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$ . Tako dobimo integral racionalne funkcije v spremenljivke  $t$ .
- Integrale oblike  $\int \frac{p(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$  računamo z postopkom:
  - Če je  $p$  konstanta, z zapisom v temenski obliki integral prevedemo:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} &= \arcsin \left( \frac{x}{a} \right) + C & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} &= \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} &= \ln |x + \sqrt{x^2+a^2}| + C\end{aligned}$$

- Če je  $p$  poljuben, pa uporabimo nastavek:

$$\int \frac{p(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = \tilde{p}(x) \sqrt{ax^2+bx+c} + \int \frac{A dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}},$$

kjer  $\tilde{p}$  ima stopnjo 1 manj kot  $p$  in je  $A$  konstanta.

- Integrale oblike  $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$  vedno lahko z univerzalno substitucijo prevedemo na integral racionalne funkcije:

$$a > 0: \sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}(u-x) \quad a < 0: \sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{-a}(x-x_1)u,$$

kjer je  $x_1$  ničla kvadratne funkcije. Ta metoda v principu vedno deluje, ni pa nujno najbolj optimalna.

- Pri integralih oblike  $\int \frac{dx}{(x+\alpha)^k \sqrt{ax^2+bx+c}}$  se splača uvesti novo spremenljivko  $t = \frac{1}{x+\alpha}$ .

### 4.6.3 Integracija trigonometričnih funkcij

- Integrale oblike  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx$ , kjer sta  $p, q > -1$ , računamo s beto funkcijo.
- Integrale oblike  $\int R(\sin x, \cos x) dx$  lahko z univerzalno trigonometrično substitucijo  $t = \tan \left( \frac{x}{2} \right)$  prevedemo na integral racionalne funkcije spremenljivke  $t$ . Pri tem:

$$\bullet dx = \frac{2dt}{1+t^2} \quad \bullet \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \bullet \sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

Pri uporabi metode, če se da, poskusimo na začetku z uporabo adicijskih izrekov potence čim bolj znižati, da dobimo bolj enostavno racionalno funkcijo.

## Dodatek

$$\begin{aligned}e^{ax} \sin(bx) dx &= \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) & e^{ax} \cos(bx) dx &= \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx)) \\ \frac{dx}{x^2-a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| & \int \frac{dx}{a^2+b^2x^2} &= \frac{1}{ab} \arctan \left( \frac{bx}{a} \right) + C\end{aligned}$$