

Introducción

En 1640 Fermat afirmó que poseía una demostración del hecho de que si p es un número primo y x es cualquier entero no divisible por p , entonces $x^{p-1} - 1$ es divisible por p . Ahora llamado Teorema de Fermat, es uno de los teoremas fundamentales de la teoría de números. Este resultado fue generalizado más tarde por Euler en 1760: si $\varphi(n)$ denota el número de enteros positivos no mayores a n que son primos relativos a n , entonces $x^{\varphi(n)-1} - 1$ es divisible por p . Aunque la función φ de Euler se definió para enunciar la generalización anterior, ésta posee remarcables propiedades que hacen valer la pena estudiarla por sí misma. Gauss (1801) probó que si $n \in \mathbb{N}$ y d_1, d_2, \dots, d_k son todos los divisores positivos de n , entonces $\varphi(d_1) + \varphi(d_2) + \dots + \varphi(d_k) = n$.

Por otro lado, en 1832 A. F. Möbius definió la función $\mu(n)$ como cero si n es divisible por un cuadrado distinto de 1, y como $(-1)^k$ si n es producto de k primos distintos, mientras que $\mu(1) = 1$ y empleó dicha función en la inversión de series:

$$F(x) = \sum_{s=1}^{\infty} \frac{f(sx)}{s^n} \text{ implica } f(x) = \sum_{s=1}^{\infty} \mu(s) \frac{F(sx)}{s^n}.$$

Dedekind (1857) probó que si $F(m) = \sum f(d)$, donde d recorre todos los divisores positivos de m , entonces

$$f(n) = F(n) - \sum F\left(\frac{n}{a}\right) + \sum F\left(\frac{n}{ab}\right) - \sum F\left(\frac{n}{abc}\right) + \dots,$$

donde las sumas se extienden sobre todas las combinaciones de los distintos factores primos a, b, \dots de n . Laguerre (1863) expresó la ecuación anterior como

$$f(n) = \sum \mu\left(\frac{n}{d}\right) F(d).$$

En particular, como $\sum \varphi(d) = n$, se tiene

$$\varphi(n) = n - \sum \frac{n}{a} + \sum \frac{n}{ab} - \dots = n \left(1 - \frac{1}{a}\right) \left(1 - \frac{1}{b}\right) \dots$$

En 1874, F. Mertens notó que $\sum \mu(d) = 0$ si $n > 1$, donde d recorre todos los divisores positivos de n . N. V. Bugaiev (1888) consideró la función $\nu(x)$ con valor $\log p$ si x es potencia de un primo p y con valor 0 en otro caso. Si d recorre todos los divisores positivos de n , $\sum \nu(d) = \log n$ implica que $\sum \mu(d) \log d = -\nu(n)$. Bugaiev llamó a $F(n) = \sum f(d)$, la integral numérica de $f(n)$, donde la suma es sobre todos los divisores positivos d de n , y llamó a $f(n)$ la derivada numérica de la función $F(n)$ [7].

En 1857 Liouville estableció sin prueba un gran número de identidades interesantes similares a las anteriores, en sus cuatro artículos *Sur quelques fonctions numériques*, sobre funciones aritméticas específicas, como la suma y número de divisores de un entero, la función φ de Euler, la función de Möbius μ , su propia función λ , etc. Afirmó que estaba en posesión de un método general de extrema simplicidad, con el que tales identidades se podrían escribir a voluntad. Tales identidades probaron ser un valioso punto de partida para la evaluación asintótica de funciones aritméticas, pero su interés peculiar era más bien de naturaleza algebraica [3].

En 1911, al buscar pruebas para las fórmulas de Liouville, E. T. Bell construyó un método general con las características deseadas y lo extendió a otros campos además de los números racionales. Aunque Bell tenía intenciones de publicar su teoría completa en 1915, no fue sino hasta 1927 que una introducción desde un punto de vista lógico fue publicada en [2]. En lo concerniente a los *enteros racionales*, terminología de la época para referirse a los números enteros, en 1912 y 1915 [3], probó el teorema de inversión de Möbius, el cual es un análogo a la inversión de series de Möbius en un contexto puramente aritmético y lo aplicó a numerosos ejemplos.

Bell (1928), llamó a una función $f(x)$ *función numérica* si $f(1) \neq 0$ y $f(x)$ está definida para todo entero mayor que cero. El lector que recorra este trabajo podrá darse cuenta de que esta definición coincide con la de una función aritmética *invertible* (citar definición). También llamó a una función *factorizable* a una función numérica $g(x)$ tal que $g(1) = 1$ y $g(mn) = g(m)g(n)$ para todos los pares (m, n) de primos relativos positivos, que en este trabajo serán referidas como *funciones multiplicativas*.

Asimismo, Bell consideró la función *unidad* (aquí llamada *identidad*) $\varepsilon(x)$ definida como $\varepsilon(1) = 1$ y $\varepsilon(n) = 0$ para cada $n > 1$ y probó que para cualquier función numérica existe otra función numérica tal que

$$\sum f(d)f'(d) = \varepsilon(n), \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

donde la suma se extiende sobre todos los pares de enteros (d, δ) tales que $d, \delta > 0$ y $n = d\delta$, y llama a $f'(x)$ la *recíproca* de $f(x)$, que aquí se le dará el nombre de *inversa* de f .

El lector con conocimiento básico de álgebra abstracta puede comenzar a identificar lo que está sucediendo aquí. Hasta ahora, resulta que la función ε está actuando como la identidad respecto a la operación de anterior, es decir, hasta ahora el conjunto de funciones aritméticas constituye un *monoide*. ¿Será esta operación también asociativa o conmutativa? La respuesta a estas preguntas es afirmativa y más aún, con la operación de suma de funciones punto a punto, este conjunto forma un anillo conmutativo

con identidad y resulta ser también un dominio entero y de factorización única. En el primer capítulo, el objetivo de este trabajo es presentar algunos resultados sobre la estructura del anillo de funciones aritméticas en un contexto puramente algebraico, condensando y resumiendo los resultados probados en [5], [13] y [3], en notación algebraica moderna. Después, se exponen varios isomorfismos entre los subgrupos del anillo de funciones aritméticas, aditivos y multiplicativos. Al final de este capítulo se presentan algunas funciones aritméticas conocidas y algunas relaciones entre ellas, derivadas fácilmente con los resultados probados en las secciones anteriores. (agregar varias relaciones entre funciones, algebraicas, tal vez una tabla).

El segundo capítulo se ocupa de presentar dos clases de funciones, llamadas funciones *pares* y funciones *periódicas*, y se probará que son equivalentes. Se presenta una teoría análoga a la teoría de Fourier del análisis real, usando únicamente propiedades de divisibilidad de los enteros. Además, se introducen las sumas de Ramanujan y algunas propiedades topológicas del espacio vectorial formado por las combinaciones lineales finitas de estas. Al final del capítulo se presenta un resultado relativo a la expansión finita de cualquier función aritmética con sumas de Ramanujan como coeficientes (y la unicidad de esta representación) (y también a la densidad de estas funciones en el conjunto de todas las funciones aritméticas). Los resultados presentados en este capítulo se pueden encontrar en [6].

En el último capítulo se presenta una aplicación de los resultados expuestos en el segundo capítulo, usándolos para el procesamiento discreto de señales, haciendo énfasis en la simplicidad de los cálculos realizados.

1. Estructura del anillo de funciones aritméticas

Definición 1.1. A partir de ahora, nos referiremos como **función aritmética** a cualquier función $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}$. Se denota al conjunto de todas las funciones aritméticas como \mathcal{A} .

Definición 1.2. (Función constante). La función constante de valor $c \in \mathbb{C}$ es claramente una función aritmética en \mathbb{N} , a la cuál denotaremos en negritas como **c**. Por ejemplo, $\mathbf{1}(n) = 1, \forall n \in \mathbb{N}$.

La siguiente función aritmética, conocida como función de Möbius, es de importancia central en la teoría de números. Aunque a primera vista su definición parece más bien artificial, se verá que aparece naturalmente al derivar propiedades del producto de Dirichlet.

Definición 1.3. (Función de Möbius). La función μ de Möbius está definida por $\mu(1) = 1$ y dada $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ la factorización de n en primos, entonces

$$\mu(n) = \begin{cases} (-1)^k & \text{si } \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Una primera forma natural de operar funciones aritméticas es haciendo su suma o multiplicación puntual, obteniendo otra función aritmética.

Definición 1.4. Si $f, g \in \mathcal{A}$, definimos la **suma** de f y g como la función

$$\begin{aligned} f + g : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ n &\longmapsto f(n) + g(n) \end{aligned}$$

y el **producto** de f y g como la función

$$\begin{aligned} fg : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ n &\longmapsto f(n)g(n). \end{aligned}$$

Es fácil verificar que para cualesquiera funciones aritméticas f y g ,

$$(I) \quad f + \mathbf{0} = \mathbf{0} + f = f$$

$$(II) \quad f\mathbf{1} = \mathbf{1}f = f$$

$$(III) \quad f + g = g + f$$

$$(IV) \quad fg = gf.$$

1.1. Convolución de Dirichlet

Definición 1.5. Sean f una función aritmética, $n \in \mathbb{N}$ y d_1, d_2, \dots, d_k todos los divisores positivos de n . Definimos

$$\sum_{d|n} f(d) = f(d_1) + f(d_2) + \dots + f(d_k).$$

Definición 1.6. (Convolución de Dirichlet). Si f y g son funciones aritméticas, definimos la **convolución de Dirichlet** o **producto de Dirichlet** de f y g , como la función aritmética $f * g$ definida como:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Para ver que la operación $*$ es asociativa, conmutativa y distributiva respecto a la suma, necesitaremos algunos lemas.

Lema 1.1. Si $k \in \mathbb{N}$, $D \subset \mathbb{N}$ y $f, g : \{1, \dots, k\} \longrightarrow D$ son dos funciones biyectivas y estrictamente crecientes, entonces $f = g$.

Demostración. Como $D \subset \mathbb{N}$ podemos ordenar los elementos de D , digamos $D = \{d_1, \dots, d_k\}$, donde $d_1 < d_2 < \dots < d_k$. Tenemos que d_1 es entonces el elemento mínimo de D . Sin embargo, tenemos que $f(1) \leq f(i)$ y $g(1) \leq g(i)$, $\forall i = 1, \dots, k$ y como f y g son suprayectivas, entonces $f(1) \leq d_1$ y $g(1) \leq d_1$, además $d_1 \leq f(1)$ y $d_1 \leq g(1)$ por ser d_1 el elemento mínimo de D . Luego $f(1) = d_1 = g(1)$.

Supongamos que $f(i) = d_i = g(i)$, $\forall i = 1, \dots, n$ y $n+1 \leq k$. Si $n+1 = k$, como f y g son biyectivas, necesariamente $f(n+1) = d_{n+1} = g(n+1)$. Supongamos pues que $n+1 < k$. Tenemos que d_{n+1} es el elemento mínimo del conjunto $D \setminus \{1, \dots, d_n\}$. Notemos que $f(n+1), g(n+1) \in D \setminus \{1, \dots, d_n\}$. En efecto, pues si $f(n+1) = d_{i_1}$ o $g(n+1) = d_{i_2}$, para algunos $i_1, i_2 \in \{1, \dots, n\}$, entonces $f(n+1) = f(i_1)$ y $g(n+1) = g(i_2)$ por hipótesis de inducción y por inyectividad se tendría que $n+1 = i_1 \leq n$ o $n+1 = i_2 \leq n$, lo cual es absurdo. En consecuencia $f(n+1), g(n+1) \in D \setminus \{1, \dots, d_n\}$ y por tanto $d_{n+1} \leq f(n+1)$ y $d_{n+1} \leq g(n+1)$.

Por otra parte, se tiene por suprayectividad que existen $j_1, j_2 \in \{1, \dots, k\}$ tales que $f(j_1) = d_{n+1}$ y $g(j_2) = d_{n+1}$, más aún, $n+1 \leq j_1$ y $n+1 \leq j_2$, pues en caso contrario se tendría que $j_1 < n$ o $j_2 < n$, es decir, $f(j_1) < f(n)$ o $g(j_2) < g(n)$, es decir, $d_{n+1} < d_n$, lo que contradice la hipótesis. Luego $f(n+1) \leq f(j_1) = d_{n+1}$ y $g(n+1) \leq g(j_2) = d_{n+1}$. Se sigue finalmente que $f(n+1) = d_{n+1} = g(n+1)$. ■

Lema 1.2. Si $n \in \mathbb{N}$ y $d_1 = 1 < d_2 < \dots < d_{k-1} < d_k = n$ son todos los divisores positivos de n , entonces $d_i d_{k+1-i} = n$, $\forall i = 1, \dots, k$.

Demostración. Sea $D = \{d_1, \dots, d_k\}$ y consideremos las funciones $f : \{1, \dots, k\} \rightarrow D$ definida como $f(i) = d_i$, $\forall i = 1, \dots, k$ y $g : \{1, \dots, k\} \rightarrow D$ definida como $g(i) = n/d_{k+1-i}$, $\forall i = 1, \dots, k$. Es fácil ver que f y g cumplen las condiciones del lema anterior y por tanto $f(i) = g(i)$, $\forall i = 1, \dots, k$, es decir, $d_i d_{k+1-i} = n$, $\forall i = 1, \dots, k$. ■

Proposición 1.1. Si f y g son funciones aritméticas, $n \in \mathbb{N}$ y $d_1 < \dots < d_k$ son todos los divisores positivos de n , entonces

$$(f * g)(n) = \sum_{i=1}^k f(d_i)g(d_{k+1-i}) = f(d_1)g(d_k) + \dots + f(d_k)g(d_1).$$

Demostración. Se sigue de la definición de $(f * g)(n)$ y del Lema 1.2. ■

Definición 1.7. (Función identidad). Definimos a la función identidad I como

$$I(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1, \end{cases}$$

para cada $n \in \mathbb{N}$.

La siguiente proposición muestra que la función I actúa como la identidad bajo la convolución de Dirichlet, entre otras propiedades algebraicas.

Proposición 1.2. Si f, g y h son funciones aritméticas entonces se verifica lo siguiente:

$$(I) \quad (f * g) * h = f * (g * h)$$

$$(II) \quad f * I = I * f = f$$

$$(III) \quad f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$$

$$(IV) \quad f * g = g * f$$

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}$, sean $d_1 = 1 < d_2 < \dots < d_k = n$ todos los divisores positivos de n y para cada $i = 1, \dots, k$ sean $c_{i,1} < c_{i,2} < \dots < c_{i,m_i}$ los divisores positivos de d_i .

(i) Tenemos que

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_i} f(c_{i,j})g(c_{i,m_i+1-j})h(d_{k+1-i}) \quad (1.1)$$

y

$$(f * (g * h))(n) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_{k+1-i}} f(d_i)g(c_{m_{k+1-i},j})h(c_{m_{k+1-i},m_{k+1-i}+1-j}). \quad (1.2)$$

Definamos los conjuntos

$$A = \{f(c_{i,j})g(c_{i,m_i+1-j})h(d_{k+1-i}) \mid i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, m_i\}$$

$$B = \{f(d_i)g(c_{m_{k+1-i},j})h(c_{m_{k+1-i},m_{k+1-i}+1-j}) \mid i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, m_i\},$$

y $C = \{f(a)f(b)f(c) \mid a, b, c \in \mathbb{N} \text{ y } abc = n\}$. Afirmamos que $A = C$ y $B = C$. En efecto, si $f(c_{i,j})g(c_{i,m_i+1-j})h(d_{k+1-i})$, entonces $c_{i,j}c_{i,m_i+1-j}d_{k+1-i} = d_i d_{k+1-i} = n$, aplicando dos veces el Lema 1.2. Recíprocamente, si $a, b, c \in \mathbb{N}$ son tales que $abc = n$, entonces $c \mid n$, por tanto $c = d_j$, para algún $j = 1, \dots, k$, es decir, $c = d_{k+1-i}$ para $i = k+1-j$ con $i = 1, \dots, k$. Notemos entonces que por el lema 1.2, necesariamente se debe tener $ab = d_i$, por lo que $a = c_{i,j}$, para algún $j = 1, \dots, m_i$ y aplicando el lema de nuevo se debe tener que $b = c_{i,m_i+1-j}$. En consecuencia $f(a)g(b)h(c) = f(c_{i,j})g(c_{i,m_i+1-j})h(d_{k+1-i}) \in A$. Se sigue pues que $A = C$. Similarmente se demuestra que $B = C$.

Se tiene pues que $A = B$ y como las sumas (1.1) y (1.2) se extienden sobre los conjuntos A y B , entonces deben coincidir, es decir, $((f * g) * h)(n) = (f * (g * h))(n)$.

(ii) Como $1 < d_i, \forall i = 2, \dots, k$ entonces $I(d_i) = 0, \forall i = 2, \dots, k$, luego por la proposición (1.1) se tiene que

$$\begin{aligned} (f * I)(n) &= \sum_{i=1}^k f(d_i)I(d_{k+1-i}) = f(d_1)I(d_k) + \dots + f(d_k)I(d_1) \\ &= f(d_k)I(d_1) = f(n)I(1) = f(n) \cdot 1 = f(n) \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned} (I * f)(n) &= \sum_{i=1}^k I(d_i)f(d_{k+1-i}) = I(d_1)f(d_k) + \dots + I(d_k)f(d_1) \\ &= I(d_1)f(d_k) = I(n)f(1) = 1 \cdot f(n) = f(n) \end{aligned}$$

(iii) Tenemos que

$$(f * (g+h))(n) = \sum_{i=1}^k f(d_i)(g+h)(d_{k+1-i}) = \sum_{i=1}^k f(d_i)[g(d_{k+1-i}) + h(d_{k+1-i})]$$

$$= \sum_{i=1}^k f(d_i)g(d_{k+1-i}) + \sum_{i=1}^k f(d_i)h(d_{k+1-i}) = (f * g)(n) + (f * h)(n).$$

(iv) La conmutatividad de la convolución de Dirichlet es clara, pues

$$(f * g)(n) = \sum_{i=1}^k f(d_i)g(d_{k+1-i}) = \sum_{i=1}^k g(d_i)f(d_{k+1-i}) = (g * f)(n).$$

■

Se puede definir también una multiplicación por escalares en el conjunto de funciones aritméticas.

Definición 1.8. Dados $c \in \mathbb{C}$ y $f \in \mathcal{A}$, se define $cf \in \mathcal{A}$ como la función

$$\begin{aligned} cf : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ n &\longmapsto cf(n). \end{aligned}$$

Es una demostración rutinaria verificar la siguiente proposición.

Proposición 1.3. *El grupo abeliano $(\mathcal{A}, +)$ junto con la multiplicación por escalares definida anteriormente constituyen un espacio vectorial sobre el campo \mathbb{C} , donde el elemento neutro aditivo es la función $\mathbf{0}$. De ahora en adelante, este espacio vectorial será llamado simplemente el espacio de las funciones aritméticas.*

Proposición 1.4. *Si $c \in \mathbb{C}$ y $f, g \in \mathcal{A}$ entonces $c(f * g) = (cf) * g = f * (cg)$.*

Demostración. Se tiene que para cualquier $n \in \mathbb{N}$,

$$(c(f * g))(n) = c(f * g)(n) = c \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} (cf(d))g\left(\frac{n}{d}\right) = ((cf) * g)(n).$$

Luego $c(f * g) = (cf) * g$. Las demás igualdades se prueban similarmente. ■

Corolario 1.1. *El anillo $(\mathcal{A}, +, *)$ es un álgebra conmutativa con identidad sobre el campo \mathbb{C} .*

1.2. Una norma para funciones aritméticas

Definición 1.9. Sea \mathcal{A} el conjunto de todas las funciones aritméticas. Definimos la función

$$\mathcal{N} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$f \mapsto \mathcal{N}(f) = \begin{cases} 0 & \text{si } f = \mathbf{0} \\ \min \{n : f(n) \neq 0\} & \text{si } f \neq \mathbf{0}. \end{cases}$$

Proposición 1.5. *La función \mathcal{N} definida anteriormente tiene las siguientes propiedades:*

- (I) $\mathcal{N}(f) = 0 \iff f = \mathbf{0}, \forall f \in \mathcal{A}$.
- (II) $\mathcal{N}(f * g) = \mathcal{N}(f)\mathcal{N}(g), \forall f, g \in \mathcal{A}$.
- (III) $\min\{\mathcal{N}(f), \mathcal{N}(g)\} \leq \mathcal{N}(f + g), \forall f, g \in \mathcal{A}$.
- (IV) Si $\mathcal{N}(f) \neq \mathcal{N}(g)$ entonces $\mathcal{N}(f + g) = \min\{\mathcal{N}(f), \mathcal{N}(g)\}$.

Demostración. (i) Si $f = \mathbf{0}$ por definición se tiene que $\mathcal{N}(f) = 0$. Si $f \neq \mathbf{0}$, entonces $\min \{n : f(n) \neq 0\} \neq 0$, i.e. $\mathcal{N}(f) \geq 1 \neq 0$. Por tanto $\mathcal{N}(f) = 0$ implica que $f = \mathbf{0}$.

(ii) Si $f = \mathbf{0}$ o $g = \mathbf{0}$ entonces $\mathcal{N}(f) = 0$ o $\mathcal{N}(g) = 0$. Además $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, es decir, $\mathcal{N}(f * g) = 0 = \mathcal{N}(f)\mathcal{N}(g)$. Supongamos pues que $f \neq \mathbf{0}$ y $g \neq \mathbf{0}$. Sean $a = \mathcal{N}(f)$ y $b = \mathcal{N}(g)$. Afirmamos que $ab = \min \{n : (f * g)(n) \neq 0\} = m$.

En efecto, se tiene

$$\begin{aligned} (f * g)(ab) &= \sum_{d|ab} f(d)g(ab/d) \\ &= \sum_{\substack{d|ab \\ a \leq d}} f(d)g(ab/d), \text{ pues } f(d) = 0, \forall d < a \\ &= \sum_{\substack{d|ab \\ a \leq d \\ ab/d \leq b}} f(d)g(ab/d), \text{ pues } a \leq d \implies ab/d \leq b \\ &= \sum_{a=d} f(d)g(ab/d), \text{ pues } g(d) = 0, \forall d < b \\ &= f(a)g(b) \neq 0. \end{aligned}$$

Luego $m \leq ab$ por elección de m . Si $m < ab$ entonces

$$(f * g)(m) = \sum_{d|m} f(d)g(m/d) = \sum_{\substack{d|m \\ b \leq m/d}} f(d)g(m/d) = \sum_{\substack{d|m \\ d < a}} f(d)g(m/d) = 0,$$

pues $b \leq m/d$ implica que $d < a$ y $f(d) = 0$. Pero esto contradice la elección de m . Por tanto, $m = ab$.

(iii) Sin pérdida de generalidad se puede suponer que $a \leq b$, de tal manera que $\min\{a, b\} = a$. Si $n < a$ entonces $(f + g)(n) = f(n) + g(n) = 0$, por lo que

$$\min\{\mathcal{N}(f), \mathcal{N}(g)\} = a \leq \min\{n : (f + g)(n) \neq 0\} = \mathcal{N}(f + g).$$

(iv) Supóngase de nuevo sin pérdida de generalidad que $a < b$. Entonces

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a) = f(a) + 0 = f(a) \neq 0,$$

por tanto, $\mathcal{N}(f + g) \leq a = \min\{a, b\} = \min\{\mathcal{N}(f), \mathcal{N}(g)\}$. El resultado se sigue ahora del inciso (iii). ■

Teorema 1.1. \mathcal{A} es un dominio entero.

Demostración. Si $f, g \in \mathcal{A}$ y $f * g = 0$ entonces $\mathcal{N}(f * g) = 0 \implies \mathcal{N}(f)\mathcal{N}(g) = 0 \implies \mathcal{N}(f) = 0$ o $\mathcal{N}(g) = 0 \implies f = 0$ o $g = 0$. ■

Observación 1.1. Como ocurre en cualquier anillo con identidad, el conjunto de elementos invertibles forma un grupo respecto a la operación de multiplicación, en este caso, respecto a la convolución de Dirichlet. Este grupo se denotará $(\mathcal{A}^*, *)$ o simplemente como \mathcal{A}^* cuando no haya riesgo de confusión.

Proposición 1.6. $f \in \mathcal{A}^*$ si y sólo si $\mathcal{N}(f) = 1$.

Demostración. Si $f(1) \neq 0$, defínase

$$\begin{aligned} f^{-1}(1) &= \frac{1}{f(1)} \\ f^{-1}(n) &= -\frac{1}{f(1)} \sum_{\substack{d|n \\ d \neq n}} f\left(\frac{n}{d}\right) f^{-1}(d), \quad n > 1. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Es fácil verificar que la ecuación (1.3) define a f^{-1} de tal forma que $f * f^{-1} = I$, pues $f(1)f^{-1}(1) = 1$ y si $n > 1$ entonces

$$\begin{aligned} (f * f^{-1})(n) &= \sum_{d|n} f(d) f^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) = f(1)f^{-1}(n) + \sum_{\substack{d|n \\ d \neq n}} f(d) f^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= f(1)f^{-1}(n) - f(1)f^{-1}(n) = 0 \end{aligned}$$

es decir, $f * f^{-1} = I$.

Si se supone ahora que f es invertible, entonces, en particular, se tiene que $(f * f^{-1})(1) = 1$, y por tanto $f(1) \neq 0$, es decir, $\mathcal{N}(f) = 1$. ■

Proposición 1.7. Si $N(f) = p$ para algún número primo p , entonces f es irreducible en \mathcal{A} .

Demostración. Como $p \neq 0$ y $p \neq 1$, entonces f no es cero ni es una unidad. Además, si $f = g * h$ para algunas funciones $g, h \in \mathcal{A}$, entonces $g, h \neq 0$, pues en caso contrario $f = 0$ y en consecuencia $N(f) = 0 \neq p$, así que $N(f)$ y $N(h)$ son enteros positivos. Luego $N(f) = N(g * h) = N(g)N(h) = p$ y como p es primo, entonces $N(g) = 1$ o bien $N(h) = 1$, es decir, g o h es unidad. Como g y h fueron arbitrarios, entonces f debe ser irreducible en \mathcal{A} . ■

Teorema 1.2 (Condición de la cadena ascendente). Si $\{f_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ es un conjunto de funciones aritméticas con la propiedad de que $f_1 \neq 0$ y $f_i = f_{i+1} * g_i$ y g_i no es unidad, para cada $i \in \mathbb{N}$, entonces $\{f_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ es un conjunto finito.

Demostración. Supóngase que $\{f_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ es un conjunto infinito. Se tiene que $N(f_i) = N(f_{i+1})N(g_{i+1}) > N(f_{i+1})$, para cada $i \in \mathbb{N}$, pues g_{i+1} no es unidad, en particular $N(f_1) > N(f_i), \forall i \in \mathbb{N}$. Luego $\{N(f_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ es una sucesión en \mathbb{N} , por ser $\{f_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ infinito, y además estrictamente creciente, por tanto $\lim_{i \rightarrow \infty} N(f_i) = \infty$, pero esto implica que $N(f_1) > n, \forall n \in \mathbb{N}$, en particular $N(f_1) > N(f_1)$, lo cual es absurdo. ■

El teorema anterior permite probar inmediatamente que cualquier elemento no cero y no unidad de \mathcal{A} se puede expresar como producto finito de elementos irreducibles de \mathcal{A} .

Proposición 1.8. Si $f \in \mathcal{A} \setminus (\mathcal{A}^* \cup \{0\})$, entonces f es producto finito de elementos irreducibles en \mathcal{A} .

Demostración. Como $f \neq 0$, en lo que sigue de esta demostración se debe tener que todas las funciones involucradas son distintas de cero. Se probará primero que f tiene un factor irreducible. En efecto, si f es irreducible, entonces no hay nada que probar. Supóngase que este no es el caso y por tanto $f = f_1 * g_1$, donde f_1 y g_1 no son unidades. Si f_1 es irreducible hemos concluido. En caso contrario se tiene $f_1 = f_2 * g_2$, donde f_2 y g_2 no son unidades y además $f_1 \neq f_2$, pues de otra forma se tendría, por la ley de cancelación, que $I = g_2$, contradiciendo la elección de g_2 . De manera inductiva se tiene una sucesión de funciones $\{f_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ tal que $f_i = f_{i+1} * g_{i+1}$, donde g_{i+1} no es unidad y $f_i \neq f_{i+1}, \forall i \in \mathbb{N}$, luego dicho conjunto es infinito, lo que contradice el Teorema 1.2. En consecuencia, el proceso anterior debe terminar y debe existir $M \in \mathbb{N}$ tal que $f_{M-1} = f_M * g_M$, donde f_M es irreducible y $f_M \mid f$.

Se probará ahora el resultado principal. Escribiendo $f_M = p_1$, se tiene que $f = p_1 * q_1$, con p_1 irreducible. Si q_1 es una unidad, entonces f es irreducible y ya terminamos. Si q_1 no es unidad, por el párrafo anterior, q_1 debe tener un factor irreducible, es decir,

$q_1 = p_2 * q_2$, donde p_2 es irreducible, y por tanto no es unidad, además, $q_1 \neq q_2$ pues de otra forma se tendría, por la ley de cancelación, que $I = p_2$, lo que contradice la elección de p_2 . Si q_2 es unidad, entonces q_1 es irreducible y $f = p_1 * q_1$ es la factorización buscada. Si este proceso nunca terminara, de forma inductiva se tendría una sucesión $\{q_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ tal que $q_i = p_{i+1} * q_{i+1}$, con p_i no unidad y además $q_i \neq q_{i+1}, \forall i \in \mathbb{N}$, de tal manera que dicho conjunto es infinito, lo que contradice de nuevo el Teorema 1.2. En consecuencia, el proceso eventualmente termina y por tanto existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $q_N = p_{N+1} * q_{N+1}$, donde q_{N+1} es unidad y p_{N+1} es irreducible. Luego

$$f = p_1 * p_2 * \cdots * p_N * q_N,$$

donde p_1, \dots, p_N y q_N son irreducibles. ■

Habiendo llegado hasta aquí, uno puede sospechar que el dominio \mathcal{A} es un dominio de factorización única. Esta sospecha es, de manera sorprendente, acertada. Sin embargo, la demostración de este hecho no es tan sencilla como la de la proposición anterior.

Teorema 1.3. *\mathcal{A} es un dominio de factorización única.*

Demostración. El hecho de que toda función aritmética se puede escribir como producto de funciones aritméticas irreducibles ha quedado en evidencia en la proposición anterior. Una demostración de la unicidad de dicha factorización se puede encontrar en [5, 18, p. 985]. Ahí se prueba que el anillo de series de potencias formales en un conjunto numerable de variables $\{x_1, x_2, \dots\}$ es un dominio de factorización única. El resultado se sigue entonces del hecho de que este anillo es isomorfo al anillo de funciones aritméticas mediante el isomorfismo

$$\begin{aligned} P : \mathcal{A} &\longrightarrow \mathbb{C}[[x_1, x_2, \dots]] \\ P(f) &\longmapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} f(n) x_1^{\alpha_1} \cdots x_v^{\alpha_v}, \end{aligned}$$

donde $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_v^{\alpha_v}$ es la factorización en primos de n . Se tiene que $P(f+g) = P(f) + P(g)$ y $P(f*g) = P(f)P(g)$, donde la multiplicación de dos series de este tipo se realiza agrupando términos “semejantes”, es decir, monomios iguales. Otra demostración de este hecho se puede encontrar en [13]. Ambas demostraciones utilizan el hecho de que los anillos de series de potencias formales en un número finito de variables $\mathbb{C}[[x_1, \dots, x_n]]$ son dominios de factorización única, para cada $n \in \mathbb{N}$. ■

Corolario 1.2. *Todo elemento irreducible en \mathcal{A} es primo en \mathcal{A} .*

Siendo \mathcal{A} un dominio de factorización única, cabe preguntarse si también es un dominio de ideales principales. La siguiente proposición muestra que este no es el caso.

Proposición 1.9. *\mathcal{A} no es un dominio de ideales principales.*

Demostración. Considere $f = (0, 1, 0, \dots)$ y $g = (0, 0, 1, 0, \dots)$. Se tiene que $N(f) = 2$ y $N(g) = 3$, ambos números primos. Afirmamos que I es un máximo común divisor de f y g . Claro que $I \mid f$ y $I \mid g$. Si $h \in \mathcal{A}$ es tal que $h \mid f$ y $h \mid g$, entonces $f = hk_1$ y $g = hk_2$, con $h, k_1, k_2 \in \mathcal{A} \setminus \{0\}$. Luego $2 = N(h)N(k_1) < 3 = N(h)N(k_2)$, en consecuencia, $1 \leq N(k_1) < N(k_2)$, así que necesariamente $N(k_2) = 3$ y $N(h) = 1$. Luego h es unidad, es decir $h \mid I$. Esto prueba que I es máximo común divisor de f y g . ■

Si \mathcal{A} fuera un dominio de ideales principales por [10, §III.3, Thm. 3.11.(ii), p. 140], existirían $s, t \in \mathcal{A}$ tales que $I = f * s + g * t$, en particular, $1 = I(1) = f(1)s(1) + g(1)t(1) = 0$, lo cual es imposible. ■

Teorema 1.4. *\mathcal{A} es un anillo local.*

Demostración. Por [10, §III.4, Thm. 4.13.(iii), p. 147], basta probar que los elementos no invertibles de \mathcal{A} forman un ideal de \mathcal{A} . En efecto, se tiene que $0 \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{A}^*$. Si $f \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{A}^*$ y $g \in \mathcal{A}$, entonces $f(1) = 0$, en consecuencia $(f * g)(1) = f(1)g(1) = 0$, es decir, $f * g \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{A}^*$. Además, si $h \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{A}^*$, entonces $h(1) = 0$ y por tanto $f(1) - h(1) = 0$, es decir $f - h \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{A}^*$. Esto prueba que $\mathcal{A} \setminus \mathcal{A}^*$ es un ideal de \mathcal{A} . ■

Proposición 1.10. *Si $f \in \mathcal{A}$ es tal que $f(1) = 0$ y $f(p) \neq 0$ para algún primo p , entonces f es irreducible en \mathcal{A} .*

Demostración. Por hipótesis f no es cero y no es unidad. Supongamos que $f = g * h$. Si g y h no fueran unidades se tendría que $g(1) = 0$ y $h(1) = 0$, por tanto, $f(p) = (g * h)(p) = g(1)h(p) + g(p)h(1) = 0$, lo que contradice la hipótesis. En consecuencia alguna de las funciones g o h es unidad. ■

Un colorario de la proposición anterior y el Corolario 1.2 es el siguiente.

Corolario 1.3. *Si $f \in \mathcal{A}$ es tal que $f(1) = 0$ y $f(p) \neq 0$ para algún primo p , entonces f es un elemento primo de \mathcal{A} .*

Hasta aquí se tiene que el anillo \mathcal{A} satisface cierto tipo de condición de la cadena ascendente. Sin embargo, la siguiente proposición muestra que en general no se cumple la condición de la cadena descendente, es decir, \mathcal{A} no es artiniiano.

Proposición 1.11. *\mathcal{A} no es un anillo artiniiano.*

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definase $I_n = \{f \in \mathcal{A} : N(f) \geq n\} \cup \{0\}$. Se tiene lo siguiente:

- (1) I_n es un ideal de \mathcal{A} , para cada n . En efecto, por definición se tiene $I_n \neq \emptyset$. Si $f, g \in I_n$ entonces $\mathcal{N}(f) \geq n$ y $\mathcal{N}(g) \geq n$, luego $\mathcal{N}(f - g) \geq \min\{\mathcal{N}(f), \mathcal{N}(-g)\} = \min\{\mathcal{N}(f), \mathcal{N}(g)\} \geq n$, luego $f - g \in I_n$.

Además, si $h \in \mathcal{A}$, se tienen dos casos. Si $h = \mathbf{0}$, entonces $f * h = 0 \in I_n$. Si $h \neq \mathbf{0}$, entonces $\mathcal{N}(h) \geq 1$, de tal manera que $\mathcal{N}(f * h) = \mathcal{N}(f)\mathcal{N}(h) \geq \mathcal{N}(f) \geq n$, es decir, $f * h \in I_n$. Esto prueba que I_n es un ideal de \mathcal{A} .

- (2) $I_{n+1} \subset I_n$, para cada $n \in \mathbb{N}$, pues $\mathcal{N}(f) \geq n + 1$ implica que $\mathcal{N}(f) \geq n$.

- (3) $I_n \not\subset I_{n+1}$, para cada $n \in \mathbb{N}$, pues considere $f \in \mathcal{A}$ definida como

$$f(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces $\mathcal{N}(f) = n < n + 1$, es decir, $f \in I_n$, pero $f \notin I_{n+1}$.

Se tiene pues una cadena descendente infinita de ideales de \mathcal{A} , luego \mathcal{A} no es artiniiano. ■

1.3. Funciones multiplicativas

Definición 1.10. (Función multiplicativa). Se dice que una función aritmética f es **multiplicativa** si no es idénticamente cero y para todo $m, n \in \mathbb{N}$, $(m, n) = 1$ implica que $f(mn) = f(m)f(n)$.

Observación 1.2. Se denota al conjunto de funciones multiplicativas como \mathcal{M} . En general si f y g son funciones multiplicativas entonces $f - g$ no es necesariamente una función multiplicativa, sin embargo, $f * g$ sí lo es.

Lema 1.3. Si $(a, b) = 1$ y $d \in \mathbb{N}$, entonces $(ab, d) = (a, d)(b, d)$.

Demostración. Escribanse $(a, d) = ax + dy$ y $(b, d) = bs + dt$, para algunos $x, y, s, t \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$(a, d)(b, d) = abxs + axdt + dybs + dydt = ab(xs) + d(axt + ybs + ydt),$$

por tanto, $(ab, d) \mid (a, d)(b, d)$.

Por otro lado, escribáse $1 = az + bw$, para algunos $z, w \in \mathbb{Z}$. Entonces $d = daz + dbw$. Además, como $a = (a, d)m$, $b = (b, d)n$, $d = (b, d)p$ y $d = (a, d)q$ para algunos $m, n, p, q \in \mathbb{Z}$, entonces

$$d = (a, d)(b, d)(pmz + qnw),$$

es decir, $(a, d)(b, d) \mid d$. Dado que $ab = (a, d)(b, d)mn$, entonces $(a, d)(b, d) \mid ab$ y en consecuencia $(a, d)(b, d) \mid (ab, d)$. Se sigue que $(ab, d) = (a, d)(b, d)$. ■

Lema 1.4. Si $(a, b) = 1$, a_1, \dots, a_l son todos los divisores positivos de a y b_1, \dots, b_m son todos los divisores positivos de b , entonces $\{d > 0 : d \mid ab\} = \{a_i b_j : i = 1, \dots, l, j = 1, \dots, m\}$.

Demostración. Si a_i, b_j son divisores de a y b , respectivamente, entonces existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $a = a_i s$ y $b = b_j t$, luego $ab = a_i b_j st$, es decir, $a_i b_j \mid ab$. Recíprocamente, si d es un divisor de ab , entonces $(ab, d) = d$, pero por el lema anterior $(ab, d) = (a, d)(b, d)$, luego $d = (a, d)(b, d)$, donde (a, d) es un divisor positivo de a y (b, d) es un divisor positivo de b . ■

Teorema 1.5. $(\mathcal{M}, *)$ es un subgrupo de $(\mathcal{A}^*, *)$.

Demostración. Si $f \in \mathcal{M}$, entonces $f \neq \mathbf{0}$ y existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $f(N) \neq 0$, luego $f(N) = f(1 \cdot N) = f(1)f(N)$ y en consecuencia $1 = f(1)$, es decir, $f \in \mathcal{A}^*$. Esto prueba que $\mathcal{M} \subset \mathcal{A}^*$.

Claro que el conjunto \mathcal{M} es no vacío, pues $I \in \mathcal{M}$. Veamos que la operación $*$ es cerrada en \mathcal{M} . Sean f, g funciones multiplicativas, sean $a, b \in \mathbb{N}$ tales que $(a, b) = 1$ y sean a_1, \dots, a_l y b_1, \dots, b_m todos los divisores positivos de a y b , respectivamente. Entonces $(a_i, b_j) = 1$, para cada $i = 1, \dots, l$ y para cada $j = 1, \dots, m$, luego

$$\begin{aligned} (f * g)(a)(f * g)(b) &= \left[\sum_{i=1}^l f(a_i)g\left(\frac{a}{a_i}\right) \right] \left[\sum_{j=1}^m f(b_j)g\left(\frac{b}{b_j}\right) \right] \\ &= \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m f(a_i)g\left(\frac{a}{a_i}\right) f(b_j)g\left(\frac{b}{b_j}\right) \\ &= \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m f(a_i b_j)g\left(\frac{ab}{a_i b_j}\right) \\ &= \sum_{d \mid ab} f(d)g\left(\frac{ab}{d}\right) = (f * g)(ab) \end{aligned}$$

por el Lema 1.4.

Como ya se probó al inicio de esta demostración, si f es multiplicativa entonces $f(1) = 1$, por lo que existe f^{-1} . Veamos que $f^{-1} \in \mathcal{M}$. Para esto construiremos, a partir de f , una función multiplicativa g con la propiedad de que $f * g = I$, con lo que quedará demostrado que f^{-1} es multiplicativa por la unicidad de la inversa. Se procede definiendo a g de forma gradual:

(1) $g(1) = 1$.

(2) Para cada primo p se define $g(p) = -f(p)$. De tal manera que

$$(f * g)(p) = \sum_{d|p} f(d)g\left(\frac{p}{d}\right) = f(1)g(p) + f(p)g(1) = -f(p) + f(p) = 0.$$

(3) Para cada $a \in \mathbb{N}$ y para cada primo p se define, recursivamente,

$$g(p^a) = -f(p)g(p^{a-1}) - \cdots - f(p^a)g(1)$$

de tal manera que

$$\begin{aligned} (f * g)(p^a) &= \sum_{d|p^a} f(d)g\left(\frac{p^a}{d}\right) = f(1)g(p^a) + f(p)g(p^{a-1}) + \cdots + f(p^a)g(1) \\ &= -f(p)g(p^{a-1}) - \cdots - f(p^a)g(1) + f(p)g(p^{a-1}) + \cdots + f(p^a)g(1) = 0. \end{aligned}$$

(4) Se define

$$g\left(\prod p_i^{a_i}\right) = \prod g(p_i^{a_i}).$$

para cualquier producto finito de potencias de primos, con $p_i \neq p_j$ si $i \neq j$. La función g ha quedado entonces definida para cualquier entero positivo.

(5) g es multiplicativa, pues si $a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_m^{\alpha_m}$ y $b = q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}$ son tales que $(a, b) = 1$, entonces $p_i \neq q_j$, luego

$$\begin{aligned} g(ab) &= g(p_1^{\alpha_1} \cdots p_m^{\alpha_m} q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}) = g(p_1^{\alpha_1}) \cdots g(p_m^{\alpha_m}) g(q_1^{\beta_1}) \cdots g(q_l^{\beta_l}) \\ &= g(p_1^{\alpha_1} \cdots p_m^{\alpha_m}) g(q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}) = g(a)g(b) \end{aligned}$$

(6) Como la operación $*$ es cerrada en \mathcal{M} , entonces $f * g$ es multiplicativa.

(7) Si $n > 1$ y $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_l^{\alpha_l}$ es su factorización en primos, entonces

$$(f * g)(n) = (f * g)(p_1^{\alpha_1}) \cdots (f * g)(p_l^{\alpha_l}) = 0$$

donde la primera igualdad se cumple por ser $f * g$ multiplicativa y la segunda por el inciso (3). Además, $(f * g)(1) = f(1)g(1) = 1$. En consecuencia $f * g = I$.

(8) Se sigue que $g = f^{-1}$ y como g es multiplicativa, entonces f^{-1} también lo es. ■

Corolario 1.4. Si $f * g$ es multiplicativa y g es multiplicativa, entonces f también lo es.

Demostración. Como g es multiplicativa, entonces existe g^{-1} y también es multiplicativa, luego $f = (f * g) * g^{-1}$ es multiplicativa por ser producto de funciones multiplicativas. ■

1.4. Isomorfismos entre grupos de funciones aritméticas

Se denotará como $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ al conjunto de funciones aritméticas real valuadas, es decir, $\mathcal{A}_{\mathbb{R}} = \{f \in \mathcal{A} : f(n) \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}\}$. Asimismo, se define $P = \{f \in \mathcal{A} : f(1) > 0\}$. Es fácil verificar que $(\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +)$ y $(P, *)$ son subgrupos de $(\mathcal{A}, +)$ y de $(\mathcal{A}^*, *)$, respectivamente. Más aún, estos grupos son isomorfos.

Lema 1.5. $(\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +) \cong (P, *)$.

Demostración. El isomorfismo buscado es

$$\begin{aligned} L : (P, *) &\longrightarrow (\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +) \\ f &\longmapsto Lf \end{aligned}$$

donde $Lf(1) = \log(1)$ y $Lf(n) = \sum_{d|n} \log(d)f(d)f^{-1}(n/d)$ para $n > 1$. Se tiene que L es en efecto un homomorfismo, pues para $n = 1$ se tiene

$$L(f * g)(1) = \log(f * g)(1) = \log(f(1)g(1)) = \log f(1) + \log g(1) = Lf(1) + Lg(1).$$

Para el caso $n > 1$, nótese primero que para cualquier $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \log(n)(f * g)(n) &= \log(n) \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \left[\log \frac{n}{d} + \log d \right] \\ &= \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \log\left(\frac{n}{d}\right) + \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \log(d) \\ &= (f * (\log \cdot g))(n) + ((\log \cdot f) * g)(n), \end{aligned}$$

es decir, $\log \cdot (f * g) = f * (\log \cdot g) + (\log \cdot f) * g$. Multiplicando por $(f * g)^{-1} = f^{-1} * g^{-1}$ a ambos lados de la ecuación, se tiene que

$$(\log \cdot (f * g)) * (f * g)^{-1} = (\log \cdot g) * g^{-1} + (\log \cdot f) * f^{-1},$$

es decir, $L(f * g) = Lf + Lg$ y en particular para $n > 1$. Esto prueba que L es un homomorfismo.

L también es suprayectivo, pues si $f \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$, defínase $g(1) = \exp(f(1))$. Entonces $Lg(1) = \log g(1) = \log \exp(f(1)) = f(1)$, pues $f(1) \in \mathbb{R}$. Además, como $g(1) > 0$ existe g^{-1} y se define recursivamente, para $n > 1$,

$$g(n) = \frac{1}{\log(n)g^{-1}(1)} \left[f(n) - \sum_{\substack{d|n \\ d \neq 1, n}} \log(d)g(d)g^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) \right].$$

Esta ecuación implica que

$$\begin{aligned} f(n) &= g(n) \log(n) g^{-1}(1) + g(1) \log(1) g^{-1}(n) + \sum_{\substack{d|n \\ d \neq 1, n}} \log(d) g(d) g^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= \sum_{d|n} \log(d) g(d) g^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) = Lg(n). \end{aligned}$$

En consecuencia, $Lg(n) = f(n), \forall n \in \mathbb{N}$, es decir, $Lg = f$.

Finalmente, se tiene que L es inyectivo. En efecto, si $L(f) = L(g)$, entonces $L(f) - L(g) = 0$, pero $-Lg = Lg^{-1}$ por ser L un homomorfismo, luego $Lf + Lg^{-1} = L(f * g^{-1}) = 0$. Para $n = 1$ esto implica que $\log(f * g^{-1}(1)) = 0$ y por tanto $(f * g^{-1})(1) = 1$. Si $n = 2$, entonces

$$L(f * g^{-1})(2) = \log(1)(f * g^{-1})(1)(f * g^{-1})^{-1}(2) + \log(2)(f * g^{-1})(2)(f * g^{-1})(1) = 0,$$

pero $\log(1) = 0$, por tanto $\log(2)(f * g^{-1})(2)(f * g^{-1})(1) = 0$ y dado que $(f * g^{-1})(1) \neq 0$, entonces $(f * g^{-1})(2) = 0$. Supóngase que $(f * g^{-1})(d) = 0$, para cada $1 < d < n$. Entonces $L(f * g) = 0$ implica que

$$\log(n)(f * g^{-1})(n)(f * g^{-1})(1) + \sum_{\substack{d|n \\ d \neq 1, n}} \log(d) \underbrace{(f * g^{-1})(d)}_0 (f * g^{-1})^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) = 0,$$

pues $\log(1) = 0$, por tanto, $\log(n)(f * g^{-1})(n)(f * g^{-1})(1) = 0$ y por tanto $(f * g^{-1})(n) = 0$. Esto prueba que para cada $n > 1$, $(f * g^{-1}) = 0$. Así pues, se tiene que $f * g^{-1} = I$, por tanto, $f = g$. ■

Se denota $\mathcal{A}' = \{f \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}} : f(n) = 0, \forall n \neq p^{\alpha}, p \text{ primo y } \alpha \in \mathbb{N}\}$. La siguiente proposición es una caracterización de las funciones multiplicativas respecto al conjunto \mathcal{A}' y al isomorfismo L .

Proposición 1.12. $f \in \mathcal{M}$ si y sólo si $Lf \in \mathcal{A}'$.

Demostración. Supóngase primero que f es multiplicativa. Entonces $f(1) = 1$, por tanto, $Lf(1) = \log f(1) = \log 1 = 0$. Si $N > 1$ no es potencia de ningún primo, entonces $N = mn$, con $(m, n) = 1$ y $n, m > 1$. Luego

$$\begin{aligned} Lf(N) &= Lf(mn) = \sum_{d|mn} \log(d) f(d) f^{-1}\left(\frac{mn}{d}\right) \\ &= \sum_{d|m} \sum_{e|n} f(d) f(e) f^{-1}\left(\frac{m}{d}\right) f^{-1}\left(\frac{n}{e}\right) (\log(d) + \log(e)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{d|m} \log(d) f(d) f^{-1}\left(\frac{m}{d}\right) \sum_{e|n} f(e) f^{-1}\left(\frac{n}{e}\right) \\
&+ \sum_{e|n} \log(e) f(e) f^{-1}\left(\frac{n}{e}\right) \sum_{d|m} f(d) f^{-1}\left(\frac{m}{d}\right) \\
&= Lf(m) \sum_{e|n} f(e) f^{-1}\left(\frac{n}{e}\right) + Lf(n) \sum_{d|m} f(d) f^{-1}\left(\frac{m}{d}\right) \\
&= Lf(m)I(n) + Lf(n)I(m) = 0,
\end{aligned}$$

pues $m, n > 1$. Luego $f \in \mathcal{A}'$.

Recíprocamente, supóngase que $Lf \in \mathcal{A}'$. En particular se tiene que $Lf(1) = 0$ y por tanto $f(1) = 1$. Se definirá una función multiplicativa g y se probará que coincide con f .

(1) Se define $g(1) = 1 = f(1)$.

(2) Para cada primo, se define

$$g(n) = \prod_{p|n} f(p^v),$$

donde $v := \max\{\alpha : p^\alpha \mid n\}$.

(3) g es multiplicativa, pues $(m, n) = 1$ implica que

$$g(mn) = \prod_{p|mn} f(p^v) = \prod_{p|n} f(p^v) \prod_{p|m} f(p^v) = g(m)g(n).$$

(4) g coincide con f en todas las potencias de primos, pues si q es un primo y $\alpha \in \mathbb{N}$,

$$g(q^\alpha) = \prod_{p|q^\alpha} f(p^v) = f(q^\alpha).$$

(5) g^{-1} coincide con f^{-1} en todas las potencias de primos, pues si q es primo,

$$g^{-1}(q) = - \sum_{\substack{d|q \\ d \neq q}} g\left(\frac{q}{d}\right) g^{-1}(d) = -g(q)g^{-1}(1) = -g(q) = -f(q) = f^{-1}(q),$$

por el punto 4. Además, de forma recursiva se tiene que

$$\begin{aligned}
g^{-1}(q^\alpha) &= -[g(q^{\alpha-1})g^{-1}(1) + \dots + g(q)g^{-1}(q^{\alpha-1})] \\
&= -[f(q^{\alpha-1})f^{-1}(1) + \dots + f(q)f^{-1}(q^{\alpha-1})] = f^{-1}(q^\alpha),
\end{aligned}$$

donde g^{-1} coincide con f^{-1} en $1, q, q^2, \dots, q^{\alpha-1}$.

(6) El punto anterior implica que $Lf(q^\alpha) = Lg(q^\alpha)$ para todo primo q y para todo $\alpha \in \mathbb{N}$, pues

$$Lf(q^\alpha) = \sum_{d|p^\alpha} \log(d) f(d) f^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|p^\alpha} \log(d) g(d) g^{-1}\left(\frac{n}{d}\right) = Lg(q^\alpha).$$

Además, como g es multiplicativa, entonces $Lg(n) = 0$ para todo n no potencia de algún primo, por la primera parte de esta demostración. Luego, por hipótesis se tiene que $Lf(n) = 0 = Lg(n)$ para todo n no potencia de algún primo, así que de hecho $Lf(n) = Lg(n)$ para todo n , es decir, $Lf = Lg$ y como la aplicación L es inyectiva, entonces $f = g$. Luego f es multiplicativa, pues g lo es. ■

Lema 1.6. $(\mathcal{M}, *) \cong (\mathcal{A}', +)$.

Demostración. Es fácil ver que $(\mathcal{A}', +)$ es un subgrupo de $(\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +)$ y que $(\mathcal{M}, *)$ es un subgrupo de $(P, *)$. Luego la restricción del homomorfismo a L a $(\mathcal{M}, *)$ sigue siendo un isomorfismo y su imagen es $(\mathcal{A}', +)$ por la proposición anterior. ■

Lema 1.7. $(\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +) \cong (\mathcal{A}', +)$.

Demostración. Sea

$$\begin{aligned} \phi : (\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +) &\longrightarrow (\mathcal{A}', +) \\ f &\longmapsto F, \end{aligned}$$

donde F es la función definida como $F(n) = f(p_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ y p_n es el n -ésimo término en la sucesión de potencias de primos en orden ascendente.

Se tiene que ϕ es un homomorfismo, pues $\phi(f+g)(n) = (f+g)(p_n) = f(p_n) + g(p_n) = \phi(f)(n) + \phi(g)(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, luego $\phi(f+g) = F+G$. Se también tiene que ϕ es inyectivo, pues si $f, g \in (\mathcal{A}', +)$ son tales que $\phi(f) = \phi(g)$, entonces $f(p_n) = g(p_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, además $f(n) = g(n) = 0$ si n no es potencia de algún primo, de manera que $f(n) = g(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, es decir, $f = g$.

Finalmente se tiene que ϕ es suprayectivo, pues si $F \in (\mathcal{A}', +)$, defínase $f(p_n) = F(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ y $f(n) = 0$ para toda n no potencia de algún primo. Entonces $f \in (\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +)$ y $\phi(f)(n) = f(p_n) = F(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, es decir, $\phi(f) = F$. ■

Lema 1.8. $(\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +) \cong (\mathcal{A}_1, +)$, donde $\mathcal{A}_1 = \{f \in \mathcal{A} : f(1) \in \mathbb{R}\}$.

Demostración. Es claro que $(\mathcal{A}_1, +)$ es un grupo aditivo. Defínase

$$\begin{aligned}\psi : (\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +) &\longrightarrow (\mathcal{A}_1, +) \\ f &\longmapsto F\end{aligned}$$

donde F es la función definida como $F(n) = f(2n - 2) + if(2n - 1), \forall n > 1$ y $F(1) = f(1)$. Se tiene que ψ es un homomorfismo, pues $\psi(f + g)(1) = (f + g)(1) = f(1) + g(1) = \psi(f)(1) + \psi(g)(1)$, además,

$$\begin{aligned}\psi(f + g)(n) &= (f + g)(2n - 2) + i(f + g)(2n - 1) \\ &= f(2n - 2) + g(2n - 2) + if(2n - 1) + ig(2n - 1) \\ &= [f(2n - 2) + if(2n - 1)] + [g(2n - 2) + ig(2n - 1)] \\ &= \psi(f)(n) + \psi(g)(n),\end{aligned}$$

luego $\psi(f + g) = \psi(f) + \psi(g)$.

El homomorfismo ψ es también inyectivo, pues si $f, g \in (\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +)$ son tales que $\psi(f) = \psi(g)$, entonces $f(n), g(n) \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$ y además $f(2n - 2) + if(2n - 1) = g(2n - 2) + ig(2n - 1)$, por tanto $f(2n - 2) = g(2n - 2)$ y $f(2n - 1) = g(2n - 1)$ y $f(1) = g(1)$, así que $f(n) = g(n), \forall n \in \mathbb{N}$, es decir $f = g$.

Finalmente, ψ también es suprayectivo, pues dada $F \in (\mathcal{A}_1, +)$, se puede escribir $F = F_1 + iF_2$, donde $F_1, F_2 \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$. Defínase $g(1) = F(1)$ y

$$g(n) = \begin{cases} F_1\left(\frac{n}{2} + 1\right) & \text{si } n \text{ es par} \\ F_2\left(\frac{n+1}{2}\right) & \text{si } n \text{ es impar y } n > 1. \end{cases}$$

Entonces $g \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}, \psi(g)(1) = g(1) = F(1)$ y $\psi(g)(n) = g(2n - 2) + ig(2n - 1) = F_1(n) + iF_2(n) = F(n)$ para cada $n > 1$, es decir, $\psi(g) = F$. ■

Lema 1.9. $(\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +) \cong (\mathcal{A}, +)$.

Demostración. Defínase

$$\begin{aligned}\gamma : (\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +) &\longrightarrow (\mathcal{A}, +) \\ f &\longmapsto F,\end{aligned}$$

donde F es la función definida como $F(n) = f(2n - 1) + if(2n), \forall n \in \mathbb{N}$. Se tiene que γ es un homomorfismo, pues

$$\gamma(f + g)(n) = (f + g)(2n - 1) + i(f + g)(2n)$$

$$\begin{aligned}
&= f(2n-1) + g(2n-1) + if(2n) + ig(2n) \\
&= [f(2n-1) + if(2n)] + [g(2n-1) + ig(2n)] \\
&= \gamma(f)(n) + \gamma(g)(n),
\end{aligned}$$

por tanto, $\gamma(f+g) = \gamma(f) + \gamma(g)$.

El homomorfismo γ es también inyectivo, pues si $f, g \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ son tales que $\gamma(f) = \gamma(g)$, entonces $\gamma(f)(n) = \gamma(g)(n)$ para cada n , luego $f(2n-1) + if(2n) = g(2n-1) + ig(2n)$, por tanto $f(2n-1) = g(2n-1)$ y $f(2n) = g(2n)$ para cada n , en consecuencia $f(n) = g(n), \forall n \in \mathbb{N}$, es decir, $f = g$.

Finalmente, se tiene que γ es suprayectivo, pues si $F \in \mathcal{A}$, se puede escribir $F = F_1 + iF_2$, con $F_1, F_2 \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$. Defínase

$$f(n) = \begin{cases} F_1\left(\frac{n+1}{2}\right) & \text{si } n \text{ es impar} \\ F_2\left(\frac{n}{2}\right) & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

Entonces, $\gamma(f)(n) = f(2n-1) + if(2n) = F_1(n) + iF_2(n) = F(n)$, para cada n , es decir, $f \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ es tal que $\gamma(f) = F$. ■

El resultado principal de esta sección es el siguiente, corolario de los lemas 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9.

Teorema 1.6. *Los grupos $(\mathcal{A}_{\mathbb{R}}, +)$, $(P, *)$, $(\mathcal{M}, *)$, $(\mathcal{A}', +)$, $(\mathcal{A}_1, +)$ y $(\mathcal{A}, +)$ son todos isomorfos.*

1.5. Algunas funciones aritméticas conocidas

A continuación se presentan algunas funciones aritméticas que aparecen frecuentemente en teoría de números.

Definición 1.11. (Función idéntica). La función idéntica N es tal que $N(n) = n$, para cada $n \in \mathbb{N}$.

Definición 1.12. (Función φ de Euler). Para cada $n \geq 1$, se define la función φ de Euler $\varphi(n)$ como el número de enteros positivos no mayores a que n que son primos relativos a n .

Definición 1.13. (Función de Mangoldt). Para todo $n \in \mathbb{N}$, definimos la función de Mangoldt como

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p & \text{si } n = p^m \text{ para algún primo } p \text{ y } m \geq 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Definición 1.14. (Función de Liouville). Se define a la función λ de Liouville como $\lambda(1) = 1$ y dada $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ la factorización de n en primos, entonces $\lambda(n) = (-1)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k}$.

Definición 1.15. (Función divisor). Para cada $k \in \mathbb{C}$ se define la función divisor de orden k como

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k.$$

A la función divisor de orden 1 la llamaremos simplemente función divisor y se denotará como σ en vez de σ_1 . La función divisor de orden 0 se denomina función número de divisores y se denota d .

Las funciones aritméticas por sí mismas pueden tener comportamientos aleatorios y difíciles de predecir, pero se pueden observar algunas regularidades cuando sumamos todos los valores que toma la función en los divisores positivos de un número natural dado. Para esto definimos la siguiente notación:

Se tienen las siguientes propiedades básicas de algunas funciones aritméticas.

Proposición 1.13. Para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$\sum_{d|n} \mu(d) = I(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

Demostración. Si $n = 1$, por definición $\mu(n) = 1$. Supongamos que $n > 2$ y sea $n = q_1^{\alpha_1} \cdots q_k^{\alpha_k}$ la factorización de n en primos. Todos los divisores de n son de la forma $n = q_1^{\beta_1} \cdots q_k^{\beta_k}$, con $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$, $\forall i = 1, \dots, k$. Sin embargo, hace falta considerar sólo los factores donde $0 \leq \beta_i \leq 1$, pues la función de Möbius se anula para cualesquiera otros. Para un $1 \leq i \leq k$ dado, existen $\binom{k}{i}$ i -combinaciones (sin repetición y desordenadas) de elementos del conjunto $P = \{q_1, \dots, q_k\}$, véase [4]. Luego la suma buscada es igual a

$$\begin{aligned} & \mu(1) + \sum_{p_1 \in \{q_1, \dots, q_k\}} \mu(p_1) + \sum_{\substack{p_1, p_2 \in \{q_1, \dots, q_k\} \\ p_1 \neq p_2}} \mu(p_1 p_2) + \cdots + \sum_{\substack{p_1, \dots, p_k \in \{q_1, \dots, q_k\} \\ p_1 \neq p_2 \neq \dots \neq p_k}} \mu(p_1 \cdots p_k) \\ &= \binom{k}{0}(-1)^0 + \binom{k}{1}(-1)^1 + \binom{k}{2}(-1)^2 + \cdots + \binom{k}{k}(-1)^k = (1 - 1)^k = 0 \end{aligned}$$

Es decir, $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$. ■

Corolario 1.5 (Inversión de Möbius). Si $f, g \in \mathcal{A}$, entonces para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{d|n} f(n) = g(n) \iff \sum_{d|n} g(n) \mu\left(\frac{n}{d}\right) = f(n)$$

Demostración. De acuerdo con la proposición anterior, se tiene $\mu * 1 = 1 * \mu = I$, de tal manera que

$$f * 1 = g \iff f * 1 * \mu = g * \mu \iff f * I = g * \mu \iff f = g * \mu,$$

lo cual es equivalente al enunciado. ■

Proposición 1.14 (Gauss). Para todo $n \in \mathbb{N}$ se verifica que

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Demostración. La siguiente demostración es debida a Gauss en [8]. Sea $n \in \mathbb{N}$ y sean d_1, \dots, d_k los distintos divisores positivos de n . Para cada d_i , sean $c_{i,1}, \dots, c_{i,m_i}$ todos los enteros positivos primos relativos y no mayores a d_i . Notemos que $\varphi(d_i) = m_i$. Afirmamos que el conjunto formado por los números

$$\begin{array}{cccc} (n/d_1)c_{1,1} & (n/d_1)c_{1,2} & \cdots & (n/d_1)c_{1,m_1} \\ (n/d_2)c_{2,1} & (n/d_2)c_{2,2} & \cdots & (n/d_2)c_{2,m_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (n/d_k)c_{k,1} & (n/d_k)c_{k,2} & \cdots & (n/d_k)c_{k,m_k} \end{array}$$

es igual a $\{1, 2, \dots, n\}$. En efecto, sea r un entero positivo tal que $1 \leq r \leq n$ y sea $d = (n, r)$. Notemos que n/d es un divisor de n , $r/d \leq n/d$ y $(n/d, r/d) = 1$. Además $(n/(n/d))(r/d) = r$, luego r está entre los elementos de la tabla anterior. Recíprocamente, se tiene que $1 \leq (n/d_i)c_{i,j} \leq (n/d_i)d_i = n$, $\forall i = 1, \dots, k$, $\forall j = 1, \dots, m_i$.

Finalmente veamos que todos los elementos de la tabla son distintos. Es claro que todos los elementos de cada fila son distintos, pues los divisores de cada d_i son distintos por hipótesis. Si dos números fueran iguales, para algunos divisores M y N de n distintos, podemos suponer que $M > N$. Se tendría pues que $(n/M)\mu = (n/N)\nu$, donde μ es primo relativo a M y ν es primo relativo a N , luego $\mu N = \nu M$, de manera que $M \mid \mu N$, por tanto $M \mid N$, lo cual no puede ser pues $M > N$. Finalmente:

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = \varphi(d_1) + \dots + \varphi(d_k) = m_1 + \dots + m_k = |\{1, \dots, n\}| = n$$

■

Existe una relación entre las funciones μ y φ al sumar sobre los divisores de un entero positivo. El siguiente lema será útil para probar dicha relación.

Lema 1.10. Si $n \in \mathbb{N}$, d es un divisor positivo de n , $S = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq n\}$ y $A = \{x \in S : d \mid x\}$ entonces $|A| = n/d$.

Demostración. En efecto, tenemos que la función

$$F : \{1, \dots, n/d\} \longrightarrow A \\ x \longmapsto dx$$

es biyectiva, pues si $x, y \in \{1, \dots, n/d\}$ son tales que $F(x) = F(y)$, entonces $dx = dy$ y por tanto $x = y$, pues $d \neq 0$. Además, si $r \in A$ entonces $d \mid r$ y $1 \leq r \leq n$, por lo que existe $q \in \mathbb{N}$ tal que $r = dq$, luego q es tal que $1 \leq q \leq n/d$ y $F(q) = dq = r$. En consecuencia $|A| = |\{1, \dots, n/d\}| = n/d$ ■

Proposición 1.15. Para todo $n \in \mathbb{N}$ se verifica que

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) \frac{n}{d} = \varphi(n).$$

Demostración. Si $n = 1$ claro que se tiene $\mu(1) = \varphi(1) = 1$. Supongamos que $n > 1$ y sea $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ su factorización en primos. Sea $S = \{1, \dots, n\}$ y para cada $i = 1, \dots, r$ definamos $A_i = \{x \in S : p_i \mid x\}$.

Si $1 \leq m \leq r$, como todos los p_i son primos distintos, se debe tener que

$$\bigcap_{s=1}^m A_i = \{x \in S : p_1 \mid x, p_2 \mid x, \dots, p_m \mid x\} = \{x \in S : p_1 p_2 \dots p_m \mid x\}.$$

Por otro lado, notemos que si $P = \{x \in S : (n, x) = 1\}$ entonces

$$\bigcap_{i=1}^r S \setminus A_i = P.$$

En efecto, si $x \in \bigcup_{i=1}^r A_i$ entonces $x \in S$ y $p_i \mid x$, para algún p_i , de manera que $p_i \mid n$ y $p_i \mid x$, y por tanto $(n, x) \geq p_i > 1$, luego $x \notin P$. Recíprocamente, si $x \in S$ y $x \notin P$, entonces $(n, x) > 1$ y por tanto debe existir un primo q que divide a (n, x) , pero $(n, x) \mid n$ y $(n, x) \mid x$, por lo que $q \mid n$ y $q \mid x$, luego $q = p_i$, para algún $i = 1, \dots, m$. En consecuencia, $p_i \mid x$ y por tanto $x \in \bigcup_{i=1}^r A_i$. Se sigue que $\bigcup_{i=1}^r A_i = S \setminus P$, o bien $\bigcap_{i=1}^r S/A_i = P$.

Como $p_1 \cdots p_m \mid n$, $\forall m = 1, \dots, r$, por el lema (1.10) se debe tener que $|\bigcap_{s=1}^m A_i| = n/p_1 \cdots p_m$, $\forall m = 1, \dots, r$. Finalmente, por el principio de inclusión-exclusión, se tiene que

$$\begin{aligned} \varphi(n) = |P| &= \left| \bigcap_{i=1}^r S \setminus A_i \right| = |S| + \sum_{i_1 \in \{1, \dots, r\}} (-1) |A_{i_1}| + \sum_{\substack{i_1, i_2 \in \{1, \dots, r\} \\ i_1 \neq i_2}} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \dots \\ &+ \sum_{\substack{i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, r\} \\ i_1 \neq \dots \neq i_r}} (-1)^r |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_r}| = n + \sum_{i_1 \in \{1, \dots, r\}} (-1) \frac{n}{p_{i_1}} + \sum_{\substack{i_1, i_2 \in \{1, \dots, r\} \\ i_1 \neq i_2}} \frac{n}{p_{i_1} p_{i_2}} + \dots \\ &+ \sum_{\substack{i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, m\} \\ i_1 \neq \dots \neq i_r}} (-1)^r \frac{n}{p_{i_1} \cdots p_{i_r}} = n + \sum_{i_1 \in \{1, \dots, r\}} \mu(p_{i_1}) \frac{n}{p_{i_1}} + \sum_{\substack{i_1, i_2 \in \{1, \dots, r\} \\ i_1 \neq i_2}} \mu(p_{i_1} p_{i_2}) \frac{n}{p_{i_1} p_{i_2}} + \\ &\dots + \sum_{\substack{i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, m\} \\ i_1 \neq \dots \neq i_r}} \mu(p_{i_1} \cdots p_{i_r}) \frac{n}{p_{i_1} \cdots p_{i_r}} = \sum_{d \mid n} \mu(d) \frac{n}{d}. \end{aligned}$$

■

Corolario 1.6. *La función φ es multiplicativa, pues $\varphi = \mu * N$, donde μ y N son funciones multiplicativas.*

2. Funciones pares

Al estudiar el espacio de funciones aritméticas se puede hacer una analogía con la teoría de Fourier del análisis para funciones definidas en todo el plano real o complejo, para la cuál se necesitará la noción de periodicidad. En este capítulo se considerarán dos clases de funciones aritméticas que capturan esta noción y se probará que son equivalentes. También se expondran resultados análogos a los de análisis respecto a funciones periódicas. Estos resultados se puede encontrar en [6].

Observación 2.1. Durante todo el capítulo se supondrá que r es un entero positivo arbitrario pero fijo.

Definición 2.1. (Función par). Una función aritmética se dice **par** mód r si $f(n) = f((n, r))$, donde (m, r) es el máximo común divisor de n y r , para cada $n \in \mathbb{N}$.

Definición 2.2. (Función periódica). Una función aritmética se dice **periódica** con periodo r (o periódica mód r) si $m, n \in \mathbb{N}$ y $m \equiv n \pmod{r}$ implica que $f(m) = f(n)$.

La siguiente proposición es una consecuencia inmediata de las definiciones anteriores.

Proposición 2.1. *Toda función par mód r es periódica con periodo r .*

Demostración. Si $m \equiv n \pmod{r}$ entonces $r \mid m - n$, por tanto existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $m - n = qr$. Por demostrar que $(n, r) = (m, r)$. En efecto, como $(n, r) \mid n$ y $(n, r) \mid r$, entonces $(n, r) \mid n + qr = m$, luego $(n, r) \mid (m, r)$. Análogamente, se tiene que $(m, r) \mid (n, r)$. Se sigue que $(n, r) = (m, r)$ y por tanto $f(n) = f((n, r)) = f((m, r)) = f(m)$. ■

2.1. Sumas de Ramanujan

Definición 2.3. (Sumas de Ramanujan). Se define la función aritmética c_r como

$$c_r(n) = \sum_{d \mid (n, r)} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d. \quad (2.1)$$

Esta función será referida como la suma de Ramanujan módulo r o simplemente suma de Ramanujan cuando no haya riesgo de confusión.

Proposición 2.2. *Algunas propiedades de la sumas de Ramanujan son las siguientes:*

(1) $c_1 = 1$

(2) $c_r(1) = \mu(r)$

(3) $c_r(n) \leq \max\{\sigma(r), \sigma(n)\}$

(4) $c_r(n)$ es una función multiplicativa de r

(5) Si p es primo y m es un entero positivo, entonces

$$c_{p^m}(n) = \begin{cases} p^m - p^{m-1} & \text{si } p^m \mid n \\ -p^{m-1} & \text{si } p^{m-1} \mid n \text{ pero } p^m \nmid n \\ 0 & \text{si } p^{m-1} \nmid n. \end{cases}$$

Demostración. (1) Para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $(n, 1) = 1$ y por tanto

$$c_1(n) = \sum_{d \mid (n,1)} \mu\left(\frac{1}{d}\right) d = \mu(1)1 = 1.$$

(2) De manera similar,

$$c_r(1) = \sum_{d \mid (1,r)} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d = \mu(r)1 = \mu(r).$$

(3) Por definición se tiene que $\sigma(k) = \sum_{d \mid k} d$. Además $\mu(k) \leq 1$ para todo $k \in \mathbb{N}$, luego

$$c_r(n) = \sum_{d \mid (n,r)} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d \leq \sum_{d \mid (n,r)} d = \sum_{\substack{d \mid n \\ d \mid r}} d \leq \sum_{d \mid n} d, \sum_{d \mid r} d \leq \max\{\sigma(n), \sigma(r)\}.$$

(4) Defínase

$$\eta_r(n) = \begin{cases} r & \text{si } r \mid n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Se tiene que la función $\eta_{\square}(n)$ es multiplicativa para n fijo. En efecto, si $r, s \in \mathbb{N}$ son tales que $(r, s) = 1$, entonces

$$\eta_{rs}(n) = \begin{cases} rs & \text{si } rs \mid n \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

pero $rs \mid n$ si y sólo si $r \mid n$ y $s \mid n$. En efecto, si $rs \mid n$ es claro que $r \mid n$ y $s \mid n$. Supóngase que $r \mid n$ y $s \mid n$, de tal manera que existen $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ tales que

$n = rq_1 = sq_2$. Como $(r, s) = 1$, también existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = rx + sy$, luego $n = nr x + nsy$, por lo que $n = rs(q_2x + q_1y)$, es decir, $rs \mid n$. Luego, si $rs \mid n$, entonces

$$\eta_{rs}(n) = rs = \eta_r(n)\eta_s(n),$$

y si $rs \nmid n$ entonces $r \nmid n$ y $s \nmid n$, por lo que

$$\eta_{rs}(0) = 0 = \eta_r(n)\eta_s(n).$$

Por otro lado, se tiene que

$$\sum_{d \mid r} \mu\left(\frac{r}{d}\right) \eta_d(n) = \sum_{\substack{d \mid r \\ d \mid n}} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d = \sum_{d \mid (n, r)} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d = c_r(n),$$

es decir, $c_{\square}(n) = \mu * \eta_{\square}(n)$. Luego $c_{\square}(n)$ debe ser multiplicativa para n fijo, por ser producto de funciones multiplicativas.

(5) Tenemos los siguientes casos:

- Si $p^m \mid n$, entonces $(n, p^m) = p^m$, luego

$$c_{p^m}(n) = \sum_{d \mid p^m} \mu\left(\frac{p^m}{d}\right) d = \mu(1)p^m + \mu(p)p^{m-1} = p^m - p^{m-1},$$

pues $\mu(p^i) = 0$ para toda $i > 1$.

- Si $p^{m-1} \mid n$ pero $p^m \nmid n$, entonces $(n, p^m) = p^{m-1}$. En efecto, se tiene que $p^{m-1} \mid p^m$ y además $p^{m-1} \mid n$ por hipótesis. Si $e \in \mathbb{Z}$ es tal que $e \mid p^m$ y $e \mid n$, entonces $e = p^i$, para algún $0 \leq i \leq m-1$, pues $p^m \nmid n$, por tanto $e \mid p^{m-1}$. Esto prueba que $(p^m, n) = p^{m-1}$, así

$$c_{p^m}(n) = \sum_{d \mid p^{m-1}} \mu\left(\frac{p^m}{d}\right) d = \mu(p)p^{m-1} = -p^{m-1}$$

- Finalmente, si $p^{m-1} \nmid n$, entonces $p^m \nmid n$. Además, $(n, p^m) \mid p^m$, por tanto $(n, p^m) = p^i$ para algún $0 \leq i \leq m$. Más aún, por la hipótesis se debe tener que $0 \leq i \leq m-2$. Luego

$$c_{p^m}(n) = \sum_{d \mid p^i} \mu\left(\frac{p^m}{d}\right) d = \mu(p^m)1 + \mu(p^{m-1})p + \dots + \mu(p^{m-i})p^i = 0,$$

pues $i \leq m-2$ implica que $2 \leq m-i$ y por tanto $\mu(p^m) = \dots = \mu(p^{m-i}) = 0$.

■

Del la demostración del punto 4 se puede rescatar el siguiente corolario, usando la inversión de Möbius (Corolario 1.5).

Corolario 2.1. *Para cada $n \in \mathbb{N}$ fijo se tiene*

$$\sum_{d|r} c_d(n) = \eta_r(n) = \begin{cases} r & \text{si } r \mid n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Las sumas de Ramanujan gozan de la siguiente propiedad de “ortogonalidad”.

Lema 2.1. *Si r y s dividen a k , entonces*

$$\sum_{d|k} c_r(k/d) c_d(k/s) = \begin{cases} k & \text{si } r = s \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demostración. Si r y s dividen a k , entonces

$$\begin{aligned} \sum_{d|k} c_r(k/d) c_d(k/s) &= \sum_{d|k} c_d(k/s) \sum_{d'|(k/d, r)} \mu(r/d') d' \\ &= \sum_{d|k} c_d(k/s) \sum_{\substack{d'|r \\ d'|k/d}} \mu(r/d') d' = \sum_{\substack{d|k \\ d'|r \\ d'|k/d}} c_d(k/s) \mu(r/d') d' \\ &= \sum_{\substack{d|k/d' \\ d'|r \\ d'|k}} c_d(k/s) \mu(r/d') d' = \sum_{\substack{d'|r \\ d'|k}} \mu(r/d') d' \sum_{d|k/d'} c_d(k/s) \\ &= \sum_{d'|(k, r)} \mu(r/d') d' \eta_{k/d'}(k/s) = \sum_{d'|r} \mu(r/d') d' \eta_{k/d'}(k/s), \quad (2.2) \end{aligned}$$

dado que $(k, r) = r$ por ser r divisor de k y dado que los conjuntos $\{d, d' \in \mathbb{N} : d \mid k, d' \mid r, d' \mid k/d\}$ y $\{d, d' \in \mathbb{N} : d \mid k/d', d' \mid r, d' \mid k\}$ son iguales. En efecto, si $d \mid k$ entonces k/d es un entero, luego $d' \mid k/d$ implica que $k/d = d'q'$, luego $k = d'q'd$, por tanto $d \mid k/d'$ y $d' \mid k$.

Recíprocamente, si $d' \mid k$ entonces k/d' es un entero, luego $d \mid k/d'$ implica que $k/d' = dq$, por tanto $k = dqd'$, por tanto $d \mid k$ y $d' \mid k/d$.

Si $s \nmid r$ entonces $s \nmid d'$ y por tanto $k/d' \nmid k/s$. En efecto, pues si $s \mid d'$, como $d' \mid r$ entonces se tendría que $s \mid r$ por transitividad. Además, si $k/d' \mid k/s$ se tendría que

$s \mid d'k$. Luego la suma (2.2) se anula si $s \nmid r$ y en particular si $r \neq s$, pues en este caso se tiene que $\eta_{k/d'}(k/s) = 0$ para cada $d' \mid r$.

Si $s \mid r$ entonces la suma (2.2) es igual a

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{d' \mid r \\ k/d' \mid k/s}} \mu(r/d') d' \frac{k}{d'} &= \sum_{\substack{d' \mid r \\ k/d' \mid k/s}} \mu(r/d') k = \sum_{\substack{d' \mid r \\ s \mid d'}} \mu(r/d') k \\ &= k \sum_{\substack{d' \mid r \\ d' = se}} \mu(r/se) = k \sum_{e \mid r/s} \mu(r/se) \\ &= k \sum_{se \mid r} \mu(r/se) = \begin{cases} k & \text{si } r = s \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases} \end{aligned}$$

pues $k/d' \mid k/s$ si y sólo si $s \mid d'$. ■

Corolario 2.2. *Las sumas de Ramanujan son linealmente independientes respecto a la suma sobre los divisores de r . Más específicamente, si α, β son funciones aritméticas tales que*

$$\sum_{d \mid r} \alpha(d) c_d(n) = \sum_{d \mid r} \beta(d) c_d(n),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\alpha(d) = \beta(d)$ para todo $d \mid r$.

Demostración. Basta probar que $\sum_{d \mid r} \alpha(d) c_d(n) = 0$ implica que $\alpha(d) = 0$ para todo $d \mid r$. Supóngase ésta hipótesis y sea $\delta \mid r$ arbitrario pero fijo. Si e es un divisor de r , se tiene que $\sum_{d \mid r} \alpha(d) c_d(r/e) = 0$, luego

$$0 = \sum_{e \mid r} \left(\sum_{d \mid r} \alpha(d) c_d\left(\frac{r}{e}\right) \right) c_e\left(\frac{r}{\delta}\right) = \sum_{d \mid r} \alpha(d) \sum_{e \mid r} c_d\left(\frac{r}{e}\right) c_e\left(\frac{r}{\delta}\right) = \alpha(\delta) r,$$

por el la proposición anterior, y dado que $r \neq 0$ entonces $\alpha(\delta) = 0$. Como δ fue un divisor arbitrario de r , se tiene el resultado. ■

Lema 2.2. *Si $d \mid r$ entonces $c_d(n) = c_d((n, r))$.*

Demostración. Si $d \mid r$ entonces $(n, d) = ((n, r), d)$. En efecto, dado que $(n, d) \mid n$ y $(n, d) \mid d$, entonces $(n, d) \mid n$, $(n, d) \mid d$ y $(n, d) \mid r$, por lo que $(n, d) \mid (n, r)$ y $(n, d) \mid d$, es decir, $(n, d) \mid ((n, r), d)$. Recíprocamente se tiene que $((n, r), d) \mid n$ y $((n, r), d) \mid d$, así que $((n, r), d) \mid (n, d)$. Se sigue que $(n, d) = ((n, r), d)$. Luego

$$c_d(n) = \sum_{e \mid (n, d)} \mu(d/e) e = \sum_{e \mid ((n, r), d)} \mu(d/e) e = c_d((n, r)).$$

■

Corolario 2.3. *La suma de Ramanujan módulo r es par mód r .*

Definición 2.4. (Radical). Sea $n \in \mathbb{N}$. Se define el *radical* de n , denotado por n_* como

$$n_* = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ p_1 \cdots p_r & \text{si } n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} \end{cases}$$

donde $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ es la factorización de $n > 1$ en primos.

Definición 2.5. Una función aritmética f se dirá *separable* si $f(n) = f(n_*)$, para cada $n \in \mathbb{N}$.

Lema 2.3. *Una función multiplicativa es separable si y sólo si $(\mu * f)(n) = 0$ para todo n no libre de cuadrado.*

Demostración. Sea $F = \mu * f$. Entonces $F * 1 = f$, es decir,

$$\sum_{d|n} F(d) = f(n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si $F(n) = 0$ para cada n no libre de cuadrado, entonces

$$f(n) = \sum_{d|n} F(d) = \sum_{d|n_*} F(d) = f(n_*),$$

es decir, f es separable.

Supóngase ahora que f es separable. Se tiene que para cada primo p y para cada $m > 1$,

$$\begin{aligned} F(p^m) &= \sum_{d|p^m} \mu(d) f\left(\frac{p^m}{d}\right) = \mu(1)f(p^m) + \mu(p)f(p^{m-1}) \\ &= f(p^m) - f(p^{m-1}) = f(p) - f(p) = 0. \end{aligned}$$

Además como f es multiplicativa, entonces F también lo es. Si n es un entero positivo no libre de cuadrado, entonces existen un primo p y enteros positivos q y $m > 1$ tales que $n = p^m q$ y $(p^m, q) = 1$. Luego $F(n) = F(p^m)F(q) = 0 \cdot F(q) = 0$. ■

Lema 2.4. *Si f es multiplicativa y separable, entonces para cualesquiera $a, b \in \mathbb{N}$ se tiene:*

$$(I) \quad f(a)f(b) = f(ab)f((a, b)).$$

$$(II) f(a) = f((a, b)) \sum_{\substack{d|a \\ (d,b)=1}} (\mu * f)(d)$$

Demostración. (I) Nótese que si p es un primo y $m, n > 1$ entonces

$$f(p^m)f(p^n) = f(p)f(p) = f(p^{m+n})f((p^m, p^n)),$$

pues $(p^m, p^n) = p^i$, con $i = \min\{m, n\}$. Sean $a, b \in \mathbb{N}$ y escríbase sin pérdida de generalidad $a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ y $b = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$, $0 \leq \alpha_i, \beta_i$. Entonces, como f es multiplicativa,

$$\begin{aligned} f(ab)f((a, b)) &= f(p_1^{\alpha_1+\beta_1} \cdots p_r^{\alpha_r+\beta_r})f(p_1^{\min\{\alpha_1, \beta_1\}} \cdots p_r^{\min\{\alpha_r, \beta_r\}}) \\ &= f(p_1^{\alpha_1+\beta_1}) \cdots f(p_r^{\alpha_r+\beta_r})f(p_1^{\min\{\alpha_1, \beta_1\}}) \cdots f(p_r^{\min\{\alpha_r, \beta_r\}}) \\ &= f(p_1^{\alpha_1+\beta_1}) \cdots f(p_r^{\alpha_r+\beta_r})f((p_1^{\alpha_1}, p_1^{\beta_1})) \cdots f((p_r^{\alpha_r}, p_r^{\beta_r})) \\ &= f(p_1^{\alpha_1})f(p_1^{\beta_1}) \cdots f(p_r^{\alpha_r})f(p_r^{\beta_r}) \\ &= f(p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r})f(p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}) \\ &= f(a)f(b) \end{aligned}$$

(II) Al igual que en la demostración anterior, si $F = \mu * f$, entonces

$$\sum_{d|n} F(d) = f(n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Se verá primero que los conjuntos $\{d \in \mathbb{N} : d \mid a_* \text{ y } (d, b) = 1\}$ y $\{d \in \mathbb{N} : d \mid a_*/(a, b)_*\}$ son iguales.

Para empezar, se tiene que $a_*/(a, b)_*$ es un entero. Si $(a, b)_* = 1$ esto es claro. Si $(a, b)_* > 1$ se puede escribir $(a, b)_* = q_1 \cdots q_s$, donde todos los primos son distintos. Luego $q_i \mid (a, b)_*$, pero $(a, b)_* \mid (a, b)$ y $(a, b) \mid a$, por tanto $q_i \mid a$ y por tanto $q_i \mid a_*$. Como $i \in \{1, \dots, s\}$ fue arbitrario y todos los primos q_i son distintos, entonces $q_1 \cdots q_s = (a, b)_* \mid a_*$, que es lo que se quería probar.

Procedamos a probar la igualdad de los conjuntos. Supóngase primero que $d \mid a_*$ y $(d, b) = 1$. Entonces existe $c \in \mathbb{N}$ tal que $a_* = dc$. Por otro lado, se tiene que $(a, b) \mid b$ y por tanto $((a, b), d) = 1$, más aún, como $(a, b)_* \mid (a, b)$ entonces también $((a, b)_*, d) = 1$ y como $(a, b)_* \mid a_* = dc$, por el lema de Euclides se debe tener que $(a, b)_* \mid c$ es decir, $a_* = (a, b)_*dq$, para algún $q \in \mathbb{N}$, luego $d \mid a_*/(a, b)_*$.

Recíprocamente, supóngase que $d \mid a_*/(a, b)_*$. Se debe tener que

$$\left(\frac{a_*}{(a, b)_*}, b \right) = 1. \quad (2.3)$$

Pues en caso contrario, es decir, si este máximo común divisor fuera mayor que uno, existiría un primo p tal que $p \mid b$ y $p \mid a_*/(a, b)_*$, pero $a_*/(a, b)_* \mid a_*$, luego $p \mid a_*$ y por tanto $p \mid a$. En consecuencia, $p \mid (a, b)$ y por tanto $p \mid (a, b)_*$. Se puede escribir entonces $a_* = pp_1 \cdots p_r$, $(a, b)_* = pq_1 \cdots q_s$, donde todos los primos son distintos. Además, como $a_* = (a, b)_*n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $pp_1 \cdots p_r = pq_1 \cdots q_sr_1 \cdots r_t$, con $n = r_1 \cdots r_t$, y r_i números primos, no necesariamente distintos. Luego $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_sr_1 \cdots r_t$ y dado que ninguno de los primos p_i son iguales a p , entonces ninguno de los primos r_j puede ser igual a p , es decir p no divide a $n = a_*/(a, b)_*$, lo cual es absurdo.

Esto prueba la igualdad de dichos conjuntos. Ahora es fácil calcular la siguiente suma,

$$\sum_{\substack{d \mid a \\ (d, b)=1}} F(d) = \sum_{\substack{d \mid a_* \\ (d, b)=1}} F(d) = \sum_{d \mid a_*/(a, b)_*} F(d) = \sum_{d \mid (a_*/(a, b)_*)} (\mu * f)(d) = f(a_*/(a, b)_*).$$

Además, por una demostración similar a la de la ecuación (2.3), se tiene que

$$\left((a, b)_*, \frac{a_*}{(a, b)_*} \right) = 1.$$

Finalmente, como f es multiplicativa,

$$f(a) = f(a_*) = f((a, b)_*)f(a_*/(a, b)_*) = f((a, b)) \sum_{\substack{d \mid a \\ (d, b)=1}} (\mu * f)(d).$$

■

Ejemplo 2.1. La función $\bar{\varphi} = \varphi(n)/n$ es separable. Nótese que para cualquier primo p y $m > 0$ se tiene $\varphi(p^m) = p^m - p^{m-1}$, luego $\varphi(p^m)/p^m = 1 - p^{-1}$ y también $\varphi(p)/p = 1 - p^{-1}$. Ahora, si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ entonces, como φ es multiplicativa,

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \frac{\varphi(p_1^{\alpha_1})}{p_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\varphi(p_r^{\alpha_r})}{p_r^{\alpha_r}} = \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) = \frac{\varphi(p_1)}{p_1} \cdots \frac{\varphi(p_r)}{p_r} = \frac{\varphi(n_*)}{n_*}$$

Lema 2.5 (Fórmula de Hölder). *Para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$c_r(n) = \frac{\varphi(r)\mu\left(\frac{r}{(n, r)}\right)}{\varphi\left(\frac{r}{(n, r)}\right)}$$

Demostración. Se tiene

$$c_r(n) = \sum_{d|(n,r)} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d = \sum_{\substack{d|(n,r) \\ \left(\frac{r}{(n,r)}, \frac{(n,r)}{d}\right) > 1}} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d + \sum_{\substack{d|(n,r) \\ \left(\frac{r}{(n,r)}, \frac{(n,r)}{d}\right) = 1}} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d, \quad (2.4)$$

pero si $(r/(n,r), (n,r)/d) > 1$ entonces r/d debe tener un factor cuadrado, pues en este caso existe un primo p tal que $p \mid r/(n,r)$ y $p \mid (n,r)/d$, luego $r = p(n,r)q_1$ y $(n,r) = pdq_2$ para algunos enteros q_1 y q_2 , luego $r = p^2dq_1q_2$ y por tanto $p^2 \mid r/d$, así que $\mu(r/d) = 0$. Luego la ecuación (2.4) es igual a

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{d|(n,r) \\ \left(\frac{r}{(n,r)}, \frac{(n,r)}{d}\right) = 1}} \mu\left(\frac{r}{d}\right) d &= \sum_{\substack{d|(n,r) \\ \left(\frac{r}{(n,r)}, \frac{(n,r)}{d}\right) = 1}} \mu\left(\frac{r}{(n,r)}\right) \mu\left(\frac{(n,r)}{d}\right) d \\ &= \mu\left(\frac{r}{(n,r)}\right) \sum_{\substack{d|(n,r) \\ \left(\frac{r}{(n,r)}, \frac{(n,r)}{d}\right) = 1}} \mu\left(\frac{(n,r)}{d}\right) d \\ &= \mu\left(\frac{r}{(n,r)}\right) \sum_{\substack{d|(n,r) \\ \left(\frac{r}{(n,r)}, d\right) = 1}} \mu(d) \frac{(n,r)}{d} \\ &= (n,r) \mu\left(\frac{r}{(n,r)}\right) \sum_{\substack{d|(n,r) \\ \left(\frac{r}{(n,r)}, d\right) = 1}} \frac{\mu(d)}{d} \end{aligned} \quad (2.5)$$

pues μ es multiplicativa. Sea ahora $\Phi = \mu * \bar{\varphi}$, donde $\bar{\varphi}(s) = \varphi(s)/s$ para cada $s \in \mathbb{N}$. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= \sum_{d|s} \mu(d) \bar{\varphi}\left(\frac{s}{d}\right) = \sum_{d|s} \mu(d) \varphi\left(\frac{s}{d}\right) \frac{1}{s/d} = \sum_{d|s} \mu(d) \sum_{e|s/d} \mu(e) \frac{s/d}{e} \frac{1}{s/d} \\ &= \sum_{d|s} \mu(d) \sum_{e|s/d} \frac{\mu(e)}{e} = \sum_{e|s} \frac{\mu(e)}{e} \sum_{d|s/e} \mu(d) = \frac{\mu(s)}{s} \end{aligned} \quad (2.6)$$

pues si $d \mid s$ y $e \mid s/d$, entonces d/s es un entero y $s/d = eq$ para algún entero q , luego $s = deq$ y por tanto $e \mid s$ y $d \mid s/e$. El recíproco es similar. Además, todos los términos en la penúltima suma son cero excepto aquel para el cual $s/e = 1$, es decir,

$s = e$. Luego la suma (2.5) es igual a

$$\begin{aligned}
(n, r) \mu \left(\frac{r}{(n, r)} \right) \sum_{\substack{d|(n, r) \\ \left(\frac{r}{(n, r)}, d \right) = 1}} \Phi(d) &= (n, r) \mu \left(\frac{r}{(n, r)} \right) \sum_{\substack{d|(n, r) \\ \left(\frac{r}{(n, r)}, d \right) = 1}} (\mu * \bar{\varphi}(d)) \\
&= (n, r) \mu \left(\frac{r}{(n, r)} \right) \frac{\bar{\varphi}((n, r))}{\bar{\varphi} \left((n, r), \frac{r}{(n, r)} \right)} \\
&= (n, r) \mu \left(\frac{r}{(n, r)} \right) \frac{\bar{\varphi}(r) \bar{\varphi}((n, r))}{\bar{\varphi}((n, r)) \bar{\varphi} \left(\frac{r}{(n, r)} \right)} \\
&= (n, r) \mu \left(\frac{r}{(n, r)} \right) \frac{\bar{\varphi}(r)}{\bar{\varphi} \left(\frac{r}{(n, r)} \right)} \\
&= (n, r) \mu \left(\frac{r}{(n, r)} \right) \frac{r \varphi(r)}{(n, r) r \varphi \left(\frac{r}{(n, r)} \right)} \\
&= \frac{\mu \left(\frac{r}{(n, r)} \right) \varphi(r)}{\varphi \left(\frac{r}{(n, r)} \right)}
\end{aligned}$$

donde la primera igualdad se cumple por definición de Φ y la ecuación (2.6), la segunda por ser $\bar{\varphi}$ multiplicativa, separable y por el Lema 2.4 (ii), la tercera por el Lema 2.4 (i) y la quinta por definición de $\bar{\varphi}$. ■

Teorema 2.1. *Toda función f par mód r tiene una expansión de la forma*

$$f(n) = \sum_{d|r} \alpha(d) c_d(n), \quad (2.7)$$

y recíprocamente, toda función aritmética de esta forma es par mód r . Los coeficientes $\alpha(d)$ están dados por

$$\alpha(d) = \frac{1}{r} \sum_{e|r} f \left(\frac{r}{e} \right) c_e \left(\frac{r}{d} \right), \quad (2.8)$$

o por la fórmula equivalente,

$$\alpha(d) = \frac{1}{r \varphi(d)} \sum_{m=1}^r f(m) c_d(m).$$

A los coeficientes α se les llamará **coeficientes de Fourier** de la función par f .

Demostración. Es claro que toda función de la forma (2.7) es par mód r , pues por el lema anterior si $d \mid r$ entonces $c_d(n) = c_d((n, r))$. Nótese que

$$\begin{aligned}
\sum_{d \mid r} \alpha(d) c_d(n) &= \sum_{d \mid r} \left(\frac{1}{r} \sum_{e \mid r} f\left(\frac{r}{e}\right) c_e\left(\frac{r}{d}\right) \right) c_d(n) \\
&= \frac{1}{r} \sum_{e \mid r} f\left(\frac{r}{e}\right) \sum_{d \mid r} c_e\left(\frac{r}{d}\right) c_d(n) \\
&= \frac{1}{r} \sum_{e \mid r} f\left(\frac{r}{e}\right) \sum_{d \mid r} c_e\left(\frac{r}{d}\right) c_d((n, r)) \\
&= \frac{1}{r} f\left(\frac{r}{q}\right) r = f((n, r)) = f(n),
\end{aligned}$$

por el Lema 2.1, donde $r = (n, r)q$, para algún $q \in \mathbb{N}$ y donde la última igualdad se cumple por ser f par mód r .

Por otro lado, de la demostración de la proposición 1.14 se puede rescatar el hecho de que el conjunto $\{1, 2, \dots, r\}$ es igual a $\bigcup_{e \mid r} \{rx/e : (x, e) = 1, 1 \leq x \leq e\}$ y todos los conjuntos son disjuntos a pares, por tanto

$$\begin{aligned}
\frac{1}{r\varphi(d)} \sum_{m=1}^r f(m) c_d(m) &= \frac{1}{r\varphi(d)} \sum_{e \mid r} \sum_{\substack{(x, e)=1 \\ 1 \leq x \leq e}} f\left(\frac{rx}{e}\right) c_d\left(\frac{rx}{e}\right) \\
&= \frac{1}{r\varphi(d)} \sum_{e \mid r} \sum_{\substack{(x, e)=1 \\ 1 \leq x \leq e}} f\left(\left(\frac{rx}{e}, r\right)\right) c_d\left(\left(\frac{rx}{e}, r\right)\right) \\
&= \frac{1}{r\varphi(d)} \sum_{e \mid r} \sum_{\substack{(x, e)=1 \\ 1 \leq x \leq e}} f\left(\frac{r}{e}\right) c_d\left(\frac{r}{e}\right) \\
&= \frac{1}{r\varphi(d)} \sum_{e \mid r} f\left(\frac{r}{e}\right) c_d\left(\frac{r}{e}\right) \varphi(e) \\
&= \frac{1}{r\varphi(d)} \sum_{e \mid r} f\left(\frac{r}{e}\right) c_e\left(\frac{r}{d}\right) \varphi(d) \\
&= \frac{1}{r} \sum_{e \mid r} \left(\frac{r}{e}\right) c_e\left(\frac{r}{d}\right),
\end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se cumple por ser f par mód r , la tercera por ser $(rx/e, r) = r/e$, pues $(x, e) = 1$ implica que $(r/e)(x, e) = r/e$, y como r/e es un entero positivo,

entonces $(rx/e, r) = r/e$. La cuarta por definición de φ , y la penúltima igualdad se cumple por la fórmula de Hölder (Lema 2.5) y el Corolario A.1, pues e y d dividen a d , así que

$$c_d\left(\frac{r}{e}\right)\varphi(e) = \frac{\varphi(d)\mu\left(\frac{d}{(r/e, d)}\right)}{\varphi\left(\frac{d}{(r/e, d)}\right)} = \frac{\varphi(d)\mu\left(\frac{e}{(r/d, e)}\right)}{\varphi\left(\frac{e}{(r/d, e)}\right)}\varphi(e) = \varphi(d)c_e\left(\frac{r}{d}\right) \quad (2.9)$$

■

Corolario 2.4. *Si f y f' son funciones pares mód r , entonces se verifican las siguientes implicaciones*

$$f(n) = \sum_{d|r} f'(d)c_d(n), \forall n \in \mathbb{N} \implies f'(\delta) = \frac{1}{r\varphi(\delta)} \sum_{m=1}^r f(m)c_d(m), \forall \delta | r,$$

$$f'(\delta) = \sum_{m=1}^r f(m)c_\delta(m), \forall d | r \implies f(n) = \frac{1}{r} \sum_{d|r} \frac{f'(d)}{\varphi(d)} c_d(n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Demostración. En efecto, como f es par, entonces f tiene una única representación de la forma (2.7), por tanto se verifica la primera implicación. Para la segunda implicación se tiene que, de nuevo por la ecuación (2.7),

$$f(n) = \sum_{d|r} \left(\frac{1}{r\varphi(d)} \sum_{m=1}^r f(m)c_d(m) \right) c_d(n) = \frac{1}{r} \sum_{d|r} \frac{f'(d)}{\varphi(d)} c_d(n).$$

■

Considerando los casos $\delta = 1$ y $n = r$ se tiene el siguiente corolario.

Corolario 2.5. *Si f y f' son funciones pares mód r , entonces*

$$f(n) = \sum_{d|r} f'(d)c_d(n), \forall n \in \mathbb{N} \implies f'(1) = \frac{1}{r} \sum_{m=1}^r f(m),$$

$$f'(\delta) = \sum_{m=1}^r f(m)c_\delta(m), \forall d | r \implies f(r) = \frac{1}{r} \sum_{d|r} f'(d).$$

Volviendo a la definición de la suma de Ramanujan módulo r , ecuación (2.1), se puede considerar una clase más general de funciones, aquellas que se pueden escribir como

$$f(n) = \sum_{\delta|(n,r)} g(\delta), \forall n \in \mathbb{N},$$

donde g es una función aritmética.

La siguiente proposición muestra que esta generalización preserva la modularidad respecto a r . Más aún, el Teorema 2.1 permite caracterizar a las funciones pares módulo r de esta forma.

Teorema 2.2. *Toda función f par módulo r se puede expresar como*

$$f(n) = \sum_{\delta|(n,r)} g(\delta), \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2.10)$$

Y recíprocamente, toda función aritmética que tenga esta forma es par módulo r .

Demostración. Dado que $(n, r) = ((n, r), r)$, es claro que toda función aritmética que tenga dicha forma es par mód r . Supóngase que f es par mód r . Por el Teorema 2.1, se puede escribir

$$\begin{aligned} f(n) &= \sum_{d|r} \alpha(d) c_d(n) = \sum_{d|r} \alpha(d) \sum_{\delta|(n,d)} \mu\left(\frac{d}{\delta}\right) \delta \\ &= \sum_{\delta|(n,d)} \sum_{d|r} \alpha(d) \mu\left(\frac{d}{\delta}\right) \delta = \sum_{\delta|(n,r)} \delta \sum_{d|r} \mu\left(\frac{d}{\delta}\right) \delta = \sum_{\delta|(n,r)} g(\delta) \end{aligned}$$

■

En vista de que toda función par tiene al menos dos representaciones, la del teorema anterior y la del Teorema 2.1, cabe preguntarse si existe alguna relación entre ellas. El siguiente teorema da respuesta a esta inquietud.

Teorema 2.3. *Si f es par módulo r , entonces sus respectivas expansiones (2.7) y (2.10) están relacionadas mediante la fórmula*

$$\alpha(d) = \frac{1}{r} \sum_{e|r/d} g\left(\frac{r}{e}\right) e.$$

Demostración. Se tiene que

$$\alpha(d) = \frac{1}{r} \sum_{\delta|r} f\left(\frac{r}{\delta}\right) c_{\delta}\left(\frac{r}{d}\right) = \frac{1}{r} \sum_{\delta|r} c_{\delta}\left(\frac{r}{d}\right) \sum_{e|(r/\delta, \delta)} g(e) = \frac{1}{r} \sum_{\delta|r} c_{\delta}\left(\frac{r}{d}\right) \sum_{e|r/\delta} g(e)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{r} \sum_{\delta|r} c_\delta \left(\frac{r}{d}\right) \sum_{e|r/\delta} g(e) = \frac{1}{r} \sum_{e|r} g\left(\frac{r}{e}\right) \sum_{\delta|e} c_\delta \left(\frac{r}{d}\right) \\
&= \frac{1}{r} \sum_{e|r} g\left(\frac{r}{e}\right) \cdot \begin{cases} e & \text{si } e \mid r/d \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} = \frac{1}{r} \sum_{e|r/d} g\left(\frac{r}{e}\right) e.
\end{aligned}$$

por el corolario 2.1. ■

2.2. El subespacio de funciones pares

Recuérdese del corolario 1.1 que el anillo $(\mathcal{A}, +, *)$ es un álgebra conmutativa con identidad. Se tiene que el conjunto de funciones pares es un subespacio de \mathcal{A} , pero no es un subanillo, pues en general $(f * g)(n) \neq (f * g)((n, r))$ aún cuando f y g sean pares mód r , tome por ejemplo dos funciones constantes. Se denotará como \mathcal{A}_r al conjunto de funciones pares módulo r .

Proposición 2.3. *El conjunto \mathcal{A}_r es una subespacio de \mathcal{A} .*

Demostración. Basta verificar las siguientes condiciones:

- (I) $\mathcal{A}_r \neq \emptyset$
- (II) $f, g \in \mathcal{A}_r$ implica $f + g \in \mathcal{A}_r$
- (III) $c \in \mathbb{C}$ y $f \in \mathcal{A}_r$ implica $cf \in \mathcal{A}_r$.

Claro que $\mathbf{0} \in \mathcal{A}_r$. Sea $n \in \mathbb{N}$ y supóngase que $f, g \in \mathcal{A}_r$. Se tiene que $(cf)(n) = cf(n) = cf((n, r)) = (cf)((n, r))$, luego $cf \in \mathcal{A}_r$.

Además, $(f + g)(n) = f(n) + g(n) = f((n, r)) + g((n, r)) = (f + g)((n, r))$, así que $f + g \in \mathcal{A}_r$. ■

El corolario 2.2 afirma que las sumas de Ramanujan $\mathcal{B}_r = \{c_d\}_{d|r}$ son linealmente independientes respecto a la suma sobre los divisores de r , además el Teorema 2.1 nos permite expresar cualquier función par como una suma de este tipo. En otras palabras, el conjunto \mathcal{B}_r es una base del espacio vectorial \mathcal{A}_r .

Corolario 2.6. *El espacio vectorial \mathcal{A}_r tiene dimensión $d(r)$.*

En lo que sigue de esta sección se verá que los coeficientes de la expansión (2.7) pueden ser derivados de un producto interno en este espacio de funciones.

Proposición 2.4. La operación $\langle \ , \ \rangle : \mathcal{A}_r \times \mathcal{A}_r \longrightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$\langle f, g \rangle = \sum_{d|r} \varphi(d) f\left(\frac{r}{d}\right) \overline{g\left(\frac{r}{d}\right)}$$

es un producto interno en \mathcal{A}_r .

Demostración. Sean $c \in \mathbb{C}$ y $f, g, h \in \mathcal{A}_r$. Escribese $f(n) = f_1(n) + if_2(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, donde $f_1, f_2 \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$. Entonces

(I)

$$\begin{aligned} \langle f, f \rangle &= \sum_{d|r} \varphi(d) \left[f_1\left(\frac{r}{d}\right) + if_2\left(\frac{r}{d}\right) \right] \overline{\left[f_1\left(\frac{r}{d}\right) + if_2\left(\frac{r}{d}\right) \right]} \\ &= \sum_{d|r} \varphi(d) \left[f_1^2\left(\frac{r}{d}\right) + f_2^2\left(\frac{r}{d}\right) \right] \geq 0 \end{aligned}$$

Además, si $\langle f, f \rangle = 0$, como todos los términos de la suma anterior son positivos, se debe tener que $f_1(d) = f_2(d) = 0$ para todo d divisor de r . Si $n \in \mathbb{N}$ entonces $f_1(n) = f((n, r)) = 0$, pues f es par mód r y $(n, r) \mid r$. Análogamente se tiene $f_2(n) = 0$. Luego $f(n) = f_1(n) + if_2(n) = 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$, es decir $f = 0$.

(II)

$$\begin{aligned} \langle f + g, h \rangle &= \sum_{d|r} \varphi(d) (f + g)\left(\frac{r}{d}\right) \overline{h\left(\frac{r}{d}\right)} = \sum_{d|r} \varphi(d) \left[f\left(\frac{r}{d}\right) \overline{h\left(\frac{r}{d}\right)} + g\left(\frac{r}{d}\right) \overline{h\left(\frac{r}{d}\right)} \right] \\ &= \sum_{d|r} \varphi(d) f\left(\frac{r}{d}\right) \overline{h\left(\frac{r}{d}\right)} + \sum_{d|r} \varphi(d) g\left(\frac{r}{d}\right) \overline{h\left(\frac{r}{d}\right)} = \langle f, h \rangle + \langle g, h \rangle \end{aligned}$$

(III)

$$\langle cf, g \rangle = \sum_{d|r} \varphi(d) cf\left(\frac{r}{d}\right) \overline{g\left(\frac{r}{d}\right)} = c \sum_{d|r} \varphi(d) f\left(\frac{r}{d}\right) \overline{g\left(\frac{r}{d}\right)} = c \langle f, g \rangle$$

(IV)

$$\overline{\langle g, f \rangle} = \overline{\sum_{d|r} \varphi(d) g\left(\frac{r}{d}\right) \overline{f\left(\frac{r}{d}\right)}} = \sum_{d|r} \varphi(d) \overline{g\left(\frac{r}{d}\right)} f\left(\frac{r}{d}\right) = \langle f, g \rangle$$

■

El producto interno así definido podría haberse escrito sin el factor $\varphi(d)$ dentro de la suma. Su uso se justifica al usar la ecuación (2.9) para probar que este producto interno hace de \mathcal{B}_r una base ortogonal de \mathcal{A}_r .

Proposición 2.5. *Si i, j son divisores positivos de r , entonces*

$$\langle c_i, c_j \rangle = \begin{cases} r\varphi(j) & \text{si } i = j \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demostración. En efecto,

$$\langle c_i, c_j \rangle = \sum_{d|r} \varphi(d) c_i \left(\frac{r}{d} \right) c_j \left(\frac{r}{d} \right) = \sum_{d|r} c_i \left(\frac{r}{d} \right) \varphi(j) c_d \left(\frac{r}{j} \right) = \begin{cases} r\varphi(j) & \text{si } i = j \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde la segunda igualdad se cumple por la ecuación (2.9) y la tercera por el Lema 2.1. ■

Corolario 2.7. *El conjunto*

$$\mathcal{B}'_r = \left\{ c'_d = \frac{1}{\sqrt{r\varphi(d)}} c_d \right\}_{d|r}$$

es una base ortonormal de \mathcal{A}_r .

Como consecuencia del corolario anterior, toda función f par mód r debe tener una expansión de la forma $\sum_{e|r} \beta(e) c'_e$. Además, si d es un divisor arbitrario de r , entonces

$$\langle f, c'_d \rangle = \left\langle \sum_{e|r} \beta(e) c'_e, c'_d \right\rangle = \sum_{e|r} \beta(e) \langle c'_e, c'_d \rangle = \beta(d),$$

pero f también tiene una única representación de la forma $\sum_{e|r} \alpha(d) c_d$, en consecuencia, $\alpha(d) = \beta(d) / \sqrt{r\varphi(d)}$ para cada d divisor de r . Por tanto,

$$\begin{aligned} \alpha(d) &= \frac{\beta(d)}{\sqrt{r\varphi(d)}} = \frac{1}{\sqrt{r\varphi(d)}} \langle f, c'_d \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{r\varphi(d)}} \sum_{e|r} \varphi(e) f \left(\frac{r}{e} \right) c'_d \left(\frac{r}{e} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{r\varphi(d)}} \sum_{e|r} \varphi(e) f \left(\frac{r}{e} \right) \frac{1}{\sqrt{r\varphi(d)}} c_d \left(\frac{r}{e} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{r\varphi(d)} \sum_{e|r} f\left(\frac{r}{e}\right) \varphi(d) c_e\left(\frac{r}{d}\right) \\
&= \frac{1}{r} \sum_{e|r} f\left(\frac{r}{e}\right) c_e\left(\frac{r}{d}\right),
\end{aligned}$$

donde la cuarta igualdad se cumple nuevamente por (2.9). Esta es la ecuación (2.8). Como es usual en el análisis funcional, ahora se pueden llamar propiamente *coeficientes de Fourier* a los coeficientes α del Teorema 2.1.

A. Divisibilidad

Proposición A.1. Si $r \in \mathbb{N}$, $r = eq_1$, $r = dq_2$, $d = (q_1, d)k_1$ y $e = (q_2, e)k_2$ entonces $k_1 = k_2$.

Demostración. Nótese que q_1, q_2 enteros positivos, además $(q_1q_2, r) = (q_1q_2, r)$, luego $(q_1q_2, eq_1) = (q_1q_2, dq_2)$ y por tanto $q_1(q_2, e) = q_2(q_1, d)$ por la proposición anterior. Luego, dado que $r = (q_2, e)k_2q_1 = (q_1, d)k_1q_2$, la ley de cancelación implica que $k_1 = k_2$. ■

Corolario A.1. Si $r \in \mathbb{N}$, $e \mid r$ y $d \mid r$ con $e, r \in \mathbb{N}$, entonces

$$d/(r/e, d) = e/(r/d, e) .$$

Teorema A.1 (Lema de Euclides). Si $a \mid bc$ y $(a, b) = 1$ entonces $a \mid c$.

Demostración. Si $(a, b) = 1$, podemos escribir $1 = as + bt$, donde $s, t \in \mathbb{Z}$. Luego $c = a(sc) + bc(t)$ y como $a \mid a$ y $a \mid bc$ por hipótesis, entonces $a \mid c$. ■

Bibliografía

- [1] APOSTOL, T. M. *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer, 1976.
- [2] BELL, E. T. Arithmetic of logic. *Transactions of the American Mathematical Society* 29, 3 (1927), 597–611.
- [3] BELL, E. T. Outline of a theory of arithmetical functions in their algebraic aspects. *The Journal of the Indian Mathematical Society* 17 (1928), 249–260.
- [4] BRUALDI, R. A. *Introductory Combinatorics*, 3 ed. Prentice-Hall, 1999.
- [5] CASHWELL, E. D., AND EVERETT, C. J. The ring of number-theoretic functions. *Pacific Journal of Mathematics* 9, 4 (1959).
- [6] COHEN, E. A class of arithmetical functions. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 41, 11 (1955).
- [7] DICKSON, L. E. *History of the Theory of Numbers*, vol. I. Chelsea Publishing Company, 1952.
- [8] GAUSS, C. F. *Disquisitiones Arithmeticae*, english ed. Springer-Verlag, 1966.
- [9] HARDY, G. H., AND WRIGHT, E. M. *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5 ed. Oxford University Press, 1979.
- [10] HUNGERFORD, T. W. *Algebra*. Springer, 1974.
- [11] KNOPFMACHER, J. *Abstract Analytic Number Theory*, vol. 12. North-Holland Publishing Company, 1975.
- [12] KNOPFMACHER, J. Fourier analysis of arithmetical functions. *Annali di Matematica Pura ed Applicata* 109 (1976), 177–201.
- [13] NISHIMURA, H. On the unique factorization theorem for formal power series. *Journal of Mathematical Sciences, Kyoto Univ.* (1967).
- [14] REARICK, D. F. Operators on algebras of arithmetic functions. *Duke Mathematical Journal* 35 (1968), 761–766.
- [15] ZALDÍVAR, F. *Introducción a la teoría de números*, 1 ed. Fondo de Cultura Económica, 2014.