INFOTEC
Centro de Investigación e Innovación en TIC

Modelación probabilística de periodos de siembra del maíz en condiciones de cambio climático. Caso de estudio en Alemania.

PRESENTA

Isaac Vázquez Mendoza

BAJO LA DIRECCIÓN DE

Dra. Magali Arellano Vázquez

Motivación del problema

Invierno

Verano

Primavera

Otoño

Motivación del problema

Invierno

Verano

Primavera

Otoño

Motivación del problema

Invierno

Verano

Primavera

Otoño



Movilización en fechas de siembra

Adelantar

- Reduce el estrés asociado a temporadas más cálidas.
- Incrementa la cosecha.
- Retrasa la etapa de emergencia.
- Reduce la densidad poblacional del cultivo.

Fuente: Clark, *et al.* (2026); Maresma *et al.* (2019); Mason *et al.* (2018)

Mantener

- Resiliencia de la planta.
- Emplear métodos externos.

Fuente: Agrama, H. (1996); Mason *et al.* (2018); Wang *et al.* (2025).

Retrasar

- Ofrece condiciones más cálidas.
- Acelera la maduración.
- Aumenta la humedad de los granos.
- Incrementa la altura de las plantas.
- Reduce la producción del cultivo.

Fuente: Clark *et al.* (2026); Maresma *et al.* (2019); Donohue *et al.* (2015).

Movilización de fechas de siembra en Alemania



- Fechas de siembra tomadas de la plataforma Proyecto Fenología Paneuropea 725 (PEP725).
- Periodo 1951–2015.
- Tamaño de la muestra: 58115.

¿Cómo determinar los periodos de siembra?



Siembra

Emergencia



Siembra

Emergencia

16.6 ± 3.1 días.

Fuente: Chmielewski *et al.* (2024); Sánchez *et al.* (2014).

Maíz en Alemania

Europa cuenta con el 8.91% de las zonas de producción.

Alemania tendrá un incremento en las zonas con potencial de producción agrícola del maíz.

Fuente: Miedaner *et al.* (2021).

Ante las alteraciones en los procesos agrícolas derivadas del cambio climático, ¿cómo predecir ventanas de siembra de maíz en el sureste de Alemania mediante modelos probabilísticos empleando datos agroclimáticos más allá de los GDD?

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo	Disminuir la exposición a estresores ambientales

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo	Disminuir la exposición a estresores ambientales	Contribuir a la toma de decisiones

Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo	Disminuir la exposición a estresores ambientales	Contribuir a la toma de decisiones

Contrastándolo con información oficial reportada para Alemania, un país con potencial agrícola en crecimiento debido a que se enfrenta a un contexto de transición climática derivado del cambio climático.

Datos agroclimáticos

- Temperatura ambiente promedio.
- Humedad relativa.
- Temperatura del suelo (5 cm de profundidad).
- Humedad del suelo disponible para el cultivo del maíz (0–10 cm de profundidad).

Fuente: Deutscher Wetterdienst (2025).



Datos agroclimáticos

- Temperatura ambiente promedio. (11.10 ± 2.5116 °C.)
- Humedad relativa. (65–85 %.)
- Temperatura del suelo (5 cm de profundidad). (8–10 ° C.)
- Humedad del suelo disponible para el cultivo del maíz (0–10 cm de profundidad). (80–90%.)



Fuente: Deutscher Wetterdienst (2025).

Probabilidades de transición



Probabilidades de transición



$$\lambda_k := 1 - \frac{d(C_{H,k}\ ,\ C^*)}{\max\limits_{l\in\{1,\ldots,365\}} \{d(C_{H,l}\ ,\ C^*)\}}.$$

Modelo


λ_{364}
D_{365}
$\ddots$
λ_{365}
$1-\lambda_{365}$
λ_i
D_1
$1-\lambda_1$
F
$1-\lambda_i$
D_i
λ_1
$1-\lambda_2$
1
λ_{i-1}
D_2
$\cdots$
λ_2

Modelo: Criterio empírico de permanencia



Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

con $\{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}$.

Metodología de de Anda-Jauregui *et al.* (2021).

Por realizar $r^* \in \mathbb{N}$ caminatas aleatorias

$$\widehat{P}_i(\tau_F > n^*) := \frac{|W(D_i, D_{(i+n^*) \bmod 365})|}{r^*} \geq \zeta^*.$$

Intervalos de $(1-\alpha)100\%$ de confianza por bootstrap y jackknife.

Resultados: Gráficas dirigidas con pesos



Brandemburgo



Sajonia



Baviera



Distancia Euclidiana

Resultados: Gráficas dirigidas con pesos



Brandemburgo



Sajonia



Baviera



Distancia Manhattan

Resultados: Brandemburgo



Distancia Euclidiana



Distancia Manhattan



Resultados: Sajonia



Distancia Euclidiana



Distancia Manhattan



Resultados: Baviera



Distancia Euclidiana



Distancia Manhattan



Benchmarks

Región	Características	Fecha de siembra
Brandemburgo Norte de Sajonia	Altitud menor que 250 m.s.n.m.	115.6 ± 7.12
	Latitud mayor o igual que 51° N.	116.2 ± 7.08
	Longitud mayor o igual que 8.5° E.	116.2 ± 7.3
Sur de Sajonia Baviera	Altitud mayor o igual que 250 m.s.n.m.	117.4 ± 8.29
	Latitud menor que 51° N.	116.7 ± 8.23
	Longitud mayor o igual que 8.5° E.	116.2 ± 7.3

Fuente: Parker *et al.* (2017); Flores *et al.* (2025).

	Histórico (1975–2010)	**RCP 4.5 (2050)**	**RCP 8.5 (2050)**
Periodo de siembra	79–120	48–110	38–107

Fuente: Parent *et al.* (2018).

Comparaciones: Índice de Jaccard



$$J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}.$$

Comparaciones: Índice de Jaccard



$$0 \leq J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \leq 1.$$

Comparaciones: Brandemburgo



Comparaciones: Norte de Sajonia



Comparaciones: Sur de Sajonia



Comparaciones: Baviera



Comparaciones intragrupales desagregadas: Temperatura ambiente



Comparaciones intragrupales agregadas: Temperatura ambiente



Comparaciones intragrupales desagregadas: Humedad relativa



Comparaciones intragrupales agregadas: Humedad relativa



Comparaciones intragrupales desagregadas: Temperatura del suelo



Comparaciones intragrupales agregadas: Temperatura del suelo



Comparaciones intragrupales desagregadas: Humedad del suelo



Comparaciones intragrupales agregadas: Humedad del suelo



Revistas indexadas

Revista	**Factor de impacto**	**Referencias consultadas**
Computers and Electronics in Agriculture Editorial: Elsevier B.V.	10.3	Elnesr *et al.* (2013)
Sustainable Computing: Informatics and Systems Editorial: Elsevier B.V.	6.2	Gümüşçü *et al.* (2020)
Journal of Agronomy and Crop Science Editorial: Wiley.	3.2	Parker *et al.* (2016)

Referencias I

H.A.S. Agrama.
Sequential path analysis of grain yield and its components in maize.
Plant Breeding, 115(5):343–346, 1996.

A. Anandhi.
Growing degree days – ecosystem indicator for changing diurnal temperatures and their impact on corn growth stages in kansas.
Ecological Indicators, 61:149–158, February 2016.

E.I. Clark, M.A. Moore, C.K. Khoury, B.S. Hulke, N.C. Kane, and S.C. Elmendorf.
Climate drives variation in optimal phenology: 46 years of multi-environment trials in sunflower.
New Phytologist, 249(3):1527–1541, 2026.

K. Donohue, L.T. Burghardt, D. Runcie, K.J. Bradford, and J. Schmitt.
Applying developmental threshold models to evolutionary ecology.
Trends in Ecology & Evolution, 30(2):66–77, 2015.

Deutscher Wetterdienst.
Climate data center (cdc): Daily climate observations, 2026.
Accesado vía https://opendata.dwd.de/climate_envir/CDC/observations_germany/climate/daily/onment en marzo 10, 2026.

Organización de las Naciones Unidas.
¿Qué es el cambio climático?, 2025.
Accesado en marzo 12 de 2025 en https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change.

B. Franch, J. Cintas, I. Becker-Reshef, M.J. Sanchez-Torres, J. Roger, S. Skakun, J.A. Sobrino, K. Van Tricht, J. Degerickx, S. Gilliams, B. Koetz, Z. Szantoi, and A. Whitcraft.
Global crop calendars of maize and wheat in the framework of the worldcereal project.
GIScience & Remote Sensing, 59(1):885–913, 2022.

Referencias II

H. Fotouo Makouate and M. Zude-Sasse.
Advances in growing degree days models for flowering to harvest: Optimizing crop management with methods of precision horticulture—a review.
Horticulturae, 11(12), 2025.

C.M. Grinstead and J.L. Snell.
Introduction to Probability.
American Mathematical Society, Providence, RI, 2nd edition, 2003.

P.D. Jones, T. Jonsson, and D. Wheeler.
Extension to the north atlantic oscillation using early instrumental pressure observations from gibraltar and south-west iceland.
International Journal of Climatology, 17(13):1433–1450, November 1997.
Actualizado a febrero 18, 2026.

P.R. Koya and A.T. Goshu.
Generalized mathematical model for biological growths.
Open Journal of Modelling and Simulation, 01(04):42–53, 2013.

M. Kim, J. Kim, M.-H. Jo, K. Sung, and K.-J. Han.
Assessment of planting soil temperature and growing degree day impacts on silage corn (zea mays l.) biomass.
Journal of Animal Science and Technology, 66(5):949–961, September 2024.

Referencias III

John G Kemeny and J Laurie Snell.
Finite Markov chains.
Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, NY, 1 edition, July 1976.

A. Maresma, A. Ballesta, F. Santiveri, and J. Lloveras.
Sowing date affects maize development and yield in irrigated mediterranean environments.
Agriculture, 9(3):67, March 2019.

S. Mason, T. Galusha, and Z. Kmail.
Planting date influence on yield of drought-tolerant maize with different maturity classifications.
Agronomy Journal, 110(1):293–299, 2018.

T. Miedaner and P. Juroszek.
Global warming and increasing maize cultivation demand comprehensive efforts in disease and insect resistance breeding in north-western europe.
Plant Pathology, 70(5):1032–1046, 2021.

J.E. Olesen, T.R. Carter, C.H. Díaz-Ambrona, S. Fronzek, T. Heidmann, T. Hickler, T. Holt, M.I. Minguez, P. Morales, J.P. Palutikof, M. Quemada, M. Ruiz-Ramos, G.H. Rubæk, F. Sau, B. Smith, and M.T. Sykes.
Uncertainties in projected impacts of climate change on european agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models.
Climatic Change, 81(S1):123–143, March 2007.

Referencias IV

P. Paredes, R. López-Urrea, Á. Martínez-Romero, M. Petry, M.R. Cameira, F. Montoya, M. Salman, and L.S. Pereira.
Estimating the lengths of crop growth stages to define the crop coefficient curves using growing degree days (gdd): Application of the revised fao56 guidelines.
Agricultural Water Management, 319:109758, 2025.

D. Roßberg, V. Michel, R. Graf, and R. Neukampf.
Definition von boden-klima-räumen für die bundesrepublik deutschland.
Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 59(7):155–161, 2007.

R. Thompson and R.M. Clark.
Spatio-temporal modelling and assessment of within-species phenological variability using thermal time methods.
International Journal of Biometeorology, 50(5):312–322, February 2006.

A.K. Whitcraft, I. Becker-Reshef, and C.O. Justice.
Agricultural growing season calendars derived from modis surface reflectance.
International Journal of Digital Earth, 8(3):173–197, 2015.

J. Wang, Y. Guan, L. Wu, X. Guan, W. Cai, J. Huang, W. Dong, and B. Zhang.
Changing lengths of the four seasons by global warming.
Geophysical Research Letters, 48(6):e2020GL091753, 2021.
e2020GL091753 2020GL091753.

Gracias

Exploración de la hipótesis



Datos fenológicos

- Calendario agrícola tomado del Joint Research Centre de la Unión Europea.
- Fechas de siembra tomadas de la plataforma Proyecto Fenología Paneuropea 725 (PEP725).
- Periodo 1951–2015.
- Tamaño de la muestra: 58115.

Comparación 1951 vs. 2015



Comparaciones por año



Exploración de la hipótesis



El cambio estructural es consistente con lo previamente reportado por Chmielewski *et al.* (2004); Menzel *et al.* (2020); Reid *et al.* (2015); Wu *et al.* (2016).

Fechas de siembra



Variedades del maíz



Trait	Maturity	First year	Years	Number of Observations	Trials	Varieties	Common varieties
Grain maize							
Grain yield	Early	1987	37	11,218	1,063	186	132
	Medium	1987	37	14,209	1,028	274	179
	Late	1987	37	7,444	854	126	78
Harvest index	Early	1986	35	1,988	269	128	
	Medium	1986	35	3,403	354	175	
	Late	1986	35	2,628	474	77	

Traits	Grain maize				
	Maturity	1987	2023	Diff %	sig
Days from first of January to day of sowing	early	118.1	116.2	−2.0 | −1.7	ns
	medium	118.3	115.9	−2.5 −2.1	ns
	late	118.1	116.2	−2.0 −1.7	ns

Las distintas variedades de maíz comparten su respuesta a las condiciones de cultivo.

Fuente: Parent *et al.* (2012); Sánchez *et al.* (2014).

Las condiciones climáticas determinan la variedad a emplear.

Fuente: FAO (s.f.).

Fuente: Laidig *et al.* (2025). Breeding progress of grain and forage maize in long-term variety trials compared to on-farm yield development.



Fuente: Asam *et al.* (2022). Mapping Crop Types of Germany by Combining Temporal Statistical Metrics of Sentinel-1 and Sentinel-2 Time Series with LPIS Data.

Quincenas mensuales del año																							
E-I	E-II	F-I	F-II	M-I	M-II	Ab-I	Ab-II	M-I	M-II	Jun-I	Jun-II	Jul-I	Jul-II	Ag-I	Ag-II	S-I	S-II	O-I	O-II	N-I	N-II	D-I	D-II
-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	-	-	-

Fuente: Joint Research Centre of the European Commission. (2026). Agri4cast Data Portal.