

Modelo predictivo de ventanas de fechas óptimas para la siembra de maíz en Alemania en el contexto del cambio climático.

Introducción

Las flores, frutas, vegetales y hongos representan un pilar fundamental en la cadena alimentaria [15]. La industria agrícola, responsable de su producción continua, enfrenta desafíos crecientes debido a la incertidumbre respecto a las condiciones de cultivo, las cuales se han visto afectadas, en gran parte, por el cambio climático [86].

Respecto a las estaciones del año, el cambio climático ha implicado un desfase su duración, alterando sus fechas de inicio y término. Las cuatro estaciones del año se definen a partir de criterios biológicos y físicos [127]. De esta manera, se ha determinado que, en el hemisferio norte, la duración del verano se ha prolongado de manera estadísticamente significativa; mientras que la duración del resto de estaciones se han reducido y se especula que esta tendencia se exacerbe en los próximos años [137], tanto por factores naturales como por factores ligados a la actividad humana [90].

Estas alteraciones repercuten en diversos aspectos, entre ellos el ciclo de producción agrícola, debido a variaciones inusuales e inesperadas en temperatura, precipitación y patrones de migración de polinizadores, entre otros factores. Los cuales, en conjunto, han modificado las zonas, temporadas y rendimiento de los cultivos [8, 22, 86].

Esto es especialmente relevante, ya que la estabilidad de los procesos productivos depende de cierta consistencia en las condiciones ambientales. Sin embargo, las circunstancias a las que nos enfrentamos actualmente, derivadas principalmente por el cambio climático, han incrementado la inestabilidad en la seguridad alimentaria y el desabasto a la par de reducir la producción y exportación, impactando directamente la economía de las naciones [32].

Cada cultivo prospera dentro de umbrales agro-ambientales específicos, que en muchos casos, han sido ya ampliamente descritos con anterioridad en la literatura científica; e.g., el aguacate [78, 108] o el agave [40]. El maíz (*Zea mays*), un cultivo de origen mexicano [84], representa un caso particular al ser considerado como uno de los cultivos más importantes a nivel mundial para el abastecimiento alimenticio directo e indirecto y sus usos industriales [105].

Desde su domesticación, ocurrida hace más de 9000 años [91, 145], el maíz ha sido empleado para consumo tanto de dieta primaria como de dieta secundaria; i.e., incorporado en conjunto con otros alimentos o para forrajeo [105]. Más aún, el maíz tiene un papel crucial en diversas actividades del sector productivo y de manufactura [101]; e.g., cervezas, jarabes, harinas, medicamentos y biocombustibles [102, 115, 149].

De esta manera, la importancia del maíz trasciende al sector alimentario y es por tanto que ha tomado relevancia a nivel mundial. De acuerdo con Erenstein *et al.* (2021) [29] y Erenstein *et al.* (2022) [30], anualmente se destinan aproximadamente 200 millones de hectáreas para la plantación de maíz las cuales se encuentran distribuidas principalmente en América (36.10 %) y Asia (34.08 %) seguidas por África (20.86 %), Europa (8.91 %) y, finalmente, Oceanía (0.05 %) [30].

Lo antes mencionado nos indica que las plantaciones de maíz se distribuyen de manera asimétrica alrededor del mundo [101]; en contraste, como producto alimenticio está presente en la dieta mundial [30]. El consumo de este cultivo aporta, en promedio, el 5.3 %, el 4.6 % y 1.6 % de la ingesta calórica, proteica y grasa, respectivamente, per capita diaria [30].

De acuerdo con Erenstein *et al.* (2021) [29], para finales de 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) reportó una producción de 1137 millones de toneladas de maíz. El maíz puede clasificarse por su tamaño, dulzor, composición del endospermo o color [101]; no obstante, comparten su respuesta a las condiciones cultivo [120, 89].

Desde la siembra hasta la cosecha, la fenología del maíz; i.e., las etapas de desarrollo, puede describirse de manera robusta en función de la temperatura [65]. En este sentido, se ha demostrado que la relación entre temperatura y tasa de desarrollo es consistente entre las distintas variedades [89].

Un calendario agrícola provee de información crítica respecto a las etapas del cultivo tales como la siembra o la cosecha [38]. Además del alza en la frecuencia de eventos climáticos extremos [75], el incremento de la temperatura promedio del planeta [112] y los desfases en la duración de las estaciones del año [136], el cambio climático ha alterado la distribución espacial de las zonas de cultivo [119] y los calendarios agrícolas [38].

Lo anterior impone a la agricultura un reto para garantizar la calidad y la cantidad de productos para satisfacer las necesidades alimentarias en el futuro [75]. Por otro lado, respecto al maíz, se ha observado que las fechas de siembra juegan un rol determinante en la cosecha resultante [7, 9, 66, 69, 92, 110], motivo por el cual este trabajo se centra en proponer una recalendarización de la ventana de fechas de siembra que garanticen ciclos de desarrollo sano y minimicen la exposición al estrés.

Asimismo, en consecuencia del cambio climático, las regiones con mayor altitud y aquellas al norte de la región noroeste de Europa, en particular Alemania, tendrán un incremento en las zonas con potencial de producción agrícola del maíz [74]. No obstante, dicha transición implica retos en tanto a la renovación de la planeación, la gestión, el desarrollo y la correcta implementación de las técnicas agrícolas relativas al manejo y cuidado del cultivo [88, 26].

A pesar de ello, la identificación de ventanas óptimas de siembra, bajo la transición que su-

pone el cambio climático, continúa siendo limitada, no por desinterés sino por la tendencia a considerarlas estáticas [92], la complejidad inherente a la incertidumbre climática [135] y por falta de especificidad en la información disponible correspondiente a las fechas de plantación [98, 109]. En este sentido, este estudio pretende robustecer la planificación de fechas de siembra del maíz, a partir de la implementación de herramientas analíticas y computacionales para la toma de dicha decisión, dadas las demandas de actualización que implica el futuro panorama agrícola de Alemania.

Finalmente, el maíz constituye un cultivo estratégico no solo por su relevancia productiva y económica, sino también por su estabilidad nutricional bajo escenarios de elevadas concentraciones atmosféricas de CO₂ [80] y su papel en la seguridad alimentaria global [121]. Estas características, en conjunto con la expansión proyectada de su área potencial de cultivo en regiones como Alemania, refuerzan la necesidad de optimizar la planificación agronómica en dichas zonas. En consecuencia, el presente estudio se orienta a la determinación de ventanas óptimas de siembra mediante el análisis de datos históricos con el objetivo de anticipar y mitigar riesgos asociados al cambio climático.

Revisión del estado del arte

Los cultivos anuales; i.e., aquellos que completan su ciclo de vida en, a lo más, un año [113], son altamente sensibles al clima [44]. En particular, se ven afectados por las tendencias a largo plazo de la temperatura y precipitación promedio, la variabilidad climática interanual, las perturbaciones durante el desarrollo de etapas fenológicas específicas y los eventos meteorológicos extremos [34].

En escenarios climáticos poco favorables para la industria agrícola, se ha observado la tendencia de abandonar las zonas de cultivo dado que los ingresos esperados no compensarían los costos asociados a la recolección [23]. Este fenómeno es más frecuente en países en desarrollo [18]; no obstante, las decisiones agrícolas pueden ajustarse ante la ocurrencia de estos eventos [23] al aludir, por ejemplo, a observaciones del comportamiento de la fauna y flora, experiencias previas y/o el conocimiento ancestral [79].

Las estrategias para reducir el estrés inducido por los riesgos climáticos en la agricultura incluyen a la diversificación de cultivos, reducir la labranza, emplear variedades más resistentes, transicionar a sistemas integrados mixtos de agricultura y ganadería, introducir infraestructura para irrigación, cambiar los medios de almacenamiento de los productos y recalendarizar fechas [147, 23, 18].

Para cada cultivo, el calendario agrícola asociado a él detalla la secuencia cronológica en la que suceden las diversas etapas fenológicas asociadas a su ciclo de crecimiento [93]. En el ciclo de crecimiento las semillas son cruciales ya que, simultáneamente, estas son la fuente y el producto de las planta [46]; consecuentemente, las fechas de siembra tienen un papel

relevante en los calendarios agrícolas.

En plantas, la fenología describe los requerimientos ambientales para su desarrollo a la par de detallar la respuesta de la planta, en sus diversas etapas de vida, a los estresores ambientales [27]. De esta manera, la fenología monitorea, entiende y predice el acontecimiento de estos eventos biológicos que son desencadenados por cambios en el clima y la meteorología [52, 62, 17, 103, 106].

Por tanto, la fenología es una descripción integral tanto de las respuestas de los organismos como de las respuestas funcionales de los ecosistemas, ambos, ante el cambio climático [107, 106]. Se han observado cambios locales en la fenología [21]; por ejemplo, la duración de las temporadas de cultivo se ha prolongado presentando una tendencia hacia ser iniciadas en épocas más tempranas [64].

En este contexto, la documentación de calendarios agrícolas a escala global ha sido fundamental para estudiar, cuantificar y modelar las variaciones en los periodos de interés productivo [48]. Con base en la metodología empleada para generarlos, los calendarios agrícolas pueden clasificarse en tres categorías: basados en información local, basados en modelos agrícolas o basados en observaciones de la Tierra [38].

Los calendarios agrícolas generados a partir de información local provienen datos recopilados por agencias internacionales, visitas de campo, informes de expertos o de interpolaciones espaciales de censos [38]. No obstante, su resolución carece de especificidad regional por lo que no captura las variaciones particulares en el inicio y fin de las temporadas de cultivo [139].

Respecto a los calendarios agrícolas basados en modelos, estos se construyen con el objetivo de caracterizar las relaciones entre las variables climáticas y las etapas fenológicas de los cultivos [38]. La versatilidad tanto en la particularización de zonas geográficas y cultivos como en sus usos es amplia [77, 141]; no obstante, son susceptibles tanto al sobreajuste o la sobresimplificación como a incertidumbres estructurales derivadas de la selección de variables, la parametrización y la calidad de los datos de entrada [83].

Los modelos agrícola contruidos a través de observaciones de la Tierra emplean la metodología denominada Fenología de la Superficie Terrestre (LSP, por sus siglas en inglés) [38]. Bajo este paradigma se detectan cambios en la vegetación a través de observaciones remotas provenientes de satélites [54]. Identifica la primera y la última señal de cobertura espacial de la vegetación identificándolas con el inicio y el fin de la temporada de cultivo, respectivamente; no obstante, usualmente, reportan fechas de inicio retrasadas y fechas de término anticipadas [38].

En este contexto, el presente trabajo se desarrolla para robustecer la categoría de calendarios agrícolas basados en modelos agrícolas. Lo anterior, aportando un modelo probabilístico que satisfaga los estándares propuestos por Witchcraft et al. (2015) [139] considerando una

cobertura espacial amplia, integrando la variabilidad espacial en las prácticas de cultivo y las condiciones climáticas y definiendo explícitamente el periodo de referencia; esto, para asegurar su relevancia y aplicabilidad.

Las interacciones entre las temperaturas y el lapso en que un organismo es expuesto a la luz solar diariamente [21]; es decir, el fotoperiodo, caracterizan eventos claves del ciclo de desarrollo en las plantas [122]; motivo por el cual suelen considerarse en diversos modelos agrícolas. Los efectos de estas interacciones son más notables en las plantas cuya fenología sucede, parcial o totalmente, durante la primavera [122]; por ejemplo, el maíz en Alemania [65, 92].

Por una parte, el fotoperiodo es una señal abiótica con variabilidad predecible [60] cuyos efectos en plantas pueden compensar el enfriamiento insuficiente del invierno y fungir como una barrera para limitar la expansión geográfica [122]. Por otra parte, las temperaturas intervienen en el desarrollo y la producción de las plantas [6], pero sus fluctuaciones tienden a ser más volátiles por lo que la predicción climática aún es un reto [57, 70].

A pesar de la complejidad inherente a lo antes mencionado, en la literatura se reportan múltiples calendarios agrícolas utilizados como herramientas en la estructuración de cronogramas de producción. De esta manera, discutiremos aquellos derivados de modelos agrícolas, con particular énfasis en los desarrollados específicamente para el cultivo del maíz.

De acuerdo con Stehfest *et al.* (2007) [118], los trabajos de Sprengel, C. (1828) [116], de Liebig, J. (1840) [63] y de Mitscherlich, E. (1909) [76] fueron pioneros en investigar acerca de los factores que limitan el desarrollo en los cultivos y cuestionarse sobre el manejo agrícola lo optimiza.

Por una parte, en el trabajo de Sprengel, C. (1828) [116] se describió el papel de los minerales para la vida de las plantas y cómo los adquieren del suelo [51]. Posteriormente, el libro de Liebig, J. (1840) [63] se propone que la disponibilidad individual de los minerales supone una restricción para la producción de la planta, lo cual cimentó las bases para entender la nutrición de plantas [114]. No obstante, esta contribución pudo ser integrada cuantitativamente en la modelación agrícola tras su formulación matemática que fue presentada en el trabajo de Waggoner *et al.* (1979) [134].

Finalmente, en el trabajo de Mitscherlich, E. (1909) [76] se introduce la metodología de curvas de dosis-respuesta para representar la relación entre un parámetro biológico y un factor ambiental, cuantificando la fuerza, señal y forma del efecto que tiene tal factor sobre dicho parámetro [97]. El impacto de los trabajos antes mencionados ha trascendido de manera tal que modelos agrícolas aún se ven influenciados por ellos [118].

La metodología desarrollada por Mitscherlich, E. (1909) [76] fue propuesta un contexto biológico general; no obstante, en particular, se ha empleado para estudiar y predecir la relación

entre la fenología y el ambiente; e.g., [14, 100, 131]. Esto se logra a través de considerar los grados día de crecimiento (GDD, por sus siglas en inglés) en las ecuaciones correspondientes [100]; e.g., [14, 37, 125, 131].

La metodología de Mitscherlich, E. (1909) [76] se ha diversificado y generalizado [56]. No obstante, el papel de los GDD permanece vigente y ampliamente utilizado en la predicción fenológica de cultivos [2, 58, 87, 96, 100, 140], consolidándose como un referente metodológico estándar en el área [3].

La progresión de las etapas fenológicas responde al clima y a no la cronología *per se* [94]. En este sentido, los GDD son unidades de calor acumulado que miden la relación entre las condiciones térmicas disponibles en el entorno y los requerimientos térmicos necesarios para que el cultivo manifieste a sus diversas etapas de desarrollo [4].

El concepto de GDD fue formulado originalmente por René-Antoine Ferchault de Réaumur en 1730 [4, 43]. Se ha profundizado en sus propiedades matemáticas [71, 146] y desarrollado diversas variantes metodológicas teóricas [28, 150], cuya implementación en distintos cultivos ha sido exitosa, corroborando su utilidad en la predicción del desarrollo y la planificación agrícola, motivo por el cual ha sido adoptado por la FAO [87].

Respecto al maíz, tanto a nivel global como a escala local, los modelos basados en GDD se han desarrollado con los objetivos de predecir la secuencia fenológica completa del cultivo; e.g., [81, 42] o restringir la predicción a etapas específicas como la siembra, madurez fisiológica o la cosecha; e.g., [92, 47, 135, 95]. Además de estudiar las diferencias en los eventos fenológicos entre variedades de maíces o híbridos; e.g., [7, 69, 4], evaluar cambios en la dinámica fenológica ante estresores como las sequías o las heladas; e.g., [53, 59, 151] o determinar zonas con potencial productivo; e.g., [12, 61, 129].

Asimismo, estos enfoques han sido integrados en plataformas de simulación agrícola de mayor complejidad; e.g., [5, 144]. En años recientes, la capacidad predictiva de estos modelos se ha fortalecido mediante la incorporación de técnicas de ciencia de datos que, manteniendo a los GDD como variable explicativa central, permiten representar indirectamente la incertidumbre fenológica, preservando al mismo tiempo los objetivos agronómicos asociados a los enfoques de modelación basados en tiempo térmico previamente descritos [49].

Los modelos agrícolas basados en los GDD han sido implementados en campo, mostrando su efectividad [13, 35, 128]. No obstante, las extensiones de este enfoque destinadas a incorporar factores ambientales más allá de la temperatura siguen siendo escasas; e.g., [124]. En consecuencia, el marco metodológico tiende a sobresimplificar el problema de interés [36]. Más aún, debido a las diversas formulaciones propuestas, la interpretación de los resultados obtenidos puede resultar ambigua [71].

Asimismo, por su construcción matemática, este enfoque supone una relación lineal entre el

desarrollo fenológico y la temperatura, lo cual no refleja plenamente la complejidad de los procesos biológicos [55]. Además, los modelos basados en este enfoque suelen ser específicos de la zona de cultivo y de sus condiciones climáticas, por lo que su extrapolación a otros contextos resulta limitada [36].

Como se mencionó previamente, los modelos basados en GDD predominan en la predicción fenológica y en la construcción de calendarios agrícolas. No obstante, la literatura ha reportado diversas alternativas metodológicas [142]. En lo subsecuente, se presentan algunos trabajos que prescinden del uso de GDD y que incorporan explícitamente la incertidumbre inherente al desarrollo de los cultivos mediante enfoques probabilísticos.

La literatura referente a modelos estocásticos es aún limitada. No obstante, tanto a escala mundial como a nivel local, estos enfoques preservan los objetivos de estudiar la sucesión fenológica del cultivo en su totalidad; e.g., [38] o focalizar su análisis en alguna etapa específica del desarrollo; e.g., [24, 72, 73, 111].

De igual manera, estos modelos se interesan por caracterizar la fenología de variedades o híbridos; e.g., [33], estudiar cambios en la fenología causados por estresores; e.g., [16, 82] o determinar zonas con potencial productivo; e.g., [126]. A los objetivos anteriores, los modelos probabilísticos incorporan además la calibración explícita de parámetros; e.g., [16, 126, 132, 133].

De los trabajos anteriores, destacamos el de Franch *et al.* (2022) [38], cuya metodología dota a los calendarios agrícolas de una estructura cíclica, en lugar de tratarlos como un sistema lineal de 365 días con principio y fin. Esta sutil modificación, junto con sus propiedades matemáticas subyacentes, reflejan con mayor fidelidad la naturaleza cíclica de los procesos biológicos [19, 41, 45, 67, 99, 104].

Para concluir, en el estado actual del arte la mayoría de los trabajos propuestos continúan centrados en describir la sucesión completa de etapas fenológicas o en modelar el desarrollo del cultivo a partir de los GDD. Por su parte, las alternativas probabilísticas suelen emplearse principalmente en la calibración de parámetros dentro de estos modelos.

En este contexto, la determinación de ventanas de fechas óptimas para la siembra desde una perspectiva probabilística que no utilice los GDD como variable explicativa ha recibido menor atención en la literatura. De esta manera, el presente trabajo propone un modelo probabilístico autónomo que considera factores agroambientales significativamente correlacionados con las fechas de siembra, con el objetivo de identificar intervalos temporales que minimicen los estresores que afectan al cultivo.

Finalmente, en términos generales, los calendarios agrícolas derivados de modelos suelen validarse mediante su comparación con calendarios agrícolas construidos a partir de información local; por ejemplo, [98, 109]. Este procedimiento permite evaluar la consistencia de las estimaciones del modelo respecto a las condiciones agroclimáticas y productivas propias de cada

región. Bajo dicho estándar, el modelo propuesto en este trabajo será evaluado mediante su contraste con calendarios agrícolas contruidos a partir de información oficial de la región.

Objetivos

El proyecto aquí propuesto se ubica dentro de la línea de generación y aplicación del conocimiento de analítica de grandes cúmulos de información y pretende abordar la pregunta de investigación referente a cómo pueden utilizarse modelos probabilísticos basados en variables agroclimáticas para estimar ventanas óptimas de fechas de siembra de maíz en Alemania bajo condiciones de cambio climático, sin recurrir a la metodología clásica basada en GDD. Esto, bajo la hipótesis de que el cambio climático ha inducido cambios estructurales significativos en los procesos agrícolas de producción implicando un riesgo para la seguridad alimentaria.

De esta manera, consideraremos datos agroclimáticos históricos para pronosticar las fechas más apropiadas para realizar la siembra de maíz en Alemania. Así, emplearemos herramientas estadísticas, como las pruebas de hipótesis, las correlaciones y los análisis de regresión, a la par, de conjuntar la teoría de los procesos estocásticos y la teoría de gráficas a través de la incorporación de caminatas aleatorias sobre gráficas para estimar la viabilidad de siembra a través de los días. Para ello, se considerarán los objetivos que presentamos a continuación.

Objetivos generales.

1. Desarrollar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para estimar ventanas óptimas de fechas de siembra de maíz en Alemania, con el fin de favorecer ciclos de desarrollo saludables y minimizar la exposición a estresores ambientales, validando sus resultados mediante información oficial y sintetizándolos en un calendario agrícola claro y accesible.
2. Contribuir a la toma de decisiones dentro de la gestión de procesos agroproductivos del maíz en Alemania, una región con potencial agrícola en crecimiento debido a que se enfrenta a contexto de transición climática derivado del cambio climático.

Objetivos particulares.

1. Recopilar y sistematizar bases de datos históricas de fechas de siembra y variables agroclimáticas relevantes para la producción de maíz en Alemania.
2. Homogeneizar y depurar las bases de datos climáticas y agrícolas para garantizar su consistencia y comparabilidad.
3. Analizar la variabilidad temporal de las fechas de siembra del maíz y su relación con las condiciones agroclimáticas.

4. Identificar las variables agroambientales estadísticamente significativas asociadas a las decisiones de siembra.
5. Evaluar la estabilidad temporal de dichas variables agroclimáticas, considerando los cambios observados en el clima y su posible relación con el cambio climático.
6. Formular y estimar un modelo probabilístico que describa la distribución de las fechas de siembra a partir de las variables agroclimáticas seleccionadas.
7. Estimar ventanas probabilísticas de fechas óptimas de siembra, junto con intervalos de confianza asociados.
8. Validar los resultados del modelo mediante su comparación con calendarios agrícolas reportados por fuentes oficiales e identificar sus alcances y limitaciones para aplicaciones en otras regiones o cultivos.

Metodología

[Under construction]

Cronograma de actividades

Para asegurar el desarrollo y la culminación exitosa del proyecto, se propone el siguiente cronograma, el cual se ha desglosado semestralmente. Lo anterior, para tomarlo como referencia a fin de garantizar un avance progresivo al apegarnos lo más posible a él y cubrir tanto los aspectos referentes al proyecto de investigación como los aspectos administrativos.

Semestre	Actividades
Agosto – Diciembre 2025	• Profundizar la revisión bibliográfica. • Definir y depurar el conjunto de datos con el que se trabajará a lo largo de proyecto. • Explorar técnicas de aprendizaje automático aplicadas a cultivos, tanto para aguacates como a algunos otros cultivos de características similares. • Elaborar una primera versión del protocolo de investigación.

Semestre	Actividades
Enero – Julio 2026	• Proponer, diseñar y revisar la metodología del modelo de predicción. • Implementar un análisis exploratorio con datos preliminares. • Presentar la versión final del protocolo de investigación ante el comité sinodal. • Comenzar con la escritura de la tesis.
Agosto – Diciembre 2026	• Entrenar modelos preliminares de predicción con diferentes técnicas. • Evaluar el desempeño de los modelos utilizando métricas estándar. • Comenzar con la escritura del primer artículo de investigación. • Presentar avances en un congreso nacional; por ejemplo, el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, Congreso Nacional de Agricultura Sostenible u otros.
Enero – Julio 2027	• Identificar el congreso internacional más adecuado para el envío del artículo. • Preparar una presentación oral o póster para dicho evento • Enviar el artículo que se desprenda del proyecto a un congreso internacional. • Fortalecer el proyecto a partir de buscar colaboraciones potenciales nacionales e internacionales.
Agosto – Diciembre 2027	• Realizar actividades de retribución social para cumplir con los requisitos de la SECIHTI. • Consolidar los primeros capítulos de la tesis. • Definir las revistas de investigación, indexadas en el JCR y con un buen factor de impacto, en las cuales nuestro proyecto encajaría y destacaría.

Semestre	Actividades
Enero – Julio 2028	• Refinar y evaluar las metodologías para hacer ajustes considerando los resultados obtenidos y los alcances del proyecto. • Revisar y confirmar que el artículo a enviar cumple con el proceso editorial de la revista. • Enviar el primer artículo de investigación que se desprenda del proyecto a una revista indexada en el JCR.
Agosto – Diciembre 2028	• Revisar comentarios de los revisores del artículo enviado para llevar a cabo las correcciones pertinentes en las rondas de revisiones que sean solicitadas. • Integrar las correcciones discutidas durante la revisión del artículo a los capítulos centrales de la tesis. • Revisar y releer los avances de la tesis para afinar detalles, evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados y dar paso a la conclusión del trabajo.
Enero – Julio 2029	• Obtener la aceptación del artículo enviado a una revista indexada en el JCR. • Culminar la escritura de la tesis con el visto bueno por parte de la directora de tesis. • Enviar la tesis al comité sinodal para su revisión, corrección y posterior aprobación. • Solicitar la autorización de impresión de la tesis por parte de la biblioteca. • Aprobar el examen cerrado ante el comité sinodal para, posteriormente, realizar el examen de defensa de tesis para la obtención del grado académico.

Resultados preliminares

Según la ubicación geográfica y el cultivo a producir, los calendarios agrícolas consideran tanto las condiciones ambientales como los requerimientos agroclimáticos necesarios para el desarrollo del cultivo de interés, ambos, para caracterizar los eventos fenológicos en función del entorno regional [148]. De esta manera, es posible sincronizar los manejos y procesos agrícolas con la fenología del cultivo [39].

Para la Unión Europea, el Joint Research Centre (JRC) ha desarrollado la plataforma web AGRI4CAST (<https://agri4cast.jrc.ec.europa.eu/dataportal>). Esta es una herramienta de dominio público que condensa datos agrometeorológicos para propósitos de investigación y el desarrollo de políticas públicas [10].

A través de su unidad de seguridad alimentaria, el JRC ha reportado los calendarios agrícolas de 28 países para el maíz; en particular para Alemania, ver Tabla 2. De acuerdo con el JRC [50], dichos calendarios se encuentran a una resolución por países y por regiones socio-económicas grandes clasificados dentro de la nomenclatura de unidades territoriales para estadísticas (NUTS, por siglas en inglés) como NUTS 0 y NUTS 1, respectivamente [31].

Quincenas mensuales del año																							
E-I	E-II	F-I	F-II	M-I	M-II	Ab-I	Ab-II	M-I	M-II	Jun-I	Jun-II	Jul-I	Jul-II	Ag-I	Ag-II	S-I	S-II	O-I	O-II	N-I	N-II	D-I	D-II
-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	-	-	-

Tabla 2: Calendario agrícola para el cultivo del maíz en Alemania. Extracto y traducción de los calendarios agrícolas del maíz para los países miembros de la Unión Europea en resolución NUTS 0 y NUTS 1 [50]. Las celdas en color verde y etiquetadas con el número uno indican los periodos de plantación a etapas vegetativas tempranas, las celdas en color amarillo y etiquetadas con el número dos indican las etapas vegetativas a reproductivas del cultivo y, finalmente, las celdas en color rojo y etiquetadas con el número tres señalan los periodos de maduración a cosecha; mientras que las celdas en color blanco y etiquetadas por un guion señalan el periodo fuera de la temporada agrícola.

Para el caso de Alemania, este calendario se muestra con resolución NUTS 0 únicamente; asimismo, considera fechas fijas y presenta información actualizada hasta 2015 [50]. Por tanto, posee tanto las ventajas como las limitaciones discutidas en la revisión del estado del arte para los calendarios agrícolas basados en información local.

Resaltando que, por una parte, es un calendario que reporta información oficial que proviene de un organismo internacional. Y, por otra parte, a consecuencia de su resolución, carece de especificidad geográfica lo que, potencialmente, enmascara las variaciones particulares de cada región.

El proyecto Fenología Paneuropea 725 (PEP725, por sus siglas en inglés) alberga bases de datos fenológicas para promover el desarrollo científico y educativo [123]. De esta manera, la base datos que concierne al cultivo de maíz en Alemania reporta datos históricos desde 1951 hasta 2015 [85].

Al analizar la base datos de fechas de siembra que se reportan a través del proyecto PEP725 y contrastarlos con el calendario agrícola descrito por el JRC se observa una clara discrepancia, ver Fig. 1. Las fechas de siembra teóricas anteceden al periodo de fechas que se emplean en el campo para llevar a cabo la siembra del maíz.




Figura 1: Comparativa entre las fechas de siembra históricas y las fechas de siembra del calendario agrícola teórico. Las líneas punteadas en color rojo denotan el día número 74 y 105 del año que corresponden al inicio y fin del periodo de siembra, respectivamente, que comprende desde la segunda mitad de marzo hasta la primera mitad de abril [50]. Los puntos en color negro indican que las fechas en las que se llevó a cabo, al menos, una siembra de maíz dentro de Alemania en el periodo de 1951 a 2015 [85].

Más aún, a lo largo de los 64 años reportados, solo se han registrado siembras en 3654 días distintos de los 23360 disponibles acumulados. Por otra parte, únicamente en 847 veces se han llevado siembras dentro del periodo teórico, implicando que el 76.82% de las fechas se encuentra fuera del periodo reportado oficialmente. Específicamente, en el campo, la siembra del maíz tiende a ser posterior al final de la temporada de siembra que se comunica en el calendario agrícola teórico.

En la Fig. 1, el análisis presentado es binario en el sentido de que si en una fecha dada no se ha registrado alguna siembra, esta se mantiene en color blanco; mientras que, si se ha registrado una o más siembras, dicha fecha se muestra en color negro. Al hacer distinción




Figura 2: Comparativa entre el periodo de fechas de siembra del calendario agrícola teórico y las distribuciones anuales de las fechas de siembra históricas. Las líneas punteadas en color rojo denotan el día número 74 y 105 del año que corresponden al inicio y fin del periodo de siembra, respectivamente, que comprende desde la segunda mitad de marzo hasta la primera mitad de abril [50]. Mientras que en escala de colores se visualizan las estimaciones por KDE de las distribuciones de fechas de siembra por año.

sobre el número de siembras realizadas en las diversas fechas obtenemos una perspectiva más amplia, ver Fig. 2.

Al estimar las distribuciones de las fechas de siembra reportadas anualmente, a través del método Kernel Density Estimation (KDE) implementado a través de JoyPy, puede apreciarse que, en general, son inesgadas. Por tanto, se verifica que el periodo de fechas de siembra teóricas culmina previo al periodo en el cual se realiza la siembra realmente.

Ante cambios en el clima, la conjunción entre el conocimiento local y los modelos agrícolas puede ser un auxiliar en el apropiado ajuste de los manejos agrícolas [130, 143]. Por otra parte, el efecto del cambio climático sobre la sincronía entre los eventos fenológicos con los procesos agrícolas es diverso [20, 25, 68, 69, 117, 152] induciendo, únicamente, tres escenarios posibles: adelantar, mantener o retrasar dicha sincronía.

La migración hacia fechas previas a las usuales puede resultar beneficioso al evitar condiciones estresantes asociadas a temporadas más cálidas [20]. Asimismo, en algunas regiones, la plantación temprana de maíz tuvo un efecto en el incremento de la cosecha [69, 117]. No obstante, en este escenario, es posible que las plantas demoren más tiempo para emerger a la par de reducir la densidad poblacional del cultivo [68].

En comparación, optar por fechas posteriores expone a condiciones más cálidas a los cultivos, especialmente en zonas en donde el comienzo de la temporada de heladas se ha retrasado [20]. De igual manera, puede favorecer que la maduración del maíz ocurra en menor tiempo, se obtengan granos con mayor humedad y plantas más altas [25, 68, 150]. Sin embargo, bajo este manejo agrícola, se ha reportado una baja en la producción de algunas variantes o híbridos del maíz [69, 117, 152].

En contraste, en las plantas como el maíz se han descrito métodos, tanto intrínsecos [1] como extrínsecos [138], capaces de compensar las condiciones del entorno y, así, mantener su producción. De esta manera, cambiar las fechas para su plantación no tiene un efecto real sobre la cosecha obtenida, implicando que también es viable preservar las fechas usuales de plantación [69].

Al considerar lo antes discutido, es posible entender la complejidad subyacente en la determinación de periodos de siembra, los cuales se ven influenciados tanto por objetivos agrícolas deseados como por las condiciones regionales [69]. De modo que comprender la interacción entre las alteraciones fenológicas y los ajustes procedimentales en la agricultura es crucial ante la incertidumbre que induce el cambio climático [20, 25, 92, 152].

Asimismo, lo anterior confirma, en general, la hipótesis bajo la cual desarrollamos este trabajo: el cambio climático ha producido cambios estructurales significativos en los procesos agrícolas de manera tal que los periodos óptimos para la plantación de cultivos anuales; e.g., el maíz, cambian acorde al área, principalmente, por las variaciones climáticas [7, 11, 20, 68].

De igual forma, lo anterior justifica el estudio de las fechas de siembra históricas del maíz en Alemania, una región en transición climática, para generar un modelo matemático cuyo objetivo sea determinar las fechas que optimicen este proceso, favoreciendo un desarrollo sano y reduciendo la exposición al estrés del entorno.

En este sentido, a nivel particular en Alemania, se realizó un análisis comparativo del comportamiento registrado históricamente en tanto a los periodos de siembra, para corroborar la hipótesis que subyace en el desarrollo de esto trabajo.

Referencias

- [1] H.A.S. Agrama. Sequential path analysis of grain yield and its components in maize. *Plant Breeding*, 115(5):343–346, 1996.
- [2] M. Ahmed, A. Sameen, and A.M.S. Kheir. Warming trends and shortened growing seasons: integrating four decades of observations and model simulations to develop wheat adaptation strategies in semi-arid pakistan. *Scientific Reports*, 16(1), February 2026.
- [3] M. Amare and Balana. B. Climate change, income sources, crop mix, and input use decisions: Evidence from nigeria. *Ecological Economics*, 211:107892, 2023.
- [4] Aavudai Anandhi. Growing degree days – ecosystem indicator for changing diurnal temperatures and their impact on corn growth stages in kansas. *Ecological Indicators*, 61:149–158, February 2016.
- [5] J.R. Angel, M. Widhalm, D. Todey, R. Massey, and L. Biehl. The u2u corn growing degree day tool: Tracking corn growth across the us corn belt. *Climate Risk Management*, 15:73–81, 2017.
- [6] R.N. Bahuguna and K.S.V. Jagadish. Temperature regulation of plant phenological development. *Environmental and Experimental Botany*, 111:83–90, 2015.
- [7] M. E. Baum, S. V. Archontoulis, and M. A. Licht. Planting date, hybrid maturity, and weather effects on maize yield and crop stage. *Agronomy Journal*, 111(1):303–313, 2019.
- [8] G. Bayable, G. Amare, G. Alemu, and T. Gashaw. Spatiotemporal variability and trends of rainfall and its association with pacific ocean sea surface temperature in west harerge zone, eastern ethiopia. *Environmental Systems Research*, 10:1–21, 2021.
- [9] R. Bernal-Morales, J.P. Juárez-Sánchez, B. Ramírez-Valverde, I. Ocampo-Fletes, and M.A. Velasco-Hernández. Impact of climate change on maize (*zea mays* l.) planting dates in the eastern region of puebla, mexico. *Agrociencia*, page 1–16, August 2025.
- [10] I. Biavetti, S. Karetsos, A. Ceglar, A. Toreti, and P. Panagos. European meteorological data: contribution to research, development, and policy support. In Diofantos G. Hadjimitsis, Kyriacos Themistocleous, Silas Michaelides, and Giorgos Papadavid, editors, *Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014)*, volume 9229, page 922907. SPIE, August 2014.
- [11] H. Arnold Bruns and H. K. Abbas. Planting date effects on bt and non-bt corn in the mid-south usa. *Agronomy Journal*, 98(1):100–106, 2006.

- [12] E.E Butler and P. Huybers. Variations in the sensitivity of us maize yield to extreme temperatures by region and growth phase. *Environmental Research Letters*, 10(3):034009, March 2015.
- [13] R. Callejas-Rodríguez, R. Reyes-Sánchez, I. Plácido-Tomieli, and H. Flores-Gallardo. Métodos de evaluación de tiempo térmico para determinar fecha de plantación de papa para la agroindustria. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 46(2):127, June 2023.
- [14] W. Campillay-Llanos, S. Ortega-Farias, and L. Ahumada-Orellana. Development and validation of phenological models for eight varieties of sweet cherry (*prunus avium* l.) growing under mediterranean climate condition. *Scientia Horticulturae*, 326:112711, 2024.
- [15] L. Cassani and A. Gomez-Zavaglia. Sustainable food systems in fruits and vegetables food supply chains. *Frontiers in Nutrition*, 9, February 2022.
- [16] A. Ceglar, Z. Črepinšek, L. Kajfež-Bogataj, and T. Pogačar. The simulation of phenological development in dynamic crop model: The bayesian comparison of different methods. *Agricultural and Forest Meteorology*, 151(1):101–115, January 2011.
- [17] L.P. Cerdeira Morellato, B. Alberton, S.T. Alvarado, B. Borges, E. Buisson, M.G.G. Camargo, L.F. Cancian, D.W. Carstensen, D.F.E. Escobar, P.T.P. Leite, I. Mendoza, N.M.W.B. Rocha, N.C. Soares, T.S. Freire Silva, V.G. Staggemeier, A.S. Streher, B.C. Vargas, and C.A. Peres. Linking plant phenology to conservation biology. *Biological Conservation*, 195:60–72, 2016.
- [18] N. Chekenya. Climate-induced crop failure and crop abandonment: What do we know and not know? *African Journal of Agricultural and Resource Economics*, 18(2):142–151, June 2023.
- [19] I. Chuine and J. Régnière. Process-based models of phenology for plants and animals. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 48(Volume 48, 2017):159–182, 2017.
- [20] E.I. Clark, M.A. Moore, C.K. Khoury, B.S. Hulke, N.C. Kane, and S.C. Elmendorf. Climate drives variation in optimal phenology: 46 years of multi-environment trials in sunflower. *New Phytologist*, 249(3):1527–1541, 2026.
- [21] E.E. Cleland, I. Chuine, A. Menzel, H.A. Mooney, and M.D. Schwartz. Shifting plant phenology in response to global change. *Trends in Ecology & Evolution*, 22(7):357–365, 2007.
- [22] E. Cuevas, J. Blancas, J. Caballero, I. A Hinojosa-Díaz, and A. Martínez-Ballesté. Agricultural management and local knowledge: key factors for the conservation of socio-ecosystems in the face of the pollinator world crisis. *Botanical Sciences*, 99(2):305–320, 2021.

- [23] X Cui. Beyond yield response: Weather shocks and crop abandonment. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 7(5):901–932, 2020.
- [24] J.M. Diez, I. Ibáñez, A.J. Miller-Rushing, S.J. Mazer, T.M. Crimmins, M.A. Crimmins, C.D. Bertelsen, and D.W. Inouye. Forecasting phenology: from species variability to community patterns. *Ecology Letters*, 15(6):545–553, March 2012.
- [25] Koffi Djaman, Samuel Allen, Dorlote S. Djaman, Komlan Koudahe, Suat Irmak, Naveen Puppala, Murali K. Darapuneni, and Sangamesh V. Angadi. Planting date and plant density effects on maize growth, yield and water use efficiency. *Environmental Challenges*, 6:100417, 2022.
- [26] C. Donmez, M. Schmidt, A. Cilek, M. Grosse, C. Paul, W. Hierold, and K. Helming. Climate change impacts on long-term field experiments in germany. *Agricultural Systems*, 205:103578, 2023.
- [27] K. Donohue, L.T. Burghardt, D. Runcie, K.J. Bradford, and J. Schmitt. Applying developmental threshold models to evolutionary ecology. *Trends in Ecology & Evolution*, 30(2):66–77, 2015.
- [28] M.N. Elnesr, A.A. Alazba, and A.A. Alsadon. An arithmetic method to determine the most suitable planting dates for vegetables. *Computers and Electronics in Agriculture*, 90:131–143, 2013.
- [29] O. Erenstein, J. Chamberlin, and K. Sonder. Estimating the global number and distribution of maize and wheat farms. *Global Food Security*, 30:100558, 2021.
- [30] O. Erenstein, M. Jaleta, K. Sonder, K. Mottaleb, and B.M. Prasanna. Global maize production, consumption and trade: trends and r& d implications. *Food Security*, 14(5):1295–1319, May 2022.
- [31] Eurostat, European Commission. Territorial units for statistics (nuts) – gisco geodata, 2026. Accessado el 06 de marzo, 2026.
- [32] M.S. Farooq, M. Uzair, A. Raza, M. Habib, Y. Xu, M. Yousuf, S.H. Yang, and M. Ramzan Khan. Uncovering the research gaps to alleviate the negative impacts of climate change on food security: a review. *Frontiers in plant science*, 13:927535, 2022.
- [33] S. Felema, L.C. Garcia, J.A. Gomes, R.Z. Filho, É.P. Zeny, and A.F. Luchetti. Optimal timing of fungicide applications on maize, soybean, and beans based on calendar and agrometeorological data. *New Zealand Journal of Agricultural Research*, 67(4):513–525, 2024.
- [34] C.B. Field, V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley, editors. *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2012.

- [35] H. Flores-Gallardo, W. Ojeda-Bustamante, H. Flores-Magdaleno, E. Mejía-Sáenz, and E. Sifuentes-Ibarra. Grados día y la programación integral del riego en el cultivo de papa. *Terra Latinoamericana*, 30(1):59–67, 2012.
- [36] H. Fotouo Makouate and M. Zude-Sasse. Advances in growing degree days models for flowering to harvest: Optimizing crop management with methods of precision horticulture—a review. *Horticulturae*, 11(12), 2025.
- [37] J. France and J.H.M. Thornley. *Mathematical models in agriculture*. Butterworths, London, 1984. p. 335.
- [38] B. Franch, J. Cintas, I. Becker-Reshef, M.J. Sanchez-Torres, J. Roger, S. Skakun, J.A. Sobrino, K. Van Tricht, J. Degerickx, S. Gilliams, B. Koetz, Z. Szantoi, and A. Whitcraft. Global crop calendars of maize and wheat in the framework of the worldcereal project. *GIScience & Remote Sensing*, 59(1):885–913, 2022.
- [39] O. Garcia-Tejera, R. Marcos-Matamoros, B. Basile, A. Mataffo, P. Scognamiglio, H. Prieto, L. Mancha, I. Cabral, J. Queiroz, J. Valente, F. Alves, N. González-Reviriego, S. Hernández-Barrera, M. Mata, and J. Girona. A method for using monthly average temperatures in phenology models for grapevine (*vitis vinifera* l.). *OENO One*, 56(4):173–182, November 2022.
- [40] A. García-Mendoza. Distribution of agave (agavaceae) in mexico. 74:177–187, 2002.
- [41] R. Gatto and S.R. Jammalamadaka. Directional statistics: Introduction, March 2015.
- [42] M. Ghamghami, N. Ghahreman, P. Irannejad, and K. Ghorbani. Comparison of data mining and gdd-based models in discrimination of maize phenology. *International Journal of Plant Production*, 13(1):11–22, November 2018.
- [43] M. Giolo, R. Sallenave, C. Pornaro, C. Velasco-Cruz, S. Macolino, and B. Leinauer. Base temperatures affect accuracy of growing degree day model to predict emergence of bermudagrasses. *Agronomy Journal*, 113(3):2960–2966, April 2021.
- [44] A. Gordes, editor. *Climate-Smart Agriculture Sourcebook*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy, 2nd edition, 2017. Accessed 26 February 2026.
- [45] William S. C. Gurney, Philip H. Crowley, and Roger M. Nisbet. Locking life-cycles onto seasons: Circle-map models of population dynamics and local adaptation. *Journal of Mathematical Biology*, 30(3):251–279, January 1992.
- [46] A.K. Hickling and S.A. Gelman. How does your garden grow? early conceptualization of seeds and their place in the plant growth cycle. *Child Development*, 66(3):856–876, 1995.

- [47] T. Iizumi, W. Kim, and M. Nishimori. Modeling the global sowing and harvesting windows of major crops around the year 2000. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 11(1):99–112, 2019.
- [48] J. Jägermeyr and K. Frieler. Spatial variations in crop growing seasons pivotal to reproduce global fluctuations in maize and wheat yields. *Science Advances*, 4(11), November 2018.
- [49] Z. Ji, Y. Pan, X. Zhu, and E.S. Adem. Combining multi-source data, phenology information, and machine learning approaches to estimate crop yield in the united states. *Field Crops Research*, 336:110219, February 2026.
- [50] Joint Research Centre of the European Commission. Agri4cast data portal, 2026. Accesado el 19 de febrero, 2026.
- [51] A. Jungk. Carl sprengel—the founder of agricultural chemistry: A re-appraisal commemorating the 150th anniversary of his death. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 172(5):633–636, 2009.
- [52] Markus Keller. Chapter 2: Phenology and growth cycle. In M. Keller, editor, *The Science of Grapevines (Third Edition)*, pages 61–103. Academic Press, third edition edition, 2020.
- [53] M. Kim, J. Kim, M.-H. Jo, K. Sung, and K.-J. Han. Assessment of planting soil temperature and growing degree day impacts on silage corn (*zea mays* l.) biomass. *Journal of Animal Science and Technology*, 66(5):949–961, September 2024.
- [54] J. Kimball. *Vegetation Phenology*, page 886–890. Springer New York, 2014.
- [55] Hans-Peter Kläring and Angela Schmidt. Diurnal temperature variations significantly affect cucumber fruit growth. *HortScience*, 52(1):60–64, January 2016.
- [56] P.R. Koya and A.T. Goshu. Generalized mathematical model for biological growths. *Open Journal of Modelling and Simulation*, 01(04):42–53, 2013.
- [57] V. Krishnamurthy. Predictability of weather and climate. *Earth and Space Science*, 6(7):1043–1056, 2019.
- [58] C. Kubota. Chapter 10: Growth, development, transpiration and translocation as affected by abiotic environmental factors. In Toyoki Kozai, Genhua Niu, and Michiko Takagaki, editors, *Plant Factory*, pages 151–164. Academic Press, San Diego, 2016.
- [59] M.S. Kukal and S. Irmak. U.s. agro-climate in 20th century: Growing degree days, first and last frost, growing season length, and impacts on crop yields. *Scientific Reports*, 8(1), May 2018.
- [60] M.-W. Li and J.M. Gendron. Exploring the metabolic daylength measurement system: implications for photoperiodic growth. *New Phytologist*, 245(2):503–509, 2025.

- [61] X. Li, L. Yu, Z. Du, and X. Liu. Crop statistic to annual map: Tracking spatiotemporal dynamics of crop-specific areas through machine learning and statistics disaggregating. *Scientific Data*, 12(1), July 2025.
- [62] L. Liang. Phenology. In *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*. Elsevier, 2019.
- [63] J. Liebig. *Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie*. Friedrich Vieweg und Sohn Publ. Co., Braunschweig, Germany, 1840. <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/42117>.
- [64] H.W. Linderholm. Growing season changes in the last century. *Agricultural and Forest Meteorology*, 137(1):1–14, 2006.
- [65] Y.-Y. Liu, Y.-C. Su, P.-W. Sun, H.-Y. Dai, and B.-J. Kuo. Stability of maize phenology predictions by using calendar days, thermal functions, and photothermal functions. *Agriculture*, 15(19), 2025.
- [66] N.V. Long, Y. Assefa, R. Schwalbert, and I.A. Ciampitti. Maize yield and planting date relationship: A synthesis-analysis for us high-yielding contest-winner and field research data. *Frontiers in Plant Science*, 8, December 2017.
- [67] K.V. Mardia and P.E. Jupp. *Directional Statistics*. Wiley, January 1999.
- [68] A. Maresma, A. Ballesta, F. Santiveri, and J. Lloveras. Sowing date affects maize development and yield in irrigated mediterranean environments. *Agriculture*, 9(3):67, March 2019.
- [69] S. Mason, T. Galusha, and Z. Kmail. Planting date influence on yield of drought-tolerant maize with different maturity classifications. *Agronomy Journal*, 110(1):293–299, 2018.
- [70] S. Materia, L. García Palma, C. van Straaten, S. O, A. Mamalakis, L. Cavicchia, D. Coumou, P. de Luca, M. Kretschmer, and M. Donat. Artificial intelligence for climate prediction of extremes: State of the art, challenges, and future perspectives. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 15(6):e914, 2024.
- [71] G.S. McMaster and W.W. Wilhelm. Growing degree-days: one equation, two interpretations. *Agricultural and Forest Meteorology*, 87(4):291–300, 1997.
- [72] E.D. Meenken, C.M. Triggs, H.E. Brown, S. Sinton, J.R. Bryant, A.D.L. Noble, M. Espig, M. Sharifi, and D.M. Wheeler. Bayesian hybrid analytics for uncertainty analysis and real-time crop management. *Agronomy Journal*, 113(3):2491–2505, 2021.
- [73] E.K. Melaas, M.A. Friedl, and A.D. Richardson. Multiscale modeling of spring phenology across deciduous forests in the eastern united states. *Global Change Biology*, 22(2):792–805, January 2016.

- [74] T. Miedaner and P. Juroszek. Global warming and increasing maize cultivation demand comprehensive efforts in disease and insect resistance breeding in north-western europe. *Plant Pathology*, 70(5):1032–1046, 2021.
- [75] I.J. Mirón, C. Linares, and J. Díaz. The influence of climate change on food production and food safety. *Environmental Research*, 216:114674, 2023.
- [76] E.A. Mitscherlich. Das gesetz des minimums und das gesetz des abnehmenden bode-nertrages. *Landwirtschaftliche Jahrbücher*, 38:537–552, 1909.
- [77] Y. Mo, J. Zhang, H. Jiang, and Y.H. Fu. A comparative study of 17 phenological models to predict the start of the growing season. *Frontiers in Forests and Global Change*, 5, 2023.
- [78] A.F Moraes García, L. Micheletti Broglio, M. Santoro Brossi, N. Teixeira dos Santos, T. Avilés Cantuarias, and S. da Silva Rodrigues. Horticultural performance of 'hass' avocado grafted onto seedling and clonal rootstocks under tropical wet-dry climate conditions. *Scientia Horticulturae*, 302:111155, August 2022.
- [79] E.W. Mugi-Ngenga, M.N. Kiboi, M.W. Mucheru-Muna, J.N. Mugwe, F.S. Mairura, D.N. Mugendi, and F.K. Ngetich. Indigenous and conventional climate-knowledge for enhanced farmers' adaptation to climate variability in the semi-arid agro-ecologies of kenya. *Environmental Challenges*, 5:100355, 2021.
- [80] Samuel S. Myers, Antonella Zanobetti, Itai Kloog, Peter Huybers, Andrew D. B. Leakey, Arnold J. Bloom, Eli Carlisle, Lee H. Dietterich, Glenn Fitzgerald, Toshihiro Hasegawa, N. Michele Holbrook, Randall L. Nelson, Michael J. Ottman, Victor Raboy, Hidemitsu Sakai, Karla A. Sartor, Joel Schwartz, Saman Seneweera, Michael Tausz, and Yasuhiro Usui. Increasing co2 threatens human nutrition. *Nature*, 510(7503):139–142, May 2014.
- [81] S.S. Narwal, S. Poonia, and D.S. Singh, G.and Malik. Influence of sowing dates on the growing degree days and phenology of winter maize (zea mays l.). *Agricultural and Forest Meteorology*, 38(1):47–57, 1986.
- [82] G.E.O. Ogutu, W.H.P. Franssen, I. Supit, P. Omondi, and R.W.A. Hutjes. Probabilistic maize yield prediction over east africa using dynamic ensemble seasonal climate forecasts. *Agricultural and Forest Meteorology*, 250–251:243–261, March 2018.
- [83] J.E. Olesen, T.R. Carter, C.H. Díaz-Ambrona, S. Fronzek, T. Heidmann, T. Hickler, T. Holt, M.I. Minguez, P. Morales, J.P. Palutikof, M. Quemada, M. Ruiz-Ramos, G.H. Rubæk, F. Sau, B. Smith, and M.T. Sykes. Uncertainties in projected impacts of climate change on european agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models. *Climatic Change*, 81(S1):123–143, March 2007.

- [84] Q. Orozco-Ramírez, H. Perales, and R.J. Hijmans. Geographical distribution and diversity of maize (*zea mays* l. subsp. *mays*) races in mexico. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 64(5):855–865, April 2016.
- [85] Pan European Phenology Network. Pep725 data selection portal, 2025. Accessed: 2026-03-06.
- [86] R. Parajuli, G. Thoma, and M.D. Matlock. Environmental sustainability of fruit and vegetable production supply chains in the face of climate change: A review. *Science of The Total Environment*, 650:2863–2879, 2019.
- [87] P. Paredes, R. López-Urrea, Á. Martínez-Romero, M. Petry, M.R. Cameira, F. Montoya, M. Salman, and L.S. Pereira. Estimating the lengths of crop growth stages to define the crop coefficient curves using growing degree days (gdd): Application of the revised fao56 guidelines. *Agricultural Water Management*, 319:109758, 2025.
- [88] B. Parent, M. Leclerc, S. Lacube, M.A. Semenov, C. Welcker, P. Martre, and F. Tardieu. Maize yields over europe may increase in spite of climate change, with an appropriate use of the genetic variability of flowering time. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(42):10642–10647, 2018.
- [89] B. Parent and F. Tardieu. Temperature responses of developmental processes have not been affected by breeding in different ecological areas for 17 crop species. *New Phytologist*, 194(3):760–774, March 2012.
- [90] B. Park, Y. Kim, S. Min, and E. Lim. Anthropogenic and natural contributions to the lengthening of the summer season in the northern hemisphere. *Journal of Climate*, 31(17):6803 – 6819, 2018.
- [91] J.S. Park, S. Hong, J. Go, M.-G. Seok, H. Lee, and G. Yi. Tracing the global spread of maize (*zea mays* l.) through plastome analysis of landraces. *BMC Plant Biology*, 26(1), November 2025.
- [92] P.S. Parker, J.S. Shonkwiler, and J. Aurbacher. Cause and consequence in maize planting dates in germany. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 203(3):227–240, 2016.
- [93] J.H. Patel and M.P. Oza. Deriving crop calendar using ndvi time-series. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XL-8:869–873, 2014.
- [94] D.A. Perala. Predicting red pine shoot growth using growing degree days. *Forest Science*, 31(4):913–925, December 1985.
- [95] A.A. Pinto, C. Zerbato, and G. de Souza Rolim. A machine learning models approach and remote sensing to forecast yield in corn with based cumulative growth degree days. *Theoretical and Applied Climatology*, 155(8):7285–7294, June 2024.

- [96] G.M. Poggi, M. Vignudelli, F. Di Cesare, and F. Ventura. Alternative modelling approaches significantly differ in simulating summer crops phenology in mediterranean europe. *International Journal of Biometeorology*, 70(1), January 2026.
- [97] H. Poorter, K.J. Niklas, P.B. Reich, J. Oleksyn, P. Poot, and L. Mommer. Biomass allocation to leaves, stems and roots: meta-analyses of interspecific variation and environmental control. *New Phytologist*, 193(1):30–50, 2012.
- [98] F.T. Portmann, S. Siebert, and P. Döll. Mirca2000—global monthly irrigated and rainfed crop areas around the year 2000: A new high-resolution data set for agricultural and hydrological modeling. *Global Biogeochemical Cycles*, 24(1), 2010.
- [99] J.A. Powell and J.A. Logan. Insect seasonality: circle map analysis of temperature-driven life cycles. *Theoretical Population Biology*, 67(3):161–179, May 2005.
- [100] R. Rafique, T. Ahmad, M.A. Khan, M. Ahmed, and G. Hoogenboom. Developing a simple and efficient modeling solution for predicting key phenological stages of table grapes in a non-traditional viticulture zone in south asia. *International Journal of Biometeorology*, 68(8):1587–1601, May 2024.
- [101] P. Ranum, J.P. Peña-Rosas, and M.N. Garcia-Casal. Global maize production, utilization, and consumption. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1312(1):105–112, 2014.
- [102] K.D. Rausch and R.L. Belyea. The future of coproducts from corn processing. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, 128(1):047–086, 2006.
- [103] F. Recknagel. Cyberinfrastructure for sourcing and processing ecological data. *Ecological Informatics*, 75:102039, 2023.
- [104] J. Régnière and J.A. Powell. *Animal Life Cycle Models (Poikilotherms)*, pages 295–316. Springer Netherlands, Dordrecht, 2013.
- [105] P. Revilla, M.L. Alves, V. Andelković, C. Balconi, I. Dinis, P. Mendes-Moreira, R. Redaelli, J.I. Ruiz de Galarreta, M.C. Vaz Patto, S. Žilić, and R.A. Malvar. Traditional foods from maize (*zea mays* l.) in europe. *Frontiers in Nutrition*, 8, 2022.
- [106] A.D. Richardson. Phenocam: An evolving, open-source tool to study the temporal and spatial variability of ecosystem-scale phenology. *Agricultural and Forest Meteorology*, 342:109751, 2023.
- [107] A.D. Richardson, T.F. Keenan, M. Migliavacca, Y. Ryu, O. Sonnentag, and M. Toomey. Climate change, phenology, and phenological control of vegetation feedbacks to the climate system. *Agricultural and Forest Meteorology*, 169:156–173, 2013.
- [108] J.L. Rocha-Arroyo, S. Salazar-García, A.E. Bárcenas-Ortega, I.J.L. González-Durán, and L.E. Cossio-Vargas. Fenología del aguacate “Hass” en Michoacán. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 2(3):303–316, 2011.

- [109] W.J. Sacks, D. Deryng, J.A. Foley, and N. Ramankutty. Crop planting dates: an analysis of global patterns. *Global Ecology and Biogeography*, 19(5):607–620, August 2010.
- [110] W.J. Sacks and C.J. Kucharik. Crop management and phenology trends in the u.s. corn belt: Impacts on yields, evapotranspiration and energy balance. *Agricultural and Forest Meteorology*, 151(7):882–894, July 2011.
- [111] Q. Shi, T. Pan, D. Lu, H. Li, and Z. Chai. Bpum: A bayesian probabilistic updating model applied to early crop identification. *Journal of Remote Sensing*, 5, January 2025.
- [112] K.R. Shivanna. Climate change and its impact on biodiversity and human welfare. *Proceedings of the Indian National Science Academy*, 88(2):160–171, May 2022.
- [113] M.G. Simpson. Chapater 9: Plant morphology. In M.G. Simpson, editor, *Plant Systematics (Second Edition)*, pages 451–513. Academic Press, San Diego, second edition edition, 2010.
- [114] T.R. Sinclair and W.I. Park. Inadequacy of the liebigh limiting-factor paradigm for explaining varying crop yields. *Agronomy Journal*, 85(3):742–746, 1993.
- [115] A.A. Sokan-Adeaga, S.A. Salami, D.O. Bolade, M. Aledeh, M.A. Sokan-Adeaga, O.E. Amubieya, S.A. Kehinde, M. Farzadkia, G.M. Ashraf, and E. Hoseinzadeh. Utilization of local corn (zea mays) wastes for bioethanol production by separate hydrolysis and fermentation. *Journal of Hazardous Materials Advances*, 15:100447, 2024.
- [116] C. Sprengel. Von den substanzen der ackerkrume und des untergrundes. *Journal for Technische and Okonomische Chemie*, 2:397–421, 1828.
- [117] S.A. Staggenborg, D.L. Fjell, D.L. Devlin, W.B. Gordon, L.D. Maddux, and B.H. Marsh. Selecting optimum planting dates and plant populations for dryland corn in kansas. *Journal of Production Agriculture*, 12(1):85–90, 1999.
- [118] E. Stehfest, Heistermann, Joerg A. Priess, Dennis S. Ojima, and Joseph Alcamo. Simulation of global crop production with the ecosystem model daycent. *Ecological Modelling*, 209(2):203–219, 2007.
- [119] P. Su, A. Zhang, J. Wang, and W. Xu. Plausible maize planting distribution under future global change scenarios. *Field Crops Research*, 302:109079, 2023.
- [120] B. Sánchez, A. Rasmussen, and J.R. Porter. Temperatures and the growth and development of maize and rice: a review. *Global Change Biology*, 20(2):408–417, 2014.
- [121] S.A. Tanumihardjo, L. McCulley, R. Roh, S. Lopez-Ridaura, N. Palacios-Rojas, and N.S. Gunaratna. Maize agro-food systems to ensure food and nutrition security in reference to the sustainable development goals. *Global Food Security*, 25:100327, 2020.

- [122] M. Tarascio, L. Brancaleoni, A. Cazzavillan, M. Cutini, R. Gerdol, and T. Abeli. Photo-period–temperature interactions in a changing climate: A review of plant phenological responses. *Journal of Biogeography*, 53(1):e70113, 2026. e70113 7724405.
- [123] B. Templ, E. Koch, K. Bolmgren, M. Ungersböck, A. Paul, H. Scheifinger, T. Rutishauer, M. Busto, F.-M. Chmielewski, L. Hájková, S. Hodzić, F. Kaspar, B. Pietragalla, R. Romero-Fresneda, A. Tolvanen, V. Vučetić, K. Zimmermann, and A. Zust. Pan european phenological database (pep725): a single point of access for european data. *International Journal of Biometeorology*, 62(6):1109–1113, February 2018.
- [124] R. Thompson and R.M. Clark. Spatio-temporal modelling and assessment of within-species phenological variability using thermal time methods. *International Journal of Biometeorology*, 50(5):312–322, February 2006.
- [125] J.H. Thornley and I.R. Johnson. *Plant and crop modelling*. Oxford University Press, 1990.
- [126] Henri E. Z. Tonnang, Dan Makumbi, and Peter Craufurd. Methodological approach for predicting and mapping the phenological adaptation of tropical maize (zea mays l.) using multi-environment trials. *Plant Methods*, 14(1), December 2018.
- [127] K.E. Trenberth. What are the seasons? *Bulletin of the American Meteorological Society*, 64(11):1276 – 1282, 1983.
- [128] R. Tsimba, G.O. Edmeades, J.P. Millner, and P.D. Kemp. The effect of planting date on maize: Phenology, thermal time durations and growth rates in a cool temperate climate. *Field Crops Research*, 150:145–155, August 2013.
- [129] L. G. J. van Bussel, E. Stehfest, S. Siebert, C. Müller, and F. Ewert. Simulation of the phenological development of wheat and maize at the global scale. *Global Ecology and Biogeography*, 24(9):1018–1029, July 2015.
- [130] P.A.J. van Oort and S.J. Zwart. Impacts of climate change on rice production in africa and causes of simulated yield changes. *Global Change Biology*, 24(3):1029–1045, December 2017.
- [131] N. Verdugo-Vásquez, C. Pañitrur-De la Fuente, and S. Ortega-Farías. Model development to predict phenological scale of table grapes (cvs. thompson, crimson and superior seedless and red globe) using growing degree days. *OENO One*, 51(3), Sep. 2017.
- [132] M. Viswanathan, A. Scheidegger, T. Streck, S. Gayler, and T.K.D. Weber. Bayesian multi-level calibration of a process-based maize phenology model. *Ecological Modelling*, 474:110154, December 2022.
- [133] M. Viswanathan, T. K. D. Weber, S. Gayler, J. Mai, and T. Streck. A bayesian sequential updating approach to predict phenology of silage maize. *Biogeosciences*, 19(8):2187–2209, 2022.

- [134] P. E. Waggoner and W. A. Norvell. Fitting the law of the minimum to fertilizer applications and crop yields. *Agronomy Journal*, 71(2):352–354, 1979.
- [135] K. Waha, L.G.J. van Bussel, C. Müller, and A. Bondeau. Climate-driven simulation of global crop sowing dates. *Global Ecology and Biogeography*, 21(2):247–259, May 2011.
- [136] C.-H. Wang. Farming methods effects on the soil fertility and crop production under a rice-vegetables cropping sequences. *Journal of Plant Nutrition*, 37(9):1498–1513, 2014.
- [137] J. Wang, Y. Guan, L. Wu, X. Guan, W. Cai, J. Huang, W. Dong, and B. Zhang. Changing lengths of the four seasons by global warming. *Geophysical Research Letters*, 48(6):e2020GL091753, 2021. e2020GL091753 2020GL091753.
- [138] J. Wang, L. Zhao, B.-Z. Wang, F. Mo, N. Wang, S.-T. Liu, Y. Song, A.-T. Ren, F.-J. Mei, Y. Wang, Q. Lu, and Y.-C. Xiong. Plastic film mulching ensures maize climate resilience: A perspective of temperature suitability and optimal sowing period window. *Soil and Tillage Research*, 252:106611, October 2025.
- [139] A.K. Whitcraft, I. Becker-Reshef, and C.O. Justice. Agricultural growing season calendars derived from modis surface reflectance. *International Journal of Digital Earth*, 8(3):173–197, 2015.
- [140] J.A. Winkler, A.B. Cinnerich, S.D. Ddumba, D. Doubler, J. Nikolic, Perdinan, A.M. Pollyea, D.R. Young, and C. Zavalloni. 2.04: Understanding the impacts of climate on perennial crops. In Roger A. Pielke, editor, *Climate Vulnerability*, pages 37–49. Academic Press, Oxford, 2013.
- [141] L. Wu, Y. Feng, L. and Zhang, J. Gao, and J. Wang. Comparison of five wheat models simulating phenology under different sowing dates and varieties. *Agronomy Journal*, 109(4):1280–1293, 2017.
- [142] C. Yang, N. Lei, C. Menz, A. Ceglar, J.A. Torres-Matallana, S. Li, Y. Jiang, X. Tan, L. Tao, F. He, S. Li, B. Liu, F. Yang, H. Fraga, and J.A. Santos. Regional uncertainty analysis between crop phenology model structures and optimal parameters. *Agricultural and Forest Meteorology*, 355:110137, August 2024.
- [143] H. Yang, S. Ranjitkar, W. Xu, L. Han, J. Yang, L. Wu, and J. Xu. Crop-climate model in support of adjusting local ecological calendar in the taxkorgan, eastern pamir plateau. *Climatic Change*, 167(3–4), August 2021.
- [144] H.S Yang, A. Dobermann, J.L Lindquist, D.T. Walters, T.J. Arkebauer, and K.G Cassman. Hybrid-maize—a maize simulation model that combines two crop modeling approaches. *Field Crops Research*, 87(2–3):131–154, May 2004.
- [145] N. Yang, Y. Wang, X. Liu, M. Jin, M. Vallebuena-Estrada, E. Calfee, L. Chen, B.P. Dilkes, S. Gui, X. Fan, T.K. Harper, D.J. Kennett, W. Li, Y. Lu, J. Ding, Z. Chen, J. Luo, S. Mambakkam, M. Menon, S. Snodgrass, C. Veller, S. Wu, S. Wu, L. Zhuo,

- Y. Xiao, X. Yang, M.C. Stitzer, D. Runcie, J. Yan, and J. Ross-Ibarra. Two teosintes made modern maize. *Science*, 382(6674):eadg8940, 2023.
- [146] S. Yang, J. Logan, and D.L. Coffey. Mathematical formulae for calculating the base temperature for growing degree days. *Agricultural and Forest Meteorology*, 74(1):61–74, 1995.
- [147] M. Yaseen, S.E. Saqib, F. Zulfiqar, S. Ali, and S. Visetnoi. Farmers’ decisions under climate change: A field level empirical investigation of climate risk management strategies. *Sustainable Futures*, 10:101390, 2025.
- [148] Q.-J. Zhang, D.-L. Wu, Y.-C. Zhu, C. Liu, and D.-S. Yang. A long-term dataset of maize phenology observations from agrometeorological stations in northeast china (1981–2024). *Scientific Data*, 12(1), November 2025.
- [149] Y. Zhang, J. Liu, L. Guan, D. Fan, F. Xia, A. Wang, Y. Bao, and Y. Xu. By-products of zeamays l.: A promising source of medicinal properties with phytochemistry and pharmacological activities: A comprehensive review. *Chemistry & Biodiversity*, 20(3):e202200940, 2023.
- [150] G. Zhou and Q. Wang. A new nonlinear method for calculating growing degree days. *Scientific Reports*, 8(1), July 2018.
- [151] L. Zhou, X. Han, Q. Yang, H. Feng, and K.H.M. Siddique. Optimizing sowing date to mitigate loss of growing degree days and enhance crop water productivity of groundwater-irrigated spring maize. *Agricultural Water Management*, 305:109097, December 2024.
- [152] G. Zhu, Z. Liu, S. Qiao, Z. Zhang, Q. Huang, Z. Su, and X. Yang. How could observed sowing dates contribute to maize potential yield under climate change in northeast china based on apsim model. *European Journal of Agronomy*, 136:126511, May 2022.