



UNL. FACULTAD DE
INGENIERÍA QUÍMICA

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

Optimización y Aprendizaje Automático II

Isaías Ibañez

Liliana Forzani

Optimización convexa

En esta sección nos enfocaremos en los conceptos fundamentales que sustentan la optimización convexa, una rama central en la teoría y práctica de la optimización. A partir de las ideas presentadas en la Sección 1, donde destacamos el rol de la convexidad, ahora desarrollaremos con mayor profundidad las nociones teóricas que permiten formular y analizar este tipo de problemas.

Antes, veamos la Figura 1.2.1, la cual muestra la ventaja de trabajar con problemas convexos. Allí, se puede visualizar el comportamiento de las iteraciones de un método de optimización que busca aproximarse al punto óptimo (en este caso, el mínimo global). ¿Qué se observa?




Figura 1.2.1: Comportamiento de un método iterativo en un problema de optimización.

Notación

En $\mathbb{R}^p$ consideraremos el producto interno usual

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_2 := \mathbf{x}^\top \mathbf{y} = \sum_{i=1}^p x_i y_i,$$

y escribiremos $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_2$ o $\mathbf{x}^\top \mathbf{y}$ según conveniencia. La norma ℓ_2 correspondiente es

$$\|\mathbf{x}\|_2 := (\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{1/2}.$$

Denotaremos además $B(\mathbf{x}, r) := \{\mathbf{y} \mid \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2 < r\}$ la bola abierta de centro $\mathbf{x}$ y radio r .

Asimismo, recordemos que una matriz A se dice *semidefinida positiva* ($A \succeq 0$), si verifica

$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$, mientras que se dice *definida positiva* ($A \succ 0$) si la desigualdad es estricta. De manera análoga, se definen las matrices semidefinidas negativas ($A \preceq 0$) y definidas negativas ($A \prec 0$).

Al conjunto de matrices simétricas lo denotaremos $\mathbf{S}^p$, mientras que con $\mathbf{S}_+^p$ y $\mathbf{S}_{++}^p$ nos referiremos al conjunto de matrices simétricas semidefinidas positivas y simétricas definidas positivas, respectivamente.

Por último, así como escribimos $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ para referirnos a un conjunto de igualdades de la forma $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} = b_i$, vamos a denotar $\mathbf{A} \mathbf{x} \preceq \mathbf{b}$ al conjunto de desigualdades $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} \leq b_i$.

I | Geometría de conjuntos

Una gran parte del éxito de los métodos de optimización convexa radica en una idea geométrica simple pero poderosa: la convexidad del conjunto factible Ω . Un conjunto es convexo es aquel en el cual, si tomamos dos puntos cualesquiera, el segmento que los une queda completamente contenido dentro del conjunto. Esta propiedad, que a primera vista parece modesta, contribuye a garantizar que los métodos iterativos puedan avanzar progresivamente dentro del conjunto factible sin salir de él; es decir, facilita la construcción de puntos factibles.

Conceptos básicos

Introduciremos tres tipos fundamentales de conjuntos que aparecen en optimización: conjuntos afines, conjuntos convexos y conos. Antes, es necesario recordar la forma paramétrica de rectas y segmentos de recta.

Sean $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ dos puntos en $\mathbb{R}^p$. La recta que pasa por $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ puede describirse paramétricamente (con parámetro real θ) mediante la siguiente ecuación:

$$\mathbf{y} = \theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) \mathbf{x}_2 \quad \theta \in \mathbb{R}. \quad (1.2.1)$$

La expresión (1.2.1) se conoce como *combinación afín* de $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$. En cambio, si restringimos el valor del parámetro a $0 \leq \theta \leq 1$, obtenemos una *combinación convexa*, que describe el segmento de recta (cerrado) entre ambos puntos, con $\mathbf{x}_2$ como punto inicial. Ambos conceptos pueden generalizarse a un número finito de puntos, como veremos más adelante.

Una expresión alternativa a (1.2.1) para la ecuación del segmento de recta es

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}_2 + \theta(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) \quad \theta \in [0, 1],$$

la cual expresa $\mathbf{y}$ en términos del punto inicial $\mathbf{x}_2$ y la dirección $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$. Además, podemos interpretar a θ como la fracción del camino desde $\mathbf{x}_2$ hasta $\mathbf{x}_1$ donde se encuentra $\mathbf{y}$.

En base a las ideas geométricas introducidas, estamos en condiciones de presentar las definiciones fundamentales de conjuntos afines, conjuntos convexos, conos y otros conceptos relacionados.




Figura 1.2.2: Combinación convexa entre dos puntos $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$.

Definición 1.2.1 (Conjunto afín). Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ es *afín* si la recta que pasa por cualquier par de puntos distintos en C está contenida en C . Es decir, si se verifica

$$\theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) \mathbf{x}_2 \in C \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in C, \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

i

Dado $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k\} \subset \mathbb{R}^p$, se denomina *combinación afín* de éstos a todo punto de la forma

$$\theta_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \theta_k \mathbf{x}_k, \quad \sum_{i=1}^k \theta_i = 1.$$

Es fácil ver que un conjunto afín C contiene todas las combinaciones afines de sus puntos. 1

Dado un conjunto afín C y un punto $\mathbf{x}_0 \in C$, el conjunto

$$V := C - \mathbf{x}_0 = \{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \mid \mathbf{x} \in C\}$$

es un subespacio vectorial que no depende de la elección de $\mathbf{x}_0$. 2 Definimos la *dimensión* de C como $\dim C := \dim V$.

¿Cuáles son los subconjuntos afines de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$? Grafique algunos ejemplos y, para cada uno de ellos, represente el subespacio V asociado y determine la dimensión del conjunto afín.

Ejemplo 1.2.2: Conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales

Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. El conjunto solución es

$$S := \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{b}\}.$$

Para todo $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in S$ y cualquier $\theta \in \mathbb{R}$, se verifica

$$A(\theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) \mathbf{x}_2) = \theta A \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) A \mathbf{x}_2 = \theta \mathbf{b} + (1 - \theta) \mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Por lo tanto, $\theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) \mathbf{x}_2 \in S$, lo cual implica que S es un conjunto afín.

Definición 1.2.3 (Conjunto convexo). Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ es *convexo* si el segmento de recta entre cualquier par de puntos distintos en C está contenido en C . Es decir, si se verifica

$$\theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) \mathbf{x}_2 \in C \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in C, \forall \theta \in [0, 1].$$



Figura 1.2.3: Ejemplo de un conjunto convexo y otro no convexo. En este último, el segmento que une dos puntos del conjunto puede no estar contenido en él.



Llamamos *combinación convexa* a un punto de la forma

$$\theta_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \theta_k \mathbf{x}_k, \quad \sum_{i=1}^k \theta_i = 1, \theta_i \geq 0.$$

Como en el caso de los conjuntos afines, se puede demostrar que un conjunto es convexo si y solo si contiene todas las combinaciones convexas de sus puntos. 🍷¹

Por otro lado, observar que, a diferencia de una combinación afín, una combinación convexa requiere la no negatividad de los coeficientes θ_i , lo cual significa que puede ser interpretada como un *promedio ponderado* de los puntos $\mathbf{x}_i$.

🔗 Todo conjunto afín es convexo. ¿Por qué?

Ejemplo 1.2.4: Combinación convexa en un problema de decisión

Una empresa diseñó internamente tres posibles estrategias para la oferta de un nuevo producto. Para cada estrategia, realizó un análisis que le permitió estimar el nivel de satisfacción promedio del usuario (de 0 a 10) y el costo de implementación mensual (en miles de dólares),


obteniendo:

- Estrategia A (satisfacción y costo altos): (8.5, 25).
- Estrategia B (satisfacción y costo medios): (6.75, 17.5).
- Estrategia C (satisfacción y costo bajos): (4, 12).

En lugar de implementar una única estrategia, la empresa decidió realizar una inversión de manera porcentual, destinando el 60 % del presupuesto a la estrategia A, el 25 % a la B y el 15 % restante a la C. El costo y la satisfacción esperada están determinados por la siguiente combinación convexa:

$$\frac{3}{5} \cdot (8.5, 25) + \frac{1}{4} \cdot (6.75, 17.5) + \frac{3}{20} \cdot (4, 12) = (7.3875, 21.175).$$

El resultado obtenido es (7.39, 21.18).



Definición 1.2.5 (Cono). Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ se denomina *cono* si verifica

$$\theta \mathbf{x} \in C \quad \forall \mathbf{x} \in C, \forall \theta \geq 0.$$



Llamamos *combinación cónica* a un punto de la forma

$$\theta_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \theta_k \mathbf{x}_j, \quad \theta_i \geq 0.$$

A diferencia de los conjuntos afines y convexos, la propiedad de ser cono por sí sola no garantiza estabilidad bajo combinaciones con varios términos. En particular, un cono solo es cerrado por multiplicación por escalares no negativos, pero no necesariamente por suma. Por ello, para asegurar la estabilidad bajo combinaciones cónicas es necesario considerar la noción de cono convexo.

Los conos convexos se definen mediante dos condiciones: ser un cono y ser un conjunto convexo. Sin embargo, ambas condiciones pueden reunirse en una única propiedad, tal como lo indica la siguiente actividad:

Muestre que C es un cono convexo si y solo si

$$\theta_1 \mathbf{x}_1 + \theta_2 \mathbf{x}_2 \in C \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in C, \forall \theta_1, \theta_2 \geq 0.$$

Luego, esta caracterización permite probar fácilmente que un conjunto C es un cono convexo si y solo si contiene todas las combinaciones cónicas de sus puntos. 1




Figura 1.2.4: Ejemplo de un cono convexo y otro no convexo. En el caso de cono convexo, toda combinación lineal entre pares de puntos queda contenida en el cono.

Ejemplo 1.2.6: De un cono no convexo a un cono convexo

En $\mathbb{R}^3$, el conjunto

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}\}$$


es un cono, pero no es convexo. En la figura se muestran un par de puntos que pertenecen a C , mientras que el segmento entre ellos no. La condición de la Definición 1.2.5 de cono es inmediata:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \theta z = \sqrt{(\theta x)^2 + (\theta y)^2} \quad \forall \theta \geq 0.$$

Ahora bien, si agregamos los segmentos entre pares de puntos, obtenemos el conjunto

$$\tilde{C} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\},$$

el cual sí es un cono convexo.



Ejemplo 1.2.7: Cono de segundo orden

El cono convexo $\tilde{C}$ del ejemplo anterior puede ser escrito en términos de la norma euclídea en $\mathbb{R}^2$ como

$$\tilde{C} = \{(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \mid \|\mathbf{x}\|_2 \leq t\}.$$

Vamos a generalizar este concepto a cualquier espacio euclídeo $\mathbb{R}^p$: se define el *cono de segundo orden* como

$$\mathcal{Q}^{p+1} := \{(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^{p+1} \mid \|\mathbf{x}\|_2 \leq t\}. \quad (1.2.2)$$

La condición en (1.2.2) puede ser escrita matricialmente como

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x} & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ t \end{pmatrix} \leq 0,$$

razón por la cual $\mathcal{Q}^{p+1}$ también se conoce como *cono cuadrático*. También es frecuente encontrar las denominaciones *cono de Lorentz* y *cono de helado*.




Figura 1.2.5: Cono de segundo orden $\mathcal{Q}^3$ asociado a la norma euclídea en $\mathbb{R}^2$.

Envoltentes

A cada una de las clases de conjuntos introducidas anteriormente puede asociarse una envoltente, entendida como el menor conjunto de esa clase que contiene a un conjunto dado.

Sea $C \subset \mathbb{R}^p$. Se definen:

- La *envoltente afín* es el conjunto de todas las combinaciones afines de puntos en C . Denotamos

$$\text{aff } C := \left\{ \theta_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \theta_k \mathbf{x}_k \mid \mathbf{x}_i \in C, \sum_{i=1}^k \theta_i = 1 \right\}.$$

- La *envoltente convexa* es el conjunto de todas las combinaciones convexas de puntos en C . Denotamos


$$\text{conv } C := \left\{ \theta_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \theta_k \mathbf{x}_k \mid \mathbf{x}_i \in C, \theta_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \theta_i = 1 \right\}.$$

Como su nombre lo indica, la envoltente convexa es siempre un conjunto convexo.  ⁴ Más aún, $\text{conv } C$ es el conjunto convexo más pequeño que contiene a C ; esto es, si E es cualquier conjunto convexo que contiene a C , entonces $\text{conv } C \subset E$.

- La *envoltente cónica* es el conjunto de todas las combinaciones cónicas de puntos en C . Denotamos

$$\text{cone } C := \{ \theta_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \theta_k \mathbf{x}_k \mid \mathbf{x}_i \in C, \theta_i \geq 0 \}.$$

La envoltente cónica es siempre un conjunto convexo.  ⁴ Más aún, $\text{cone } C$ es el cono convexo más pequeño que contiene a C .



Del concepto de envolvente afín se desprenden dos nociones que, si bien no son muy comunes, serán útiles más adelante:

- La *dimensión afín* de C es la dimensión de su envolvente afín $\text{aff } C$.
- El *interior relativo* de C respecto a $\text{aff } C$ se define como

$$\text{relint } C := \{\mathbf{x} \in C \mid \exists r > 0 : B(\mathbf{x}, r) \cap \text{aff } C \subset C\}.$$


Ejemplo 1.2.8: Interior relativo de un cuadrado en $\mathbb{R}^3$

Sea $C = [-1, 1] \times [-1, 1] \times \{1\} \subset \mathbb{R}^3$. La envolvente afín de C es un plano:

$$\text{aff } C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 1\}.$$

Como consecuencia, a pesar de que C tiene interior vacío, su interior relativo es

$$\text{relint } C = (-1, 1) \times (-1, 1) \times \{1\}.$$



Operaciones que preservan convexidad

En esta sección describiremos algunas operaciones que preservan la convexidad de conjuntos y que nos permiten construir conjuntos convexos a partir de otros. Estas operaciones, junto con los ejemplos simples descritos anteriormente, forman un cálculo de conjuntos convexos que es útil para analizar convexidad.

- **Intersección.** La intersección de cualquier número de conjuntos convexos es convexo.
- **Funciones afines.** Si $S \subset \mathbb{R}^p$ es convexo y $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una función afín, entonces, la imagen de S bajo f , $f(S) := \{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in S\}$, es convexa. De manera similar, si $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^p$ es una función afín¹, la imagen inversa de S bajo f , $f^{-1}(S) := \{\mathbf{x} \mid f(\mathbf{x}) \in S\}$, es convexa.

¹ $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ es *afín* si es de la forma $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, con $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

■ **Suma.** Si S_1 y S_2 son conjuntos convexos de $\mathbb{R}^p$, entonces

$$S_1 + S_2 := \{\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \mid \mathbf{x}_1 \in S_1, \mathbf{x}_2 \in S_2\}$$

es un conjunto convexo.

✍ Verifique que las operaciones indicadas preservan la convexidad.

Ejemplo 1.2.9: Elipsoide

Sea $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^2$ y $P \in \mathbf{S}_{++}^2$. El *elipsoide* definido como

$$E := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top P^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \leq 1\}$$

es la imagen del disco unitario $\bar{B}(\mathbf{0}, 1) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{x}\|_2 \leq 1\}$ bajo la transformación afín $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$f(\mathbf{x}) = P^{1/2}\mathbf{x} + \mathbf{x}_0.$$

En efecto, se verifica


$$(f(\mathbf{x}) - \mathbf{x}_0)^\top P^{-1}(f(\mathbf{x}) - \mathbf{x}_0) = (P^{1/2}\mathbf{x})^\top P^{-1}(P^{1/2}\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2^2 \leq 1.$$

En consecuencia, dado que $\bar{B}(\mathbf{0}, 1)$ es un conjunto convexo (la verificación es sencilla), podemos afirmar que E también es un conjunto convexo.

✍ En la figura se muestra la imagen del disco unitario $\bar{B}(\mathbf{0}, 1)$ bajo la transformación afín

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Obtenga la expresión cuadrática que define el elipsoide $E = f(\bar{B}(\mathbf{0}, 1))$.



Conjuntos convexos notables

Vamos a describir algunos conjuntos convexos importantes. Pero primero veamos algunos ejemplos sencillos y analicemos si, además de ser convexos, son conjuntos afines y/o conos.

✍ Indicar si los siguientes conjuntos convexos son afines y/o conos.

- $\emptyset$, $\mathbb{R}^p$ y $\{\mathbf{0}\}$.
- Conjunto unitario $\{\mathbf{x}_0\}$ con $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$.

- Segmento de recta.
- Recta $\{\theta \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \theta \in \mathbb{R}\}$.
- Recta $\{\mathbf{x}_0 + \theta \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}, \theta \in \mathbb{R}\}$.
- Rayo $\{\theta \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \theta \in \mathbb{R}_0^+\}$.
- Rayo $\{\mathbf{x}_0 + \theta \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}, \theta \in \mathbb{R}_0^+\}$.
- Subespacio.

Hiperplanos y semiespacios

Un *hiperplano* en $\mathbb{R}^p$ es un conjunto de la forma

$$\{\mathbf{x} \mid \mathbf{a}^\top \mathbf{x} = b\}, \quad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^p, \mathbf{a} \neq \mathbf{0}, b \in \mathbb{R}.$$




Figura 1.2.7: Hiperplano con vector normal $\mathbf{a}$.

Algunas características son:

- El vector $\mathbf{a}$ es *normal* al hiperplano. Dado un punto $\mathbf{x}_0$ del hiperplano, se verifica $\mathbf{a}^\top (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0$ para cualquier otro punto $\mathbf{x}$ del hiperplano.
- El escalar b determina el desplazamiento del hiperplano respecto del origen. De hecho, probaremos más adelante que la distancia del hiperplano al origen es $b/\|\mathbf{a}\|_2$.
- Un hiperplano divide a $\mathbb{R}^p$ en dos *semiespacios*. Un semiespacio cerrado es un conjunto de la forma

$$\{\mathbf{x} \mid \mathbf{a}^\top \mathbf{x} \leq b\}, \quad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^p, \mathbf{a} \neq \mathbf{0}, b \in \mathbb{R}.$$

- ✍ • ¿Qué es un hiperplano en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$? Proponga ejemplos.
- Un hiperplano es un conjunto afín. ¿Por qué?

Bolas

Una *bola cerrada* en $\mathbb{R}^p$ es un conjunto de la forma

$$\bar{B}(\mathbf{x}_0, r) := \{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2 \leq r\}.$$

Observar que, si la desigualdad es estricta, se obtiene la bola abierta $B(\mathbf{x}_0, r)$.

✍ Verifique que toda bola en $\mathbb{R}^p$, abierta o cerrada, es un conjunto convexo.

Poliedros

Un *poliedro* en $\mathbb{R}^p$ es el conjunto solución de un número finito de igualdades y desigualdades lineales. Es decir, es de la forma

$$\mathcal{P} := \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} \preceq \mathbf{b}, C\mathbf{x} = \mathbf{d}\}, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times p}, C \in \mathbb{R}^{m \times p}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^r, \mathbf{d} \in \mathbb{R}^m.$$

Las igualdades y desigualdades son de la forma $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} \leq b_i$ y $\mathbf{c}_j^\top \mathbf{x} = d_j$, respectivamente. La razón por la cual un poliedro es un conjunto convexo es la siguiente:

Un poliedro es la intersección de un número finito de semiespacios e hiperplanos.




Figura 1.2.8: Un poliedro generado por la intersección de 5 semiespacios.

Ejemplo 1.2.10: Símplex

El *p-símplex estándar* en $\mathbb{R}^p$ es el conjunto

$$\Delta^{p-1} := \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid \sum_{i=1}^p x_i = 1, x_i \geq 0 (\forall i = 1, \dots, p) \right\}.$$

Es un poliedro, ya que puede expresarse como la intersección del hiperplano definido por $\sum_{i=1}^p x_i = 1$ y los p semiespacios definidos por $x_i \geq 0$, con $i = 1, \dots, p$.




Figura 1.2.9: Δ^2 es el triángulo en $\mathbb{R}^3$ de vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

Conos normales

En muchos problemas de optimización, especialmente aquellos en los que las soluciones están restringidas a un conjunto convexo, es esencial entender cómo se comportan las direcciones «externas» al conjunto en torno a un punto dado. El cono normal es una herramienta geométrica fundamental para describir esas direcciones. Nos permitirá luego expresar condiciones que caracterizan soluciones óptimas a partir de información local del conjunto factible.

Definición 1.2.11 (Cono normal). Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto convexo y $\mathbf{x}_0 \in \Omega$. El *cono normal* de Ω en $\mathbf{x}_0$ se define como

$$N_{\Omega}(\mathbf{x}_0) := \{\mathbf{d} \in \mathbb{R}^p \mid \langle \mathbf{d}, \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \rangle_2 \leq 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega\}.$$

Si bien la expresión $\langle \mathbf{d}, \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \rangle_2$ puede escribirse como $\mathbf{d}^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$, la notación con producto interno permite una rápida interpretación de este concepto. Si usamos la relación $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_2 = \|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2 \cos \alpha$, donde α es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, podemos decir que $\mathbf{d} \in N_{\Omega}(\mathbf{x}_0)$ si se verifica

$$\|\mathbf{d}\|_2 \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2 \cos \alpha \leq 0,$$

con α el ángulo entre los vectores $\mathbf{d}$ y $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$. Esto es cierto si $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$ (ver Figura 1.2.10).




Figura 1.2.10: Interpretación geométrica de las direcciones $\mathbf{d}$ y $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$.

En base a lo descrito, podemos afirmar que:

El cono normal consta de aquellas direcciones que forman un ángulo obtuso o recto con todas las direcciones $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, junto con la dirección nula $\mathbf{d} = \mathbf{0}$.

Para entender esta definición, vamos a ver algunos ejemplos.

Ejemplo 1.2.12: Cono normal en un punto interior

Si $\mathbf{x}_0$ es un punto interior de Ω , el cono normal contiene únicamente el vector cero:

$$N_{\Omega}(\mathbf{x}_0) = \{\mathbf{0}\}.$$

Esto se debe a que $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ puede ser cualquier dirección y, en consecuencia, no es posible que $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ forme un ángulo obtuso o recto con todas las direcciones $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$. En efecto, si $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$, podemos tomar un $\delta > 0$ lo suficientemente pequeño para que $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \delta \mathbf{d} \in \Omega$, tal que

$$\langle \mathbf{d}, \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \rangle_2 = \langle \mathbf{d}, \delta \mathbf{d} \rangle_2 = \delta \|\mathbf{d}\|_2^2 \geq 0.$$

Ejemplo 1.2.13: Cono normal en un punto de un hiperplano


Sea $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, y $b \in \mathbb{R}$. Consideramos

$$\Omega := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid \mathbf{a}^\top \mathbf{x} = b\}.$$

El cono normal en un punto $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ es la recta con dirección $\mathbf{a}$. Esto es,

$$N_{\Omega}(\mathbf{x}_0) = \{\lambda \mathbf{a} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

La prueba queda como ejercicio.  8



Ejemplo 1.2.14: Cono normal en un punto de un semiespacio


Sean $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, y $b \in \mathbb{R}$. Consideramos

$$\Omega := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid \mathbf{a}^\top \mathbf{x} \leq b\}.$$

- Si $\mathbf{x}_0$ está en el interior de Ω , el cono normal es $N_{\Omega}(\mathbf{x}_0) = \{\mathbf{0}\}$.
- Si $\mathbf{x}_0$ está en la frontera de Ω , resulta

$$N_{\Omega}(\mathbf{x}_0) = \{\lambda \mathbf{a} \mid \lambda \in \mathbb{R}_0^+\}.$$

La diferencia con el ejemplo anterior radica en que ahora el cono normal es una semirrecta.



Ejemplo 1.2.15: Cono normal en un punto de la intersección de dos semiespacios


Sean $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in \mathbb{R}^p$ no nulos, y $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$. Consideramos

$$\Omega := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid \mathbf{a}_1^\top \mathbf{x} \leq b_1 \text{ y } \mathbf{a}_2^\top \mathbf{x} \leq b_2\}.$$

- Si $\mathbf{x}_0$ está en el interior de Ω o en la frontera de solo uno de los semiespacios, el cono normal resulta del ejemplo anterior.
- Si $\mathbf{x}_0$ está en la intersección de ambas fronteras, el cono normal es la envolvente cónica de las direcciones $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$. Esto es

$$N_\Omega(\mathbf{x}_0) = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}_0^+\}.$$

Probaremos este resultado, generalizado a r semiespacios, en la Sección 4.

**II | Funciones convexas**

Definición 1.2.16 (Función convexa). Una función $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es *convexa* si $\text{dom } f$ es un conjunto convexo y si verifica

$$f(\theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) \mathbf{x}_2) \leq \theta f(\mathbf{x}_1) + (1 - \theta) f(\mathbf{x}_2) \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \text{dom } f, \forall \theta \in [0, 1]. \quad (1.2.3)$$

Si la desigualdad es estricta para $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ y $0 < \theta < 1$, se dice que f es *estrictamente convexa*. Además, se dice que f es *cóncava* (o *estrictamente cóncava*) si $-f$ es convexa (o estrictamente convexa).



Una función afín verifica la igualdad en la definición, por lo que todas las funciones afines (y, por lo tanto, también las lineales) son tanto convexas como cóncavas. Recíprocamente, una función que es tanto convexa como cóncava es siempre una función afín.

Una función es convexa si y solo si, para todo $\mathbf{x} \in \text{dom } f$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^p$, la restricción $g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$ es convexa en su dominio $\{t \mid \mathbf{x} + t\mathbf{v} \in \text{dom } f\}$.

La desigualdad (1.2.3) se puede extender a combinaciones convexas. Es decir, si f es convexa, se cumple

$$f\left(\sum_{i=1}^k \theta_i \mathbf{x}_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \theta_i f(\mathbf{x}_i), \quad \sum_{i=1}^k \theta_i = 1, \theta_i \geq 0.$$

Esta es la versión discreta de la *desigualdad de Jensen*.  16




Figura 1.2.11: Grafo de una función convexa. La desigualdad (1.2.3) significa que el segmento de recta entre los puntos $(\mathbf{x}_1, f(\mathbf{x}_1))$ y $(\mathbf{x}_2, f(\mathbf{x}_2))$ se encuentra por encima de la gráfica de f .

Ejemplo 1.2.17: Función cuadrática de una variable

Vamos a probar la convexidad de la función $f(x) = x^2$. Para $\theta \in [0, 1]$ resulta

$$\begin{aligned} f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) &= (\theta x_1 + (1 - \theta)x_2)^2 \\ &= \theta^2 x_1^2 + 2\theta(1 - \theta)x_1 x_2 + (1 - \theta)^2 x_2^2. \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) - [\theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2)] &= (\theta^2 - \theta)x_1^2 + 2\theta(1 - \theta)x_1 x_2 + (\theta^2 - \theta)x_2^2 \\ &= -\theta(1 - \theta)(x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2) \\ &= -\theta(1 - \theta)(x_1 - x_2)^2 \\ &\leq 0, \end{aligned}$$

lo cual concluye la prueba.

La relación entre conjuntos convexos y funciones convexas es a través del epígrafo: el *epígrafo* de una función $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ se define como

$$\text{epi } f := \{(\mathbf{x}, t) \mid \mathbf{x} \in \text{dom } f, f(\mathbf{x}) \leq t\}.$$




Figura 1.2.12: Epígrafo de una función f .

Es fácil probar ¹² que:

Una función es convexa si y solo si su epígrafo es un conjunto convexo.

De manera análoga, una función es cóncava si y solo si su *hipógrafa* es un conjunto convexo, el cual se define como

$$\text{hypo } f := \{(\mathbf{x}, t) \mid t \leq f(\mathbf{x})\}.$$

Condiciones de convexidad

Probar que una función es convexa utilizando la Definición 1.2.16 puede ser tedioso. Afortunadamente, existen criterios basados en sus derivadas. Estos permiten caracterizar la convexidad en términos del comportamiento local de la función, ya sea a través del gradiente (primera derivada) o de la matriz Hessiana (segunda derivada). Primero, recordemos que:

- El *vector gradiente* $\nabla f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$ se define como

$$\nabla f(\mathbf{x}) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_p}(\mathbf{x}) \right).$$

- La *matriz Hessiana* $\nabla^2 f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^{p \times p}$ se define como

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_p}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_p}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p^2}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}.$$

Importante

Diremos que $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es *diferenciable* si su gradiente ∇f existe en todo su dominio, y que es *dos veces diferenciable* si además su Hessiana $\nabla^2 f$ existe en todo su dominio. En ambos casos, asumimos que dicho dominio es un conjunto abierto.

Cuando una función $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es dos veces diferenciable, la expansión de Taylor nos permite escribir, para $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^p$, la aproximación

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{d}) \approx f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^\top \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{d}.$$

Esta expansión muestra cómo el valor de la función en un punto cercano puede aproximarse mediante el gradiente y la Hessiana, lo que proporciona la base para analizar propiedades locales de la función. A continuación presentaremos, en primer lugar, un lema con propiedades de funciones convexas de una variable, y luego los teoremas que establecen las condiciones de convexidad de primer y segundo orden, basadas en el gradiente y en la matriz Hessiana, respectivamente.

Lema 1.2.18 (Convexidad en una variable). Sea $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Se verifican las siguientes propiedades:

1. Para $a \leq t_1 < t_2 < t_3 \leq b$, se cumple

$$\frac{\varphi(t_2) - \varphi(t_1)}{t_2 - t_1} \leq \frac{\varphi(t_3) - \varphi(t_1)}{t_3 - t_1} \leq \frac{\varphi(t_3) - \varphi(t_2)}{t_3 - t_2}.$$

Es decir, las pendientes de las rectas secantes son no decrecientes.

2. El límite

$$\varphi'_+(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(t_0 + h) - \varphi(t_0)}{h}$$

existe (posiblemente $-\infty$) en todo t_0 . Además,

$$\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + (t - t_0) \varphi'_+(t_0) \quad \forall t \geq t_0.$$

3. Si φ es diferenciable en t_0 , entonces

$$\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + (t - t_0) \varphi'(t_0) \quad \forall t \geq t_0.$$

4. Si φ es dos veces diferenciable en (a, b) , entonces

$$\varphi''(t) \geq 0 \quad \forall t \in (a, b).$$

Demostración. 1. Fijemos $a \leq t_1 < t_2 < t_3 \leq b$. Como φ es convexa, utilizaremos (1.2.3) para t_1 y t_3 con

$$\theta = \frac{t_3 - t_2}{t_3 - t_1} \in [0, 1].$$

Dado que

$$\frac{t_3 - t_2}{t_3 - t_1} t_1 + \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1} t_3 = \frac{t_2(t_3 - t_1)}{t_3 - t_1} = t_2,$$

resulta

$$\varphi(t_2) \leq \frac{t_3 - t_2}{t_3 - t_1} \varphi(t_1) + \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1} \varphi(t_3).$$

Restamos a ambos miembros $\varphi(t_1)$ y reordenamos:

$$\begin{aligned} \varphi(t_2) - \varphi(t_1) &\leq \frac{t_3 - t_2}{t_3 - t_1} \varphi(t_1) + \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1} \varphi(t_3) - \varphi(t_1) \\ \varphi(t_2) - \varphi(t_1) &\leq \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1} (\varphi(t_3) - \varphi(t_1)) \\ \frac{\varphi(t_2) - \varphi(t_1)}{t_2 - t_1} &\leq \frac{\varphi(t_3) - \varphi(t_1)}{t_3 - t_1}. \end{aligned}$$

De manera simétrica se obtiene la otra desigualdad.

2. Dado que $\varphi'_+(t_0)$ es un límite de pendientes de rectas secantes y que, de 1, dichas pendientes son monótonas, podemos afirmar que dicho límite o bien existe o bien es $-\infty$. De hecho, podemos escribir

$$\frac{\varphi(t) - \varphi(t_0)}{t - t_0} \geq \varphi'_+(t_0) \quad \forall t > t_0,$$

lo cual es equivalente a

$$\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + (t - t_0)\varphi'_+(t_0) \quad \forall t \geq t_0.$$

3. En caso de ser φ diferenciable en t_0 , $\varphi'(t_0) = \varphi'_+(t_0)$, de manera que la desigualdad anterior resulta en

$$\varphi(t) \geq \varphi(t_0) + (t - t_0)\varphi'(t_0) \quad \forall t \geq t_0.$$

4. Sea φ es dos veces diferenciable en (a, b) . Para t_0 fijo, consideremos la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(h) := \frac{\varphi(t_0 - h) - 2\varphi(t_0) + \varphi(t_0 + h)}{h^2}.$$

La convexidad de φ implica $g(h) \geq 0$ para todo $h > 0$. En efecto, la no negatividad del numerador resulta de aplicar la desigualdad de Jensen (3) a $\mathbf{x}_1 = t_0 - h$, $\mathbf{x}_2 = t_0$ y $\mathbf{x}_3 = t_0 + h$ con $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 1/3$:

$$\begin{aligned} \varphi(t_0) &\leq \frac{1}{3} (\varphi(t_0 - h) + \varphi(t_0) + \varphi(t_0 + h)) \\ 0 &\leq \varphi(t_0 - h) + \varphi(t_0) + \varphi(t_0 + h) - 3\varphi(t_0) \\ 0 &\leq \varphi(t_0 - h) - 2\varphi(t_0) + \varphi(t_0 + h). \end{aligned}$$

Utilizando el desarrollo de Taylor de φ alrededor de t_0 , es fácil ver que $g(h) \rightarrow \varphi''(t_0)$ cuando $h \rightarrow 0$. Luego, debe ser $\varphi''(t_0) \geq 0$. ■

Teorema 1.2.19 (Condición de primer orden para convexidad). *Sea $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. f es convexa si y solo si $\text{dom } f$ es convexo y*

$$f(\mathbf{x}_2) \geq f(\mathbf{x}_1) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_1), \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \rangle_2 \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \text{dom } f. \quad (1.2.4)$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que f es convexa, fijemos $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \text{dom } f$ y definamos $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\varphi(t) := f(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)), \quad t \in [0, 1].$$

Para $t_1, t_2 \in [0, 1]$ y $\theta \in [0, 1]$, tenemos que

$$\varphi(\theta t_1 + (1 - \theta)t_2) = f(\mathbf{x}_1 + (\theta t_1 + (1 - \theta)t_2)(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)). \quad (1.2.5)$$

En el lado derecho, notemos que

$$\mathbf{x}_1 + (\theta t_1 + (1 - \theta)t_2)(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) = \theta \underbrace{(\mathbf{x}_1 + t_1(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))}_{\mathbf{y}_1} + (1 - \theta) \underbrace{(\mathbf{x}_1 + t_2(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))}_{\mathbf{y}_2}.$$

Denotando $\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_1 + t_i(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)$, tal que $f(\mathbf{y}_i) = \varphi(t_i)$, vamos a reescribir (1.2.5) para poder utilizar la convexidad de f :

$$\begin{aligned} \varphi(\theta t_1 + (1 - \theta)t_2) &= f(\theta \mathbf{y}_1 + (1 - \theta)\mathbf{y}_2) \\ &\leq \theta f(\mathbf{y}_1) + (1 - \theta)f(\mathbf{y}_2) \\ &= \theta \varphi(t_1) + (1 - \theta)\varphi(t_2). \end{aligned}$$

Esto prueba que φ es convexa en $[0, 1]$. Además, la diferenciabilidad de f implica que φ es diferenciable y

$$\varphi'(t) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)), \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \rangle_2.$$

Podemos aplicar el Lema 1.2.18 con $t = 1$ y $t_0 = 0$; resulta

$$\begin{aligned} \varphi(1) &\geq \varphi(0) + \varphi'(0) \\ f(\mathbf{x}_2) &\geq f(\mathbf{x}_1) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_1), \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \rangle_2. \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Supongamos que es cierta la desigualdad (1.2.4) del enunciado y probemos que f es convexa. Sean $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \text{dom } f$ y $\theta \in [0, 1]$, definamos

$$\mathbf{x}_\theta := \theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta)\mathbf{x}_2.$$

Podemos escribir

$$f(\mathbf{x}_i) \geq f(\mathbf{x}_\theta) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_\theta), \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_\theta \rangle_2, \quad i = 1, 2.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \theta f(\mathbf{x}_1) + (1 - \theta)f(\mathbf{x}_2) &\geq \theta \left(f(\mathbf{x}_\theta) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_\theta), \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_\theta \rangle_2 \right) + (1 - \theta) \left(f(\mathbf{x}_\theta) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_\theta), \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_\theta \rangle_2 \right) \\ &= f(\mathbf{x}_\theta) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_\theta), \theta(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_\theta) + (1 - \theta)(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_\theta) \rangle_2 \\ &= f(\mathbf{x}_\theta) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_\theta), \underbrace{\theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta)\mathbf{x}_2}_{\mathbf{x}_\theta} - \mathbf{x}_\theta \rangle_2 \\ &= f(\mathbf{x}_\theta). \end{aligned}$$

Al reemplazar $\mathbf{x}_\theta$ por su expresión, obtenemos finalmente la desigualdad (1.2.3) y concluimos que f es convexa. ■



La convexidad estricta también puede caracterizarse por una condición de primer orden: f es estrictamente convexa si y solo si $\text{dom } f$ es convexo y

$$f(\mathbf{x}_2) > f(\mathbf{x}_1) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_1), \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \rangle_2 \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \text{dom } f, \mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2.$$

Para funciones cóncavas, tenemos la caracterización correspondiente: f es cóncava si y solo si $\text{dom } f$ es convexo y

$$f(\mathbf{x}_2) \leq f(\mathbf{x}_1) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_1), \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \rangle_2 \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \text{dom } f.$$

La función afín de $\mathbf{x}_2$, definida por $f(\mathbf{x}_1) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_1), \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \rangle_2$, es la aproximación lineal de f cerca de $\mathbf{x}_1$. En consecuencia, la desigualdad del teorema implica que la aproximación lineal de f en $\mathbf{x}_1$ es un *subestimador global* de f .




Figura 1.2.13: Grafo de una función convexa f y su aproximación lineal en $\mathbf{x}_1$.

Una consecuencia importante del Teorema 1.2.19 es la siguiente: si f es convexa y para algún $\mathbf{x}_0 \in \text{dom } f$ se verifica $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, entonces $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$ para todo $\mathbf{x} \in \text{dom } f$. De inmediato podemos afirmar que:

Si f es una función convexa, cuyo $\text{dom } f$ es un conjunto abierto,
entonces:

$\mathbf{x}^*$ es mínimo global de f si y solo si $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.

Teorema 1.2.20 (Condición de segundo orden para convexidad). Sea $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ una función dos veces diferenciable. f es convexa si y solo si $\text{dom } f$ es convexo y

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) \succeq 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \text{dom } f.$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Para $\mathbf{x} \in \text{dom } f$ y $\mathbf{d}$ arbitrarios, definimos $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\psi(t) := f(\mathbf{x} + t\mathbf{d}),$$

con $\text{dom } \psi = \{t \in \mathbb{R} \mid \mathbf{x} + t\mathbf{d} \in \text{dom } f\}$. Como f es convexa y dos veces diferenciable, podemos afirmar que ψ también lo es. Por lo tanto, el Lema 1.2.18 nos asegura que $\psi''(t) \geq 0$ para todo

$t \in \text{dom } \psi$. Derivando, obtenemos

$$\psi'(t) = \nabla f(\mathbf{x} + t\mathbf{d})^\top \mathbf{d}, \quad \psi''(t) = \mathbf{d}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x} + t\mathbf{d}) \mathbf{d}.$$

En particular, para $t = 0$, resulta $\mathbf{d}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{d} \geq 0$. Como $\mathbf{d}$ es arbitrario, esto implica $\nabla^2 f(\mathbf{x}) \succeq 0$ para todo $\mathbf{x} \in \text{dom } f$.

($\Leftarrow$) Sean $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \text{dom } f$, consideremos $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1$ y $\mathbf{d} = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1$. La fórmula de Taylor con resto integral para ψ es

$$\psi(t) = \psi(t_0) + \psi'(t_0)(t - t_0) + \int_{t_0}^t \psi''(u)(t - u) du.$$

Aplicada a $t_0 = 0$ y $t = 1$, resulta en

$$f(\mathbf{x}_2) = f(\mathbf{x}_1) + \nabla f(\mathbf{x}_1)^\top (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) + \int_0^1 (1 - u) (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)^\top \nabla^2 f(\mathbf{x}_1 + u(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)) (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) du.$$

Como, por hipótesis, la Hessiana $\nabla^2 f$ es semidefinida positiva, el integrando es no negativo. En consecuencia,

$$f(\mathbf{x}_2) \geq f(\mathbf{x}_1) + \nabla f(\mathbf{x}_1)^\top (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1),$$

lo cual es la condición de primer orden del Teorema 1.2.19. Luego, concluimos que f es convexa. ■



Para funciones de una variable, la condición se reduce a $f''(x) \geq 0$, lo cual implica que la derivada $f'(x)$ es no decreciente.

La convexidad estricta también puede caracterizarse por una condición de segundo orden, pero de manera parcial: si $\text{dom } f$ es convexo y $\nabla^2 f \succ 0$ para todo $\mathbf{x} \in \text{dom } f$, entonces f es estrictamente convexa. El recíproco no es cierto: por ejemplo, $f(x) = x^4$ es estrictamente convexa pero $f''(0) = 0$.

Para funciones cóncavas, tenemos la caracterización correspondiente: f es cóncava si y solo si $\text{dom } f$ es convexo y $\nabla^2 f(\mathbf{x}) \preceq 0$ para todo $\mathbf{x} \in \text{dom } f$.

Analice la convexidad de las siguientes funciones:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = e^{ax}$, con $a \in \mathbb{R}$.
- $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = x^a$, con $a \in \mathbb{R}$.
- $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = |x|^p$, con $p \geq 1$.
- $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \log x$.
- $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = x \log x$.

Ejemplo 1.2.21: Función cuadrática de varias variables

Consideremos la función cuadrática $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} + \mathbf{b}^\top \mathbf{x} + c,$$


donde $A \in \mathbf{S}^p$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$ y $c \in \mathbb{R}$. Dado que $\nabla^2 f(\mathbf{x}) = A$ para todo $\mathbf{x}$, podemos afirmar que f es convexa si y sólo si $A \succeq 0$.

Así, por ejemplo, la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (2x^2 + 2xy + 3y^2)$$

es convexa, ya que $A \succeq 0$. En efecto, para todo $\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ se verifica

$$\mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = 2x^2 + 2xy + 3y^2 = x^2 + (x + y)^2 + 2y^2 \geq 0.$$

**Ejemplo 1.2.22:** Norma en $\mathbb{R}^p$

Toda norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^p$ es una función convexa. En efecto, si $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$, la desigualdad (1.2.3) de la definición de función convexa es inmediata de la desigualdad triangular:

$$f(\theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) \mathbf{x}_2) = \|\theta \mathbf{x}_1 + (1 - \theta) \mathbf{x}_2\| \leq \theta \|\mathbf{x}_1\| + (1 - \theta) \|\mathbf{x}_2\|.$$

A modo de ejemplo, veamos que efectivamente se cumplen las condiciones de convexidad para el caso particular de la norma euclídea $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2 = (\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{1/2}$. Resultan

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|_2} \quad \text{y} \quad \nabla^2 f(\mathbf{x}) = \frac{I_p}{\|\mathbf{x}\|_2} - \frac{\mathbf{x} \mathbf{x}^\top}{\|\mathbf{x}\|_2^3}.$$

- *Condición de primer orden.* Dados $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \text{dom } f$, partimos de la desigualdad de Cauchy Schwarz $\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle_2 \leq \|\mathbf{x}_1\|_2 \|\mathbf{x}_2\|_2$ para obtener

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}_2\|_2 &\geq \frac{\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle_2}{\|\mathbf{x}_1\|_2} \\ &= \|\mathbf{x}_1\|_2 + \frac{\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle_2}{\|\mathbf{x}_1\|_2} - \|\mathbf{x}_1\|_2 \\ &= \|\mathbf{x}_1\|_2 + \frac{\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle_2 - \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1 \rangle_2}{\|\mathbf{x}_1\|_2} \\ &= \|\mathbf{x}_1\|_2 + \left\langle \frac{\mathbf{x}_1}{\|\mathbf{x}_1\|_2}, \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \right\rangle_2, \end{aligned}$$

lo cual es justamente la condición de primer orden dada por la desigualdad (1.2.4).

- *Condición de segundo orden:* para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^p$ se tiene

$$\mathbf{v}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{v} = \mathbf{v}^\top \left(\frac{I_p}{\|\mathbf{x}\|_2} - \frac{\mathbf{x} \mathbf{x}^\top}{\|\mathbf{x}\|_2^3} \right) \mathbf{v}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\|\mathbf{v}\|_2^2}{\|\mathbf{x}\|_2} - \frac{(\mathbf{v}^\top \mathbf{x})^2}{\|\mathbf{x}\|_2^3} \\
&\geq \underbrace{\frac{\|\mathbf{v}\|_2^2}{\|\mathbf{x}\|_2} - \frac{\|\mathbf{x}\|_2^2 \|\mathbf{v}\|_2^2}{\|\mathbf{x}\|_2^3}}_{=0}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\nabla^2 f(\mathbf{x}) \succeq 0$, tal como esperábamos.

Operaciones que preservan convexidad

A continuación presentamos algunas operaciones que preservan la convexidad o concavidad de funciones y que, por lo tanto, permiten construir nuevas funciones convexas y cóncavas. Las pruebas se proponen en las actividades conceptuales.  17

- **Sumas ponderadas no negativas.** Si f es una función convexa y $\alpha \geq 0$, entonces la función αf es convexa. Si f_1 y f_2 son ambas funciones convexas, entonces $f_1 + f_2$ también lo es. Combinando estas dos propiedades, se deduce que el conjunto de funciones convexas es en sí mismo un cono convexo: una suma ponderada no negativa de funciones convexas,

$$f = w_1 f_1 + \cdots + w_m f_m, \quad w_i \geq 0,$$

es convexa. De manera similar, una suma ponderada no negativa conserva la concavidad.

- **Composición con una aplicación afin.** Sean $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{p \times m}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$. La función $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(\mathbf{x}) = f(A\mathbf{x} + \mathbf{b}),$$

con $\text{dom } g = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} + \mathbf{b} \in \text{dom } f\}$, conserva la convexidad o concavidad de f .

- **Máximo puntual.** Si f_1 y f_2 son funciones convexas, entonces su *máximo puntual*, definido por

$$f(\mathbf{x}) = \max\{f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x})\},$$

con $\text{dom } f = \text{dom } f_1 \cap \text{dom } f_2$, también es convexa. Este resultado se puede extender a un conjunto $\{f_1, \dots, f_m\}$ de funciones convexas. De manera similar, el mínimo puntual de un conjunto de funciones cóncavas es una función cóncava.

- **Supremo puntual.** La propiedad del máximo puntual se extiende al *supremo puntual* sobre un conjunto infinito de funciones convexas. Si para $i \in \mathcal{A}$, donde $\mathcal{A}$ es un conjunto de índices, se tiene que $f_i(\mathbf{x})$ es convexa, entonces la función f definida por

$$f(\mathbf{x}) = \sup_{i \in \mathcal{A}} f_i(\mathbf{x}),$$

con $\text{dom } f = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \text{dom } f_i (\forall i \in \mathcal{A}), \sup_{i \in \mathcal{A}} f_i(\mathbf{x}) < \infty\}$, también es convexa. De manera similar, el ínfimo puntual de un conjunto de funciones cóncavas es una función cóncava.

Ejemplo 1.2.23: Suma de las mayores componentes de un vector

Para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$, se denota con $x_{[i]}$ su i -ésima componente de mayor valor. Es decir, podemos escribir

$$x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq \dots \geq x_{[p]}.$$

Para $r \leq p$, se define $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^r x_{[i]};$$

esto es, a cada vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ le asigna la suma de sus r componentes de mayor valor. Esta función puede ser reescrita como

$$f(\mathbf{x}) = \max \{x_{i_1} + \dots + x_{i_r} \mid 1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_r \leq n\};$$

esto es, el máximo de todas las posibles sumas de r diferentes componentes de $\mathbf{x}$. Cada una de esas sumas es una función lineal (y, por lo tanto, convexa). En consecuencia, dado que el máximo puntual conserva la convexidad, concluimos que f es convexa.

 Verifique que las siguientes funciones son convexas:

- $f(\mathbf{x}) = \alpha \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2 + \beta \|\mathbf{C}\mathbf{x} - \mathbf{d}\|_1, \quad \alpha, \beta \geq 0.$
- $f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m w_i |\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} + b_i|, \quad w_i \geq 0.$
- $f(\mathbf{x}) = \log \left(\sum_{i=1}^m \exp(\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} + b_i) \right).$

III | Problemas de optimización convexa

Definición 1.2.24 (Problema de optimización convexa). Un *problema de optimización convexa* es de la forma

$$\begin{aligned} & \text{minimizar} && f(\mathbf{x}) \\ & \text{sujeto a} && \mathbf{x} \in \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid \begin{array}{ll} g_i(\mathbf{x}) \leq 0, & i = 1, \dots, r \\ \mathbf{a}_j^\top \mathbf{x} - b_j = 0, & j = 1, \dots, m \end{array} \right\}, \end{aligned} \quad (1.2.6)$$

donde la función objetivo f y las funciones de restricción de desigualdad $g_1, \dots, g_r$ son convexas.

El conjunto factible Ω de un problema de optimización convexa es
convexo.

 Justifique la afirmación anterior.

También nos referiremos a

$$\begin{array}{ll} \text{maximizar} & f(\mathbf{x}) \\ \text{sujeto a} & \mathbf{x} \in \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \left| \begin{array}{ll} g_i(\mathbf{x}) \leq 0, & i = 1, \dots, r \\ \mathbf{a}_j^\top \mathbf{x} - b_j = 0, & j = 1, \dots, m \end{array} \right. \right\} \end{array} \quad (1.2.7)$$

como un problema de optimización convexa, cuando la función objetivo f sea cóncava y las funciones de restricción de desigualdad g_i sean convexas. De hecho, claramente el problema de maximización cóncava se resuelve minimizando la función convexa $-f$, razón por la cual todos los resultados y conclusiones que describiremos para el problema de minimización (1.2.6) se extienden al caso de maximización (1.2.7).

Ejemplo 1.2.25: Minimización de norma con restricción lineal

El problema

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & \|\mathbf{x}\|_2^2 \\ \text{sujeto a} & \mathbf{1}^\top \mathbf{x} \geq 1 \end{array}$$

es de optimización convexa. La función objetivo es una función convexa, como hemos visto en el Ejemplo 1.2.22, y la única función de restricción es

$$g(\mathbf{x}) = -\mathbf{1}^\top \mathbf{x} = -(x_1 + \dots + x_n),$$

la cual es una función lineal y, por lo tanto, convexa.

Los problemas de optimización convexa tienen una propiedad fundamental que los caracteriza y que explica su gran importancia, la cual enunciaremos a continuación para concluir esta sección. Más adelante estudiaremos cómo la convexidad potencia las condiciones de optimalidad en un punto factible, facilitando su análisis y aplicación.

Teorema 1.2.26 (Optimalidad global de un mínimo local en problemas convexas). *Si $\mathbf{x} \in \Omega$ es un mínimo local de la función objetivo de un problema de optimización convexa, entonces $\mathbf{x}$ es un punto óptimo (es decir, un mínimo global).*

Demostración. Sea $\mathbf{x} \in \Omega$ un mínimo local de un problema de optimización convexa. Entonces, para algún $R > 0$, se tiene que

$$f(\mathbf{x}) = \min\{f(\mathbf{z}) \mid \mathbf{z} \in \Omega, \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|_2 \leq R\}. \quad (1.2.8)$$

Supongamos que $\mathbf{x}$ no es punto óptimo, lo cual significa que existe $\mathbf{y} \in \Omega$ tal que $f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x})$. En consecuencia, $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2 > R$. Elegimos

$$\mathbf{z} = (1 - \theta)\mathbf{x} + \theta\mathbf{y}, \quad \theta = \frac{R}{2\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2}.$$

Por convexidad de Ω , debe ser $\mathbf{z} \in \Omega$. Además, se verifica

$$\|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|_2 = \|\theta(\mathbf{y} - \mathbf{x})\|_2 = \frac{R}{2} < R.$$

Es suficiente mostrar que $f(\mathbf{z}) < f(\mathbf{x})$ para contradecir (1.2.8) y concluir la prueba. Por convexidad de f , resulta

$$f(\mathbf{z}) \leq (1 - \theta)f(\mathbf{x}) + \theta f(\mathbf{y}) < (1 - \theta)f(\mathbf{x}) + \theta f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}).$$



Vamos a concluir esta sección haciendo un breve análisis sobre la existencia y unicidad de la solución. En primer lugar, un resultado importante es que, si la función objetivo f es *estrictamente convexa*, entonces el problema admite, a lo sumo, una solución óptima (esto es, si hay punto óptimo, es *único*). En efecto, si hubiesen dos puntos óptimos distintos $\mathbf{x}_1^*$ y $\mathbf{x}_2^*$, el absurdo es inmediato: la convexidad estricta asegura que

$$f(\theta \mathbf{x}_1^* + (1 - \theta) \mathbf{x}_2^*) < \theta f(\mathbf{x}_1^*) + (1 - \theta) f(\mathbf{x}_2^*) = p^*, \quad \forall \theta \in (0, 1),$$

lo cual contradice el hecho de que p^* es el valor óptimo.

Ahora bien, la *existencia* de una solución óptima requiere hipótesis adicionales, que dependen de la estructura particular del problema. Por ejemplo, en problemas sin restricciones, ciertas condiciones de crecimiento de la función objetivo pueden garantizarla. Por otra parte, en problemas con restricciones, si el conjunto factible es cerrado y acotado y la función objetivo es continua, el teorema de Weierstrass garantiza que existe una solución óptima.

Referencias

- Boyd, S. & Vandenberghe, L. (2004). *Convex optimization*. Cambridge University Press.
- Farina, G. (2024–2025). *MIT 6.7220: Nonlinear Optimization*. Course material and lecture notes. Massachusetts Institute of Technology. URL: <https://www.mit.edu/~gfarina/notes/>.