











# Lösungen

## Grundkompetenzen


### Lösungserwartung: Graphen von Ableitungsfunktionen\* - 1\_749, AN3.3, 2 aus 5

	D	A		D	
	C	B		E	
	F	C		F	
	A				


### Lösungserwartung: Differenzieren einer Exponentialfunktion\* - 1\_581, AN3.3, 2 aus 5

$$\lambda = -0,5$$

### Lösungserwartung: Grafisch differenzieren\* - 1\_549, AN3.3, 2 aus 5



Lösungserwartung: Graphen von Ableitungsfunktionen\* - 1\_503, AN3.3, 2 aus 5



**Lösungserwartung: Funktionen und Ableitungsfunktionen\* - 1\_479, AN3.3, 2 aus 5**

	E	A	
	A	B	
	F	C	
	D	D	
		E	
		F	

**Lösungserwartung: Ableitung\* - 1\_358, AN3.3, 2 aus 5**

An den Stellen  $x_1 = -4$  und  $x_2 = 4$  hat  $f$  lokale Extrema.

**Lösungserwartung: Eigenschaften der Ableitungsfunktion einer Polynomfunktion 3. Grades\* - 1\_455, AN3.3, 2 aus 5**


Die Funktionswerte der Funktion $f'$ sind im Intervall $(0; 2)$ negativ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Funktion $f'$ hat an der Stelle $x = 0$ eine Nullstelle.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion\* - 1\_406, AN3.3, 2 aus 5**

①	
im Intervall $[-1; 1]$ positiv	<input checked="" type="checkbox"/>

②	
$f$ ist im Intervall $[-1; 1]$ streng monoton steigend	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Graph einer Ableitungsfunktion\* - 1\_383, AN3.3, 2 aus 5**




**Lösungserwartung: Funktionseigenschaften\* - 1\_846, AN3.3, 2 aus 5**

Im Intervall $[-3; 3]$ ist die Funktion $f$ streng monoton steigend.	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Funktion $f$ hat im Intervall $[-3; 3]$ mindestens eine Wendestelle.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Polynomfunktion\* - 1\_798, AN3.3, 2 aus 5**

Es gibt genau eine Stelle $x_1$ mit $f'(x_1) = 0$ und $f''(x_1) > 0$ .	<input checked="" type="checkbox"/>
Es gibt genau eine Stelle $x_1$ mit $f'(x_1) > 0$ und $f''(x_1) = 0$ .	<input checked="" type="checkbox"/>

Lösungserwartung: Kurvenverlauf\* - 1\_774, AN3.3, 2 aus 5



A	$f'(x_P) > 0$ und $f''(x_P) > 0$
B	$f'(x_P) > 0$ und $f''(x_P) < 0$
C	$f'(x_P) < 0$ und $f''(x_P) > 0$
D	$f'(x_P) < 0$ und $f''(x_P) < 0$
E	$f'(x_P) > 0$ und $f''(x_P) = 0$
F	$f'(x_P) < 0$ und $f''(x_P) = 0$

Lösungserwartung: Eigenschaften einer Polynomfunktion\* - 1\_750, AN3.3, 2 aus 5

①	
$f'(x) < 0$	<input checked="" type="checkbox"/>

②	
streng monoton fallend	<input checked="" type="checkbox"/>

Lösungserwartung: Eigenschaften einer Polynomfunktion dritten Grades\* - 1\_725, AN3.3, 2 aus 5

$f(x_1) > f(x_2)$	<input checked="" type="checkbox"/>
Im Intervall $[x_1; x_2]$ gibt es eine Stelle $x_3$ mit $f''(x_3) = 0$ .	<input checked="" type="checkbox"/>

Lösungserwartung: Polynomfunktion\* - 1\_702, AN3.3, 2 aus 5

$f''(3) = 0$	<input checked="" type="checkbox"/>
$f''(1) > f''(4)$	<input checked="" type="checkbox"/>


**Lösungserwartung: Eigenschaften einer Polynomfunktion dritten Grades\* - 1\_677, AN3.3, 2 aus 5**

$f''(1) > 0$	<input checked="" type="checkbox"/>
$f'(2) = 0$	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Zweite Ableitung\* - 1\_653, AN3.3, 2 aus 5**

Für alle $x$ aus dem Intervall $[-1; 1]$ gilt: $f''(x) < 0$ .	<input checked="" type="checkbox"/>
$f''(2) = 0$	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Funktionsgraph\* - 1\_630, AN3.3, 2 aus 5**



**Lösungserwartung: Steigung einer Funktion - 1\_036, AN3.3, 2 aus 5**

$$f'(x) = \frac{3}{4}x^2 + 3x + 4$$

$$f'(2) = \frac{3}{4} \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 4 = 13$$

Der Wert der Steigung der Funktion  $f$  an der Stelle  $x = 2$  ist 13.

**Lösungserwartung: Wendestelle\* - 1\_605, AN3.3, 2 aus 5**

Die Funktion  $f$  hat an der Stelle  $x = 6$  keine Wendestelle.

Mögliche Begründung:



$$f'''(x) = 24 \cdot x - 4$$

$f'''(6) = 140 \neq 0 \Rightarrow$  Die Funktion  $f$  kann an der Stelle  $x = 6$  keine Wendestelle haben.

### Lösungserwartung: Lokale Extremstellen\* - 1\_454, AN3.3, 2 aus 5

Die Stellen  $x_1 = 1$  und  $x_2 = 3$  sind lokale Extremstellen der Funktion  $f$ .

### Lösungserwartung: Eigenschaften der zweiten Ableitung\* - 1\_526, AN3.3, 2 aus 5

	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

### Lösungserwartung: Negative erste Ableitung\* - 1\_382, AN3.3, 2 aus 5

$$I = (-3; 4)$$

oder:

$$I = [-3; 4)$$

### Lösungserwartung: Differenzierbare Funktion\* - 1\_502, AN3.3, 2 aus 5

$f'''(6) = 0$	<input checked="" type="checkbox"/>
$f'''(11) < 0$	<input checked="" type="checkbox"/>

### Lösungserwartung: Nachweis eines lokalen Minimums\* - 1\_478, AN3.3, 2 aus 5



Möglicher rechnerischer Nachweis:

$$p''(x) = 6x$$

$$p''(1) = 6 > 0 \Rightarrow \text{An der Stelle 1 liegt ein lokales Minimum vor.}$$

**Lösungserwartung: Extremstelle\* - 1\_357, AN3.3, 2 aus 5**

Wenn die Funktion $f$ bei $x_0$ das Monotonieverhalten ändert, dann liegt bei $x_0$ eine lokale Extremstelle von $f$ .	<input checked="" type="checkbox"/>
Wenn $x_0$ eine lokale Extremstelle von $f$ ist, dann ist $f'(x_0) = 0$ .	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Graph einer Ableitungsfunktion\* - 1\_430, AN3.3, 2 aus 5**

Die Funktion $f$ ist eine Polynomfunktion dritten Grades.	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Funktion $f$ hat an der Stelle $x = 0$ eine Wendestelle.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Graph einer Ableitungsfunktion\* - 1\_405, AN3.3, 2 aus 5**

Die Funktion $f$ hat im Intervall $[-4; 5]$ zwei lokale Extremstellen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Funktion $f$ hat an der Stelle $x = 1$ eine Wendestelle.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Eigenschaften einer Funktion\* - 1\_334, AN3.3, 2 aus 5**

Die Tangente an den Graphen der Funktion $f$ im Punkt $(0 f(0))$ hat die Steigung 2.	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Stelle $x_2 = 2$ ist eine lokale Maximumstelle von $f$ .	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Polynomfunktion dritten Grades\* - 1\_1195, AN4.3, 2 aus 5**

Die Funktion $f$ ist im Intervall $(1; 3)$ streng monoton fallend.	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Funktion $f$ weist im Intervall $(0; 2)$ einen Monotoniewechsel auf.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Regeln des Differenzierens\* - 1\_1193, AN4.3, 2 aus 5**

$a^2 \cdot f' + a^2 \cdot g'$	<input checked="" type="checkbox"/>
$a^2 \cdot (f + g)'$	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Monotonie- und Krümmungsverhalten\* - 1\_893, AN4.3, 2 aus 5**

Im Intervall $(x_1; x_2)$ gibt es mindestens eine Stelle $x_0$ , für die $f'(x_0) = 0$ gilt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Im Intervall $(x_1; x_2)$ ändert sich das Monotonieverhalten von $f$ .	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Traubensaft\* - 1\_891, AN4.3, 2 aus 5**

Die 1. Ableitung von $f$ hat an der Stelle $t_1$ einen positiven Wert.	<input checked="" type="checkbox"/>
Die 2. Ableitung von $f$ hat an der Stelle $t_2$ einen negativen Wert.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Ableitungs- und Stammfunktion\* - 1\_1235, AN1.3, 1 aus 6**

①	
ist im Intervall $(-\infty; 4)$ streng monoton fallend	<input checked="" type="checkbox"/>

②	
haben an der Stelle $x = 6$ eine Wendestelle mit waagrechter Tangente	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Ableitungsfunktion einer Polynomfunktion dritten Grades\* - 1\_1236, AN1.3, 1 aus 6**

$f'$ hat an der Stelle $x_1$ den gleichen Wert wie an der Stelle $x_2$ .	<input checked="" type="checkbox"/>
$f'$ hat an der Stelle $x = 4$ einen positiven Wert.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Erste Ableitung\* - 1\_1234, AN1.3, 1 aus 6**

$$g'(0) = 2 \cdot a \cdot k$$



oder:

$$g'(0) = f'(0) \cdot a \cdot k$$

**Lösungserwartung: Ableitungsregeln\* - 1\_1258, AN3.2, 2 aus 5**

Für die reelle Funktion $f$ mit $f(x) = g(x) - h(x)$ gilt: $f'(x) = g'(x) - h'(x)$	<input checked="" type="checkbox"/>
Für die reelle Funktion $f$ mit $f(x) = k \cdot g(x)$ gilt: $f'(x) = k \cdot g'(x)$	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Zweite Ableitung\* - 1\_1260, AN3.2, 2 aus 5**

	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

### Lösung: Punkte auf einem Graphen\* (1\_1284)

0	C	A	An dieser Stelle ist die erste Ableitung gleich null und die zweite Ableitung negativ.
$x_1$	F	B	An dieser Stelle sind die erste und die zweite Ableitung negativ.
$x_2$	A	C	An dieser Stelle ist die erste Ableitung gleich null und die zweite Ableitung positiv.
$x_3$	B	D	An dieser Stelle sind die erste und die zweite Ableitung positiv.
		E	An dieser Stelle sind die erste und die zweite Ableitung gleich null.
		F	An dieser Stelle ist die erste Ableitung positiv und die zweite Ableitung gleich null.

### Lösung: Eigenschaften einer Polynomfunktion\* (1\_1308)

Es gibt genau ein $c$ , für das $f'(c) = 0$ gilt.	<input checked="" type="checkbox"/>

### Lösung: Graph einer Ableitungsfunktion\* (1\_1331)

$f$ ist im Intervall $[2; 3]$ linksgekrümmt (positiv gekrümmt).	<input checked="" type="checkbox"/>
$f$ hat genau 2 Wendestellen.	<input checked="" type="checkbox"/>

### Lösung: Polynomfunktion dritten Grades\* (1\_1332)

①	②
Wendestelle	<input checked="" type="checkbox"/>
	Extremstelle <input checked="" type="checkbox"/>

## Rookie Level

### Fussballspielen im Park \* (A\_250) Lösung

$$\begin{aligned} \text{a) } 0 &= -0,003 \cdot x^3 + 0,057 \cdot x^2 \\ 0 &= x^2 \cdot (-0,003 \cdot x + 0,057) \Rightarrow x_1 = 0 \\ -0,003 \cdot x + 0,057 &= 0 \Rightarrow x_2 = 19 \end{aligned}$$

$$D = [0; 19]$$

$$h'(x) = 0$$

$$x \cdot (-0,009 \cdot x + 0,114) = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$-0,009 \cdot x + 0,114 = 0 \Rightarrow x_2 = 12,66... \approx 12,7$$

$$h(x_2) = 3,04... \approx 3,0$$

In einer horizontalen Entfernung von rund 12,7 m zur Abschussstelle erreicht der Ball seine größte Höhe von rund 3,0 m.

Der Nachweis, dass es sich bei der Extremstelle um eine Maximumstelle handelt, und eine Überprüfung der Ränder des Definitionsbereichs sind nicht erforderlich.

### Kraftstoffverbrauch (B\_176) Lösung

$$\begin{aligned} \text{b) } K'(v) &= 0,01 \cdot v - 0,4 = 0 \\ v &= 40 \\ K''(v) &> 0 \end{aligned}$$

Bei 40 km/h ist der Kraftstoffverbrauch minimal.

### Rollladen (B\_013) Lösung

b) Stelle der maximalen Steigung:

$$g(x) = -6,25 \cdot 10^{-5} \cdot x^3 + 9,375 \cdot 10^{-3} \cdot x^2 + 8,75 \cdot 10^{-2} \cdot x$$

$$g'(x) = -3,75 \cdot 10^{-4} \cdot x + 1,875 \cdot 10^{-2}$$

$$g'(x) = 0 \Rightarrow x = 50$$

Der Funktionsgraph  $g$  hat bei  $x = 50$  mm die maximale Steigung.

### Simulation eines Golfballflugs (A\_026) Lösung

b) Um den Winkel zu ermitteln, unter dem der Ball in den Teich eintaucht, sind folgende Schritte notwendig:

1. Eintauchstelle  $x_E$  ermitteln:  $h(x_E) = 0, x_E \neq 0$
2. Steigung der Funktion an der Stelle  $x_E$  ermitteln:  $k = h'(x_E)$
3. Eintauchwinkel  $\alpha$  ermitteln:  $\tan \alpha = k \Rightarrow \alpha = \arctan k$

(Hinweis: Auch andere, analoge Lösungswege sind zulässig.)

c) Ermittlung des Maximums:

$$h(x) = -\frac{x^2}{72.000} + \frac{1}{5}$$

$$h'(x) = 0 \Rightarrow x = 120$$

$$h(120) = 16 \Rightarrow M = (120|16)$$

Der höchste Punkt der Flugbahn ist der Punkt  $M = (120|16)$ . Der Golfball erreicht seine maximale Flughöhe von 16 m in einer waagrechten Entfernung von 120 m vom Abschlag.

d)  $h(x)$  ist eine Polynomfunktion 3. Grades, ihre 1. Ableitung  $h'(x)$  ist daher eine quadratische Funktion. Die Gleichung  $h'(x) = 0$  hat höchstens 2 Lösungen, es gibt also maximal 2 lokale Extremwerte. Nur einer davon kann – da  $h(x)$  stetig ist – ein Maximum sein.

(Auch andere Argumentationen sind möglich, z. B.:

$h(x)$  ist eine Polynomfunktion 3. Grades, mit maximal 3 Nullstellen, also höchstens einem lokalen Maximum.)

## Riesenpizza \* (A\_238) Lösung

c)  $P'(d) = 0,0006 \cdot d - 0,015$   
 $P'(d) = 0 \Rightarrow d = 25$

Die Pizza mit dem geringsten Preis pro Flächeneinheit hat einen Durchmesser von 25 Inch.

$$P(25) = 0,0744$$

$$P(25) \cdot \left(\frac{25}{2}\right)^2 \cdot \pi = 36,521...$$

Gemäß diesem Modell kostet diese Pizza 36,52 US-Dollar.

## Bevoelkerungsentwicklung \* (A\_218) Lösung

b)

P	C
Q	B

A	$N_2'(t) > 0$ und $N_2''(t) > 0$
B	$N_2'(t) < 0$ und $N_2''(t) > 0$
C	$N_2'(t) < 0$ und $N_2''(t) < 0$
D	$N_2'(t) > 0$ und $N_2''(t) < 0$

## Puppenrutsche \* (B\_373) Lösung

b1) Berechnung der Wendestelle:

Lösen der Gleichung:  $g''(x_0) = 0$


$$x_0 = 6 \text{ cm}$$

b2) Die 1. Ableitung einer Polynomfunktion 3. Grades ist eine quadratische Funktion. Die Extremstellen der Polynomfunktion 3. Grades entsprechen den Nullstellen der 1. Ableitung. Eine quadratische Funktion hat höchstens 2 Nullstellen. Daher kann die Polynomfunktion 3. Grades höchstens 2 Extrempunkte haben.

## Die Adria-Wien-Pipeline\* (A\_280) Lösung

c1)  $R(t) = 1200 \cdot t$

c2)



## Epidemie \* (A\_255) Lösung

c)  $I(45)$  gibt an, wie viele Personen insgesamt in den ersten 45 Tagen infiziert wurden.

Nach 60 Tagen ist die Anzahl der Neuinfektionen pro Tag am höchsten (Toleranzbereich:  $\pm 5$  Tage).

Dazu ermittelt man die Nullstelle der 2. Ableitung der Funktion  $I$  im dargestellten Bereich.

*In der Grafik ist klar zu erkennen, dass  $I$  im dargestellten Intervall nur eine Wendestelle hat und dass an dieser Stelle die Zunahme am stärksten ist. Daher sind eine Überprüfung mithilfe der 1. Ableitung und eine Überprüfung der Randstellen nicht erforderlich.*


### Sauna \* (A\_297) Lösung

a1)

Graph 4	<input checked="" type="checkbox"/>

### Trinkwasser \* (A\_311) Lösung

c1)



Der Graph der quadratischen Funktion muss durch den Punkt P verlaufen und an der Stelle  $x = 10$  ein lokales Maximum haben.

### Buchsbaeume \* (A\_186) Lösung

b) Zeitpunkt des stärksten Höhenwachstums:  $g''(t) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:  $t = 6,16... \approx 6,2$

Etwa 6,2 Jahre nach der Auspflanzung ist das Höhenwachstum am größten.

Mit dem Ausdruck  $g(5) - g(0)$  wird der (absolute) Höhenzuwachs in cm in den ersten 5 Jahren nach der Auspflanzung berechnet.

### Gartensauna \* (A\_328) Lösung

c1)  $h'(x) = 0$  oder  $-0,0828 \cdot x^3 + 0,795 \cdot x^2 - 2,28 \cdot x + 1,8 = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$x_1 = 1,29... \quad x_2 = 3,46... \quad x_3 = 4,84...$


Wegen  $h''(x_p) > 0$  handelt es sich bei  $x_p$  um eine lokale Minimumstelle.

Aus der Abbildung ist daher ersichtlich:  $x_p = x_2 = 3,46...$



Lösung: Straßenrad-WM \* (A\_340)

b1)



## Pro Level

### Flussläufe und Pegelstände \* (A\_266) Lösung

- a) Berechnung des Hochpunkts  $H$  von  $p$  im gegebenen Intervall mittels Technologieeinsatz:

$$p'(t) = 0 \Rightarrow H = (110,52 \dots | 9,41 \dots)$$

Abweichung:  $9,41 \dots - 2,5 = 6,91 \dots$

Die Abweichung betrug rund 6,9 m.


Zur Zeit  $t_1$  ist der Pegelstand am stärksten gestiegen.

### Pelletsheizung \* (A\_068) Lösung

b1)

$V'(x) < 0$ und $V''(x) < 0$	<input checked="" type="checkbox"/>

b2)



- b3) Die Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von 0 °C ist um rund 5 °C geringer.

Toleranzbereich:  $[3,5 \text{ °C}; 6,5 \text{ °C}]$


### Fressverhalten von Furchenwalen \* (A\_288) Lösung

- b1) Berechnung des Hochpunkts  $H$  von  $m$  im gegebenen Intervall mittels Technologieeinsatz:

$$m'(t) = 0 \Rightarrow H = (3 | 8,1)$$

Die maximale Größe der Maulöffnung beträgt 8,1 m².

c1)

### Boule \* (B\_444) Lösung

a1) Die Abwurfhöhe beträgt 1,1 m.

a2)  $f(x) = 0$  oder  $-0,0959 \cdot x^2 + 0,767 \cdot x + 1,1 = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$x_1 = -1,241...$

$x_2 = 9,239...$

Die Wurfweite  $w$  beträgt rund 9,24 m.

a3)  $\alpha = |\arctan(f'(9,239...))| = 45,1...^\circ$

Der Aufprallwinkel  $\alpha$  liegt also nicht im gegebenen Intervall.

### Pflanzenwachstum \* (A\_292) Lösung

a1) mittlere Änderungsrate der Höhe in Zentimetern pro Tag:  $\frac{6}{20} = 0,3$

a2)

Im Zeitintervall $[0; 20]$ ist die 1. Ableitung streng monoton steigend.	D
Im Zeitintervall $[0; 20]$ ist die 2. Ableitung immer negativ.	A

A	$f$
B	$g$
C	$h$
D	$p$

### Kuehe auf der Weide \* (A\_141) Lösung

c1)  $h(t) = 115$

oder:

$$0,0024 \cdot t^3 - 0,19 \cdot t^2 + 5,73 \cdot t + 73 = 115$$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t = 10,50\dots$$

Im Alter von rund 10,5 Monaten wird gemäß diesem Modell eine Widerristhöhe von 115 cm erreicht.


c2)  $h''(t) = 0,0144 \cdot t - 0,38$

$h''$  ist eine steigende lineare Funktion mit der Nullstelle  $t_0 = 26,38\dots$

Für alle  $t < t_0$  ist  $h''(t)$  negativ. Der Graph von  $h$  ist daher für alle  $t < t_0$  (und somit insbesondere für alle  $t \in [1; 24]$ ) negativ gekrümmt.

c3) Die Widerristhöhe nimmt im Alter von 12 Monaten um rund 2,2 cm/Monat zu.

# Holzfeuchte und Holztrocknung \* (A\_307) Lösung



Toleranzbereich für  $x_0$ :  $[92; 97]$

c2)  $f(x) = k \cdot x + d$

$x$  ... relative Luftfeuchtigkeit in %

$f(x)$  ... Wassergehalt von Holz dieser Holzsorte bei der relativen Luftfeuchtigkeit  $x$  in %

$$k = \frac{9,4 - 7,8}{55 - 45} = 0,16$$

$$d = 7,8 - 0,16 \cdot 45 = 0,6$$

$$f(x) = 0,16 \cdot x + 0,6$$

## Ressourcen \* (B\_512) Lösung


b1)

①	
genau 1 Stelle	<input checked="" type="checkbox"/>

②	
$g'(t) = h'(t)$	<input checked="" type="checkbox"/>

c1)


Für alle $t$ mit $2010 < t < 2050$ gilt: $f''(t) > 0$	B
Für genau ein $t$ mit $1970 < t < 2050$ gilt: $f'(t) = 0$ und $f''(t) < 0$	C



### Papier \* (A\_316) Lösung

d1)  $|C(10) - C(0)| \approx 43$  Millionen Tonnen pro Jahr

Toleranzbereich:  $[40; 46]$




### Lösungserwartung: Koffein\* (c) - 2\_101, WS3.2, Halboffenes Antwortformat

a1) 36 min

a2)

①	
eine Extremstelle	<input checked="" type="checkbox"/>

②	
Steigung	<input checked="" type="checkbox"/>

### Holzzeug \* (B\_560) Lösung

b1)


Polynomfunktion 4. Grades	<input checked="" type="checkbox"/>

b2) Anzahl der Stellen: 2

### Mit Pfeil und Bogen \* (A\_323) Lösung

a1)  $f'(x) = 2 \cdot a \cdot x + b$   
 $f'(0) = \tan(45^\circ)$   
 $b = 1$

a2)  $H = 2 \text{ m}$



### Lösung: Schwimmbecken\* (2\_125)

c1)  $f''(x) = 0$   
 $x_1 = 2,5$

### Lösung: Ruderboot \* (A\_343)

b1)  $f''(x) = 0$  oder  $9,6 \cdot x - 4,8 = 0$   
 $x = 0,5$   
 $s = 2 \cdot 0,5 \text{ m} = 1 \text{ m}$

## All Star Level

### Leistung einer Solaranlage \* (A\_212) Lösung

a)  $P'(6) = 0$

$$0 = \frac{7}{162} \cdot 6^3 - \frac{7}{9} \cdot 6^2 + 2 \cdot a \cdot 6$$

$$a = \frac{14}{9}$$

### Ortsumfahrung (A\_013) Lösung

a) Anstieg der Geraden  $g$  durch  $S$  und  $W$ :  $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ,  $k = -1$

Gleichung der Geraden:  $g(x) = -x + 4$

Die Steigungen (der Tangenten) von  $f$  in den Punkten  $W$  ( $x = 0$ ) und  $S$  ( $x = 4$ ) erhält man über die 1. Ableitung:

$$f'(x) = -0,25 \cdot x^3 + 1,5 \cdot x^2 - 2 \cdot x - 1$$

$$f'(0) = -1 \text{ und } f'(4) = -1$$

Der Anstieg ist in beiden Punkten gleich, nämlich  $k = -1$ .

Die Punkte  $(0|4)$  und  $(4|0)$  liegen auf den Graphen von  $f$  und  $g$ , daher gilt:

Die Tangente in beiden Punkten hat die Gleichung  $y = -x + 4$  und dies entspricht der Geraden  $g(x)$ , die die alte Straßenführung beschreibt.

### Durchhaengende Kette (A\_214) Lösung

b) Der Steigungswinkel am Punkt  $B$  ist  $\arctan(f'(1))$ .

$$f'(x) = e^x - e^{-x}$$

$$f'(1) = 2,350\dots, \text{ Steigungswinkel} = \arctan(2,350\dots) = 66,952\dots^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - 90^\circ - 66,952\dots^\circ = 23,047\dots^\circ \approx 23,05^\circ$$

### Schwangerschaft \* (B\_322) Lösung

b)  $m(25) = 638,3\dots \approx 638$

Die Masse des Fötus zum Zeitpunkt  $t = 25$  beträgt rund 638 g.

Die stärkste Massezunahme erfolgt an der Wendestelle  $m''(t) = 0$ .

Lösung dieser Gleichung mittels Technologieeinsatz:  $t = 35,26\dots \approx 35,3$

Nach etwa 35,3 Wochen ist die Massezunahme am größten.

### Bastelararbeit im Kindergarten \* (B\_336) Lösung

c1) Der Tiefpunkt  $(0|1)$  von  $g$  kann der Abbildung entnommen werden:  $g(0) = 1$ .

Berechnung der Maximumstellen von  $f$ :

$$f'(x) = -2 \cdot x^3 + 3,6 \cdot x$$

Lösung der Gleichung  $f'(x) = 0$ :

$$x_1 = 0 \text{ (Minimumstelle)}$$

$$x_{2,3} = \pm\sqrt{1,8} \text{ (Maximumstellen)}$$

$$\text{Mindestabmessung in cm: } f(\sqrt{1,8}) - g(0) = \frac{281}{50} = 5,62$$

Die andere Seite der Grundfläche muss mindestens 5,62 cm lang sein.



## Skatepark (1) \* (A\_194) Lösung

b) Ansatz zur Berechnung der Stelle, an der die Rampe einen Steigungswinkel von  $30^\circ$  hat:

$$\tan(30^\circ) = f'(x)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{160} \cdot x \Rightarrow x = 160 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$f\left(160 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{80}{3} \approx 26,7$$

Die Rampe hat in einer Höhe von rund 26,7 cm einen Steigungswinkel von  $30^\circ$ .

## Vitamin C \* (A\_281) Lösung

c1)  $c'(t) = 0$  oder  $24 \cdot (-0,0195 \cdot e^{-0,0195 \cdot t} + 1,3 \cdot e^{-1,3 \cdot t}) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t = 3,279...$$

$$c(3,279...) = 25,175...$$

Die maximale Vitamin-C-Konzentration im Blut dieser Person beträgt also rund 25,18  $\mu\text{g/ml}$ .

Eine Überprüfung, ob an der berechneten Stelle tatsächlich ein Maximum vorliegt, z. B. mithilfe der 2. Ableitung, sowie eine Überprüfung von Randstellen sind für die Punktevergabe nicht erforderlich.

c2)

25,18 mg/L	<input checked="" type="checkbox"/>

## Nemo (B\_364) Lösung

a)  $y'_0(x) = \frac{33}{256} \cdot x^2 - \frac{33}{32} \cdot x + 1$  und  $y'_u(x) = \frac{5}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$

$$k_1 = y'_0(4) = -\frac{17}{16} = 1,0625 \text{ und } k_2 = y'_u(4) = \frac{5}{4} = 1,25$$

$$\alpha_1 = \arctan(k_1) = -46,735...^\circ \text{ und } \alpha_2 = \arctan(k_2) = 51,340...^\circ$$

$$\alpha = \alpha_2 - \alpha_1 = 98,075...^\circ \approx 98,08^\circ$$

b)  $t(x) = k \cdot x + d$


$$k = y'_0(1,5) = -\frac{263}{1024}$$

$$t(1,5) = y_0(1,5) \Rightarrow -\frac{263}{1024} \cdot 1,5 + d = \frac{4065}{2048} \Rightarrow d = \frac{2427}{1024}$$

$$t(x) = -\frac{263}{1024} \cdot x + \frac{2427}{1024} \approx -0,26 \cdot x + 2,37$$

# Tunnelzelte (A\_131) Lösung

d)



Es wurde die Kettenregel angewendet („äußere Ableitung  $\times$  innere Ableitung“).  
Der Faktor  $(-1)$  ist die Ableitung der inneren Funktion:  $(-x)' = -1$

## Gruenbruecken \* (B\_495) Lösung

a1)  $a = 10$

a2)  $f(20) = 6$  oder  $6 = 10 \cdot e^{-400 \cdot b}$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:  
 $b = 0,001277\dots$

a3)  $f''(x) = 0$  oder  $-2 \cdot a \cdot b \cdot e^{-b \cdot x^2} \cdot (1 - 2 \cdot b \cdot x^2) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:  
 $x_1 = -19,78\dots$ ;  $x_2 = 19,78\dots$

Die Steigung von  $f$  ist an der Stelle  $x \approx -19,8$  m am größten.

Der Punkt ist auch dann zu vergeben, wenn statt der Lösung  $x_1 \approx -19,8$  die Lösung  $x_2 \approx 19,8$  angegeben ist.

## Carport \* (B\_522) Lösung

a1)  $h(x) = a \cdot \sqrt{x+1} - 0,5$

a2)  $-1,62 = b \cdot \sqrt{0,4}$   
 $b = -2,561\dots$

a3)

$f'(0,1) = h'(-0,9)$	<input checked="" type="checkbox"/>

**Lösungserwartung: Auslastung von Flügen\* (b) - 2\_111, AN4.3 FA1.7, Offenes Antwortformat**

b1)  $V'(d) = 0$

$$d = 3507,5... \text{ km}$$

$$(V''(3507,5...) > 0)$$

b2)  $V(3507,5...) = 3,67...$

$$3,67... \cdot 271 \cdot 35,0... = 34934,1...$$

Die benötigte Menge an Treibstoff beträgt rund 34934 L.

**Lösungserwartung: Weltbevölkerung\* (b) - 2\_115, AG2.4 AG2.5, Offenes Antwortformat**

c1) Maximum der Weltbevölkerung: rund 10,1 Milliarden

Kalenderjahr: 2070

**Lösungserwartung: Spezielle Polynomfunktionen vierten Grades\* - 2\_123, FA1.5, Offenes Antwortformat**

a1)  $f'(x) = 4 \cdot a \cdot x^3 + 2 \cdot b \cdot x$   
 $f''(x) = 12 \cdot a \cdot x^2 + 2 \cdot b$   
 $12 \cdot a \cdot x^2 + 2 \cdot b = 0$

b1)  $f'(x) = 4 \cdot a \cdot x^3 + 2 \cdot b \cdot x$   
 $f'(0) = 0$   
 $f''(x) = 12 \cdot a \cdot x^2 + 2 \cdot b$   
 $f''(0) = 2 \cdot b \neq 0$

$P = (0|y_P)$  ist ein Extrempunkt von  $f$ .

b2)

①	
$b$	<input checked="" type="checkbox"/>

②	
kleiner als 0	<input checked="" type="checkbox"/>

c1)  $e = -2$  bzw.  $e = 2$

**Lösungserwartung: Firmenlogos\* (c) - 2\_117, AG4.1, Offenes Antwortformat**

a1)  $f'(x) = \frac{x}{4}$   
 $f'(4) = 1$   
 $g'(x) = a \cdot (3 \cdot x^2 - 16)$   
 $g'(4) = 32 \cdot a$   
 $32 \cdot a = 1$   
 $a = \frac{1}{32}$

a2) Die Funktion  $g$  ist eine Polynomfunktion 3. Grades.

oder:

Die Funktion  $g''$  ist linear und hat nur 1 Nullstelle.  
(Die Funktion  $g$  kann also nur 1 Wendepunkt haben.)

## Lösung: Pferdesport \* (B\_578)

b1)  $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$

$$f(4) = 0,5$$

$$f(15,5) = 5$$

$$f(27) = 0,5$$

oder:

$$a \cdot 4^2 + b \cdot 4 + c = 0,5$$

$$a \cdot 15,5^2 + b \cdot 15,5 + c = 5$$

$$a \cdot 27^2 + b \cdot 27 + c = 0,5$$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$a = -\frac{18}{529} = -0,0340...$$

$$b = \frac{558}{529} = 1,0548...$$

$$c = -\frac{3359}{1058} = -3,1748...$$

$$f(x) = -0,034 \cdot x^2 + 1,055 \cdot x - 3,175 \quad (\text{Koeffizienten gerundet})$$

b2)  $\alpha = \arctan(f'(4)) = \arctan\left(\frac{18}{23}\right) = 38,047...^\circ$

b3)

$g(x) = f(x - 26)$	<input checked="" type="checkbox"/>

## Lösung: Teich\* (2\_132)

c1)

Die Wassermenge im Teich nimmt ab.	C
Die Wassermenge im Teich nimmt immer schneller zu.	A
Die momentane Änderungsrate der Wassermenge im Teich nimmt ab.	B
Die Wassermenge im Teich nimmt zu.	F

A	(0; 3)
B	(3; 10)
C	(8; 12)
D	(3; 12)
E	(8; 10)
F	(0; 8)

# Kompensationsprüfungsaufgaben

## BHS Jänner 2022 Kompensationsprüfung 1 Aufgabe 2

b1)  $h'(t) = 6 \cdot 0,81^t \cdot \ln(0,81) = -1$


Lösen der Gleichung mittels Technologieeinsatz:

$t = 1,11 \dots$

Etwa 1,1 min nach Versuchsbeginn beträgt die Geschwindigkeit der Abnahme 1 cm/min.

## BHS Oktober 2021 Kompensationsprüfung 1 Aufgabe 3

a1)



Steigung:  $\frac{0,2}{9} = 0,022 \dots \approx 0,02$

Toleranzintervall:  $[0,019; 0,025]$

a2) Die Steigung entspricht der maximalen momentanen Änderungsrate der Höhe.

oder:

Die Steigung entspricht der momentanen Änderungsrate der Höhe nach 31 Tagen.

## BHS Oktober 2021 Kompensationsprüfung 3 Aufgabe 3

a1)  $c'(t) = 24 \cdot e^{-0,4 \cdot t} \cdot (-0,4)$

$c'(0) = -9,6$

Die momentane Änderungsrate beträgt  $-9,6 \frac{\text{mg}}{\text{L} \cdot \text{h}}$ .

Die Angabe der Einheit ist für die Punktvorgabe nicht relevant.

a2)  $24 \cdot e^{-0,4 \cdot t}$  ist für alle  $t$  positiv, und damit sind die Funktionswerte  $24 \cdot e^{-0,4 \cdot t} + 4$  immer größer als 4.

## BHS Oktober 2021 Kompensationsprüfung 4 Aufgabe 2

b2) Berechnung der Stelle des maximalen Gefälles:  $g''(x_w) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$x_w = \frac{16}{3}$

$\alpha = \arctan\left(g'\left(\frac{16}{3}\right)\right) = -12,78 \dots^\circ$

Das maximale Gefälle beträgt rund  $12,8^\circ$  und somit ist das Gefälle im gesamten Intervall kleiner als  $15^\circ$ .

## BHS Juni 2021 Kompensationsprüfung 2 Aufgabe 2

a1)  $m'(t) = 0 \Rightarrow t = 64,3\dots$

$m(64,3\dots) = 207,8\dots$

Die maximale Wirkstoffmenge im Blut beträgt rund 208 mg.

b1) Tangente:

$g(t) = k_T \cdot t + d$

$k_T = m'(t) = -0,49$

Lösung mittels Technologieeinsatz:


$t = 142,61\dots$

Aufstellen der Tangente an  $m$  an der Stelle 142,61... mittels Technologieeinsatz:

$g(t) = -0,49 \cdot t + 248,4$  (Koeffizienten gerundet)

## BHS Mai 2020 Kompensationsprüfung 3 Aufgabe 2

(R):



## AHS Jänner 2023 Kompensationsprüfung 1 Aufgabe 3

b1)  $g'(t) \boxed{<} g'(t+1)$

$g''(t) \boxed{>} 0$

## BHS Mai 2023 Kompensationsprüfung 1 Aufgabe 2

c1) Der maximale Erlös wird bei  $x_0$  (in ME) Spielgeräten erzielt.

## BHS Mai 2023 Kompensationsprüfung 2 Aufgabe 2

b1)  $K'''(t) = 6 \cdot a \cdot t + 2 \cdot b$

Zur Berechnung von Wendestellen werden die Nullstellen von  $K'''$  berechnet.

Da  $K''$  eine lineare Funktion ist, gibt es genau 1 Nullstelle (mit Vorzeichenwechsel) von  $K'''$  und somit hat  $K$  genau 1 Wendestelle.

BHS Jänner 2024 Kompensationsprüfung 1 Aufgabe 3

c1)

