

おやつを食べる前に、まず3食食べられているかを確認してください。おやつは食事の補助です。

おやつを食べるために食事の量を減らしておく、という場合は主食の白ごはん量を減らすことが多いと思います。白ごはんは塩分が少なく、砂糖の入ったお菓子よりも血糖の急上昇も少なくなります。

白ごはんを減らしておやつを食べるよりも白ごはんもおかずも完食してそれでも足りない場合の捕食として食べてください。



それを踏まえた上でおやつの選択は、血液検査のデータをみて最適なものを選ぶことおすすめします。



コンビニのホットスナック（唐揚げやフランクフルトなど）をおやつとして食べる方は、リンが上がりやすいと思います。

たんぱく質の少ないコロケを選んだり、リン吸着薬を飲んでコントロールすることも検討が必要です。

カリウムが高い⇨ポテトチップスよりもクッキーやクラッカー

リンが高い⇨シュークリームよりもカステラ1切れ

塩分摂取量が多い⇨おせんべいよりも葛餅

カリウムもリンも低い⇨プリンやアイスクリーム

糖尿病を合併されている方は、おやつを食べる時間を食後すぐのデザートとして食べることをおすすめします。

空腹時におやつを食べると血糖値が急激に上がり

血糖コントロールの悪化を招きます。

食べ過ぎないように量は控えてください。

