

●血液透析をお受けになっている方へ●

リンコントロールのためのワン・ツーステップ

●腎臓・代謝病治療機構 中尾 俊之先生 ●東京家政学院大学 教授 金澤 良枝先生

1
ステップ

基本を必ず守りましょう

たんぱく質摂取量を適正に(食べ過ぎ注意)

たんぱく質の多い食品にはリンも多く含まれています。

週3回の透析者での1日の適正なたんぱく質摂取量は男性60g、女性50gです。

リン吸着薬の服用を忘れずに(医師の指示どおりに服用)


2
ステップ

基本の次に注意すること


- 乳製品(牛乳、チーズなど)をとり過ぎない。
- レバー、卵類(鶏卵、いくらなど)をとり過ぎない。
- しらす干し、ししゃも、丸干しなどをとり過ぎない。
- 食品添加物の多い食品をとり過ぎない。

タンパク質の多い食品では
リンも多いのです

(食品100g中)

カルシウムの多い食品は
リンも多いのです


(常用量)



●血液透析をお受けになっている方へ●

主な食品のリン含有量

()内の数字がリン含有量です(単位mg)



※可食部：(例)さんま一骨、頭を除いた部分

すべての革新は患者さんのために



中外製薬



ロシュ グループ