

水分制限

① 水をたくさん飲んで来る



② 透析の途中や後半に…



③ 足がつったり



④ 血圧が下がってふらふらする



⑤ 水を飲んでなおす



⑥ 心臓に水がたまって心不全に



繰り返していると、やがては心不全になってしまいます。

水分制限

- ・ 透析後半の低血圧症状
- ・ 高血圧
- ・ こむら返り
- ・ 心臓肥大
- ・ 脳出血

透析患者さんが飲んだ水分（薬を飲むとき用の水やお酒の水分も含みます）は尿として出ていかないので細胞外液の水分としてたまります。その水分を透析によって除きますが、透析で水分を引くと血管の水分が少なくなり、それにともなって血管の外から水分を引きこむという作用が起こります。透析で出ていく水分と血管外から血管内へ引き込む水分の量とスピードが同じであれば体に負担はかかりませんが、透析の除水スピードが速い場合に低血圧や下肢つりが起こります。

また毎回の除水量が多いと、心臓に負荷がかかって心不全をきたす恐れがあります。

次の透析までの間、定期的に体重を測るようにしましょう。透析間の体重増加が中1日の場合ドライウエイトの3％、中2日ドライウエイトの5％までにとどめることが理想です。

◎ドライウエイトとは血液透析で体液管理を行う際に目標とする体重で、「体液量が適

正で、透析中に過度の血圧低下を生ずることなく、かつ長期的にも心血管系への負担が少ない体重」と定義されます。ドライウエイトの設定は胸部エックス線写真による心胸比や血液透析中の血圧変化などをみて行います。

◎1日の水分摂取量は「ドライウエイト×1.5 ml」を目安にしてください。これは薬を飲む為の水も入れての飲水量です。(維持血液透析ガイドライン:血液透析処方より)