

カリウム) 生果物・ドライフルーツ・芋類などに多く含まれます

ひと昔前までは、生野菜もいっさい食べないようにしましょうと栄養指導することもありましたが、現在では野菜を食べることで便秘予防や野菜のもつ抗酸化作用を期待することも重要視されてきています。とはいえ食べ過ぎは禁物です。野菜ジュースや青汁はカリウムが非常に多いので気をつけましょう。果物は1日80g程度の摂取量に控えるなど量や食べる頻度を注意してください。また、ポテトフライは火が通っているからカリウムは少ないと思われがちですが、芋類は煮ても焼いても油で揚げてもカリウムは多いので注意してください。ポテトチップスなどスナック菓子でもカリウムは多いです。



リン) 乳製品や骨ごと食べるような小魚、加工食品に多く含まれます。



牛乳やチーズはリンが多く含まれます。乳製品を使用した洋菓子もリンが上がる人が多いようです。加工食品のリンは少量でも体への吸収率が高くリンが上がりやすくなります。添加物のリンは体への吸収スピードも速いと言われていて、食直後に服薬するリン吸着薬ではタイミング的に間に合わない場合もあるそうです。カップ麺やハンバーガーなどはできるだけ食べるのを避けたほうが良さそうです。

食塩・水分摂取量) 透析患者さんでは透析間体重増加が多いと体に負担がかかります。

食塩摂取量は1日6g未満を目安に、水分摂取量はできるだけ少なくする必要があります。

透析間体重コントロールは水分摂取量を減らすことからよりも食塩摂取量を減らすことから始めてみてください。

例えば、おやつにせんべいを食べたときや、外食でラーメンを食べたとき、旅行先の宿でたくさんのご馳走を食べたときは食後数時間のどが渇いて仕方がないこと経験ないでしょうか？

塩分の多い食品を食べて体内の塩分某度が高くなると体の恒常性を維持するため、高くなった体液の塩分濃度を薄めようと水分が必要になり喉が渇きます。

8gの食塩摂取で無尿の場合は1リットルの水を必要とします。さらに透析患者さんの場合、味の感じ方が鈍くなっている人も多く、塩辛く感じる濃度がより濃いものに偏ってしまっていて、気づかないまま過剰な食塩摂取をしていることがあるようです。

