

LINE登録者限定

# 体のサイン記録ノート

2週間の記録シート ・ ふり返り ・ 受診メモ

「気のせい」を、理由のある反応に変える

こころの相談室 いしずえ

公認心理師 松本 龍児

## 体のサインは、心が言葉にできなかったことを 代わりに伝えていることがあります

お腹が痛くなる、頭が締めつけられる、のどが詰まる、眠れない。支援の仕事をしていると、心より先に、体にサインが出る場合があります。

けれど、症状が「いつ襲ってくるかわからないもの」のままだと、不安が症状を強め、症状がさらに不安を強める悪循環が起こりやすくなります。

このノートは、2週間だけ体のサインを記録して、「**どんな場面のあとに、どこに出やすいか**」が見える形にするためのものです。パターンが見えると、症状は「理由のある反応」に変わります。そして、受診のときに医師へ正確に伝える材料にもなります。

### このノートの使い方

- 1 毎晩1分、記録シートの1行を埋める(書けない日は空欄でOK)
- 2 2週間たったら、「ふり返り」のページで共通点を探す
- 3 受診するときは、「**受診メモ**」を書いて持っていく
- 4 しんどい日は、最後のページの「**体がほどける1分ワーク**」を試す

印刷して手書きでも、スマホのメモに同じ項目を書き写しても構いません。正確さより、続けられることを優先してください。

### 先に確かめてほしいこと

このノートは診断や治療の代わりではありません。症状が続いている場合は、まず医療機関で体の病気がないかを確かめてください。突然の激しい頭痛、手足のまひやしびれ、強い胸の痛みや息苦しさがあるときは、記録より先に、すぐに受診してください。

書くのは、この4つだけです

| 日付           | ① 体のサイン<br>どこに・どんな・強さ0~10              | ② その前の場面<br>いつ・何があったか  | ③ 飲み込んだ気持ち<br>言えなかったこと・こらえたこと           | ④ 休めた度<br>0~10     |
|--------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 10/14<br>(月) | 夕方、頭が締めつけられる(6)<br>のどの詰まり感(4)<br>頭痛薬1回 | 午前に家族との面談。午後は<br>ずっと記録 | 家族から強い口調で言われ<br>て、言い返したかったけど笑<br>顔で対応した | 3/10<br>昼休みも<br>記録 |
| 10/19<br>(土) | 特になし(0)                                | 休日。午前中ゆっくり寝た           | —                                       | 7/10               |

書くときのコツ

- ・ ①は部位と強さだけで十分です。薬を飲んだ日は「薬1回」と書き添えてください(飲む日数の把握は、受診のときにとても役立ちます)。
- ・ ②は事実だけ。良い・悪いの評価はいりません。
- ・ ③が空欄でも大丈夫です。「わからない」と書くのもひとつの記録です。支援職は、自分の気持ちに気づきにくくなっていることが多く、書けないこと自体が大事なサインになります。
- ・ 症状がない日も書いてください。「出なかった日」と比べることで、パターンが見えてきます。

なぜ「飲み込んだ気持ち」を書くのか

言いたいことを抑えたり、強い感情をこらえたりするとき、体は緊張します。のど、肩、お腹——どこに出やすいかは人によって違いますが、「こらえた日」と「症状が出た日」が重なっていることに気づく人は少なくありません。

1週目      月      日 ～      月      日

| 日付                  | ① 体のサイン<br>どこに・どんな・0～10 | ② その前の場面 | ③ 飲み込んだ気持ち | ④ 休めた度<br>0～10 |
|---------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |

2週目      月      日 ～      月      日

| 日付                  | ① 体のサイン<br>どこに・どんな・0～10 | ② その前の場面 | ③ 飲み込んだ気持ち | ④ 休めた度<br>0～10 |
|---------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |
| ____/____<br>(____) |                         |          |            | /10            |

## 共通点を探してみましょう

記録を見返しながら、思いついたことを書いてください。答えが出なくても構いません。

**Q1** 症状が強かった日(6以上)は、どんな場面のあとでしたか。

---

---

**Q2** 症状が出なかった日・軽かった日は、何が違いましたか。

---

---

**Q3** 「③ 飲み込んだ気持ち」と、症状が出た日は重なっていましたか。

---

---

**Q4** 「④ 休めた度」が低い日が、何日続いていましたか。

---

---

**Q5** 2週間で、頭痛薬や胃腸薬などを飲んだのは何日でしたか。

\_\_\_\_\_ 日 / 14日中

### ふり返しで見えてきやすいこと

- ・ 休日に軽くなる → 症状が働き方と連動している可能性
- ・ こらえた日に出る → 感情を抑える場面が体の緊張になっている可能性
- ・ 休めた度が低い日が続いたあとに出る → 回復が追いついていない可能性
- ・ 薬を飲む日が月10日を超えそう → 薬の飲みすぎによる頭痛にも注意。医師に相談を

## 診察室で、伝えたいことを伝えるために

診察の時間は短く、緊張して言いたいことを忘れがちです。書いて持っていき、そのまま見せても構いません。

### いつから

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月ごろから

### 強さと頻度

強さ \_\_\_\_ /10 週に \_\_\_\_ 日くらい

### どこに・どんな症状

---

---

### 飲んでいる薬・飲んだ日数

---

---

### どんなときに強くなる/軽くなる

---

---

### 生活・仕事への影響

---

---

### 当てはまるものに印を

☐ 体重が減っている

☐ 発熱が続いている

☐ 飲み込みにくい・つかえる

☐ 症状がどんどん悪化している

☐ 血便・黒い便がある

☐ しびれ・まひがある

### 医師に聞きたいこと(3つまで)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

### まず行く場所の目安

お腹 → 内科・消化器内科 / 頭痛 → 内科・脳神経内科・頭痛外来 / のど → 耳鼻咽喉科 / 動悸・めまい・

だるさ → 内科

体の病気が見つからず、ストレスとの関係が強いとき → 心療内科

## しんどい日に、ひとつだけ

症状を「消す」ためではなく、ずっと入りっぱなしの力を、少しだけ抜くためのワークです。仕事の合間でもできます。

### ① 吐く息を長くする(30秒)

4つ数えて鼻から吸い、6～8つ数えて口からゆっくり吐く。これを3回。吐く息を長くすると、体のブレーキ側の働きが入りやすくなります。

### ② あご・舌・肩をゆるめる(20秒)

奥歯が触れていたら離す。舌の力を抜いて、上あごから下ろす。肩をいったん耳まで上げて、ストンと落とす。

### ③ 温かいものを、ゆっくり飲む(10秒～)

白湯やお茶を、のどを通る温かさを感じながら飲む。「今、ここ」に注意を戻す小さな合図になります。

## おわりに

体のサインに気づけたのは、あなたが弱いからではありません。それだけ長いあいだ、自分を後回しにして、誰かのために踏ん張ってきたということです。

記録をつけてみて、「ひとりで整理するのは難しい」と感じたら、いつでも相談してください。体の治療と並行して、体に出るほど張りつめてきた働き方を、一緒に整理することができます。

### あわせて読む

ストレスによる体の症状チェック(20項目)

[ishizue-counseling.jp/articles/psychosomatic-check](http://ishizue-counseling.jp/articles/psychosomatic-check)

心身症とは——ストレスが体に出るしくみ

[ishizue-counseling.jp/articles/psychosomatic-what](http://ishizue-counseling.jp/articles/psychosomatic-what)

緊急時の相談窓口:よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)／いのちの電話 0570-783-556(10時～22時)