

Quicksort

Esempio di quicksort con pseudocodice.

Si esaminano i confronti del quicksort. La parte importante è il partizionamento perché poi si effettuano solo due chiamate

ricorsive. Ogni partizionamento dovrà confrontare il perno con tutti gli altri valori, quindi $n-1$ poi si dovrà aggiungere anche $+2$

Costo partizionamento = $n-1+2 = n+1$

perché si fanno una coppia di confronti arrivando allo scambio degli indici i e j .

Dimostrazione caso medio

I partizionamenti sono n .

Per come l'algoritmo è sviluppato la posizione degli elementi ha un ruolo fondamentale.

Ci sono tre casi: ottimo, pessimo e medio.

Ottimo: le partizioni sono più o meno simili.

Pessimo: Una partizione è vuota e l'altra ha i restanti elementi. (Se il vettore è quasi ordinato o ordinato).

Nel caso pessimo si avrà C_n :

$$C_n = C_{n-1} + n + 1 \rightarrow C_n = O(n^2)$$

Condizione iniziale $C_0 = 0$

$$\begin{aligned} C_n &= C_{n-2} + n + (n + 1) \\ &= C_{n-3} + n - 1 + n + (n + 1) \\ &= C_{n-4} + n - 2 + n - 1 + n + (n + 1) \\ &= C_0 + 2 + 3 + \dots + n + (n + 1) \\ &= \sum_{k=2}^{n+1} (k) \end{aligned}$$

Cioè la somma dei primi numeri interi partendo da 2 che è

$$\sum_{k=0}^n (k) = [n(n + 1)]/2 \text{ è la formula di Gauss normale}$$

$$\sum_{k=2}^{n+1} (k) - 1 = [(n + 2)(n + 1)]/2 \text{ è la formula per } k=2$$

QS caso medio

a vettore di dimensione n

Si ipotizza che il vettore contenga una qualsiasi permutazione di n valori, i possibili input sono $n!$ I valori sono tutti distinti mescolati a caso.

Si può dire che il vettore contiene i numeri da 1 a n (1,2,...,n)

Esaminiamo la versione dell algoritmo in cui il perno sia l elemento a destra

$$\begin{array}{c} [\quad \quad \quad | j \quad] \\ [\quad \quad | j | \quad \quad] \\ < j \quad \quad > j \end{array}$$

Il primo sottovettore ha dimensione $j-1$ il secondo sottovettore $n-j$

Probabilità che il perno sia j (j che divide il vettore con i partizionamenti simili) è $\frac{1}{n}$ cioè $\frac{(n-1)!}{n!}$

Il numero medio di confronti, cioè arrivare a j nel mezzo è

$$C_n = (n+1)_{\text{costoPartizionamento}} + \frac{1}{n} \text{probalitaDelPerno} * \sum_{j=1}^n [C_{j-1} + C_{n-j}]_{\text{costoChiamateRicorsive}}$$

Condizione iniziale è $C_0 = 0$

Condizione iniziale ci porta a dire che $C_1 = 2$

Nella sommatoria ci sono le due quantità, il primo termine assumerà i valori da C_0 fino a C_{n-1} , il secondo da C_{n-1} fino a C_0

Dato che si somma due volte la stessa cosa si può scrivere

$$C_n = (n+1) + \frac{2}{n} \sum_{j=0}^{n-1} [C_j] \text{ si moltiplica tutto per } n$$

$$nC_n = n(n+1) + 2 \sum_{j=0}^{n-1} [C_j]$$

Si vuole eliminare la somma e si parte scrivendo la ricorrenza con $n-1$

$$(n-1)C_{n-1} = (n-1)n + 2 \sum_{j=0}^{n-2} [C_j]$$

Facendo la differenza

$$\begin{aligned} nC_n - (n-1)C_{n-1} &= n(n+1) + 2 \sum_{j=0}^{n-1} [C_j] \\ &- (n-1)n - 2 * \sum_{j=0}^{n-2} [C_j] \\ &= n(n+1) - (n-1)n + 2 * C_{n-1} \\ &= 2n + 2 * C_{n-1} \end{aligned}$$

$$nC_n - (n-1)C_{n-1} = 2n + 2 * C_{n-1}$$

$$\Rightarrow nC_n = 2n + (n+1)C_{n-1}$$

Si vuole trasformare l'espressione dividendo tutto per $n(n+1)$

$$\frac{nC_n}{n(n+1)} = \frac{2n}{n(n+1)} + \frac{(n+1)C_{n-1}}{n(n+1)}$$

$$\frac{C_n}{n+1} = \frac{2}{n+1} + \frac{C_{n-1}}{n}$$

$$a_n \quad a_{n-1}$$

L'espressione è più semplice e senza la somma

Si itera su $\frac{C_{n-1}}{n}$

$\frac{2}{n+1} + \frac{C_{n-1}}{n} = \frac{2}{n+1} + \frac{2}{n} + \frac{C_{n-2}}{n-1}$ questo passaggio si può iterare fino ad arrivare alla condizione iniziale

$$\frac{C_n}{n+1} = \frac{2}{n+1} + \frac{2}{n} + \frac{2}{n-1} + \frac{2}{n-2} \dots$$

$$= \sum_{k=3}^{n+1} \frac{2}{k} + \frac{C_1}{2}$$

si sostituisce C_1 con 2 e si cambia il valore di k da cui si inizia la sommatoria

$$= \sum_{k=2}^{n+1} \frac{2}{k}$$

Si arriva a dire quindi che

$$\frac{C_n}{n+1} = 2 \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k}$$

$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ per i numeri armonici

Essendo quasi simile alla sommatoria ripresa dai numeri armonici a meno del K che parte da 2 si inserisce l'n-esimo numero armonico meno 1

$$\frac{C_n}{n+1} = 2 \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k}$$

$$\Rightarrow 2 \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - 1$$

Si toglie dal denominatore (n+1) e si ha:

$$C_n = 2(n+1)(H_{n+1} - 1)$$

Fine Dimostrazione

La formula precedente è per i confronti si dovrà studiare anche la formula per gli scambi. Si userà sempre lo stesso trucco sulle somme

Formula degli scambi

$$S_n = \frac{n-2}{6} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (S_{j-1} + S_{n-j})$$

