

 		www.perigord-as.com 2409-260	
WO:	ISTURISA-MENA-all-LL-02-PLFT0301B	Production Site: PCI, Tredegar, Wales, UK	
Comp. Description:	ISTURISA-MENA-all-LL	ACC: Melanie Kamke	
		Printing Colours: Black	Printed Prefixes On Artwork: n.a.
Comp. No. New:	PLFT0301B MENA		Variable Data In Line: n.a.
Comp. No. Old:	PLFT0301A MENA		
Format/Dimension:	655 x 300 mm		
Tech. Drawing No.:	ISTURISA LEAFLET SPECIFICATION 200121 V1		
		Technical Colours: Cutting Dimensions Guides	Printed Prefixes In Line: n.a.
Min. Font Size Text (RA):	11 pt		
Font Type:	News Gothic Bold, Regular; TimesNewRomanPSMT, BoldMT;		
Proof No.:	4	08.05.2025 A. Tsvetanova	
! PLEASE TURN OVERPRINTING ON !			

نشرة العبوة: معلومات للمريض إستوريزا 1 ملغ أقراص مغلفة إستوريزا 5 ملغ أقراص مغلفة إستوريزا 10 ملغ أقراص مغلفة أوزيلودروستات ▼ يخضع هذا الدواء للمراقبة الإضافية، وهذا ما يسمح بسرعة اكتشاف المزيد من معلومات السلامة الجديدة. ويمكنكم تقديم المساعدة بالإبلاغ عن أي أعراض جانبية قد تُصابون بها. راجع نهاية القسم 4 لمعرفة كيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية. اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك. - احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى. - إذا كانت لديك المزيد من الأسئلة، فاسأل طبيبك أو الصيدلي. - هذا الدواء تم وصفه لك وحذك. لا تَقمُ بإعطائه للآخرين، فقد يسبب لهم الضرر، حتى وإن كانت الأعراض التي لديهم هي الأعراض نفسها التي لديك. - إذا تعرّضت لأي آثار جانبية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي. ويشمل هذا أي آثار جانبية مُحتملة غير مدرجة في هذه النشرة. راجع القسم 4. ما محتويات هذه النشرة؟ - ما هو إستوريزا، وفيم يُستخدم - ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا - كيفية تناول إستوريزا - الآثار الجانبية المُحتملة - كيفية تخزين إستوريزا - محتويات العبوة ومعلومات إضافية	أخبر طبيبك قبل تناول إستوريزا، إذا كان أيُّ مما يلي ينطبق عليك: - إذا كنت تعاني من اضطراب في القلب أو اضطراب في ضربات القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب، ويشمل ذلك ما يلي: - حالة تُسمّى متلازمة كيويتي المُطلّوة (استطالة فترة كيويتي). - إذا كنت تعاني من مرض في الكبد، قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعتك من إستوريزا. اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من اثنين أو أكثر من هذه الأعراض أثناء علاجك بإستوريزا. قد يشير هذا إلى أنك تعاني من قصور الغدة الكظرية (انخفاض مستويات الكورتيزول): - مرضع - دوار خفيف - تعب - فقدان الشهية - الغثيان (الشعور بالإعياء) - القيء بعد التوقف عن استخدام إستوريزا، قد تستمر هذه الأعراض لعدة أشهر. يجب عليك الاتصال بطبيبك حيث قد تحتاج إلى مرقية و/أو علاج إضافي. الفحوصات قبل وأثناء العلاج سوف يُجرى لك طبيبك فحصًا للدم و/أو البول قبل أن تبدأ العلاج، وسيُكرّر ذلك الفحص بانتظام أثناء العلاج. الغرض من هذا الفحص هو اكتشاف أي تشوهات مُحتملة في مستويات المغنيسيوم والكالسيوم والپوتاسيوم لديك، وقياس مستويات الكورتيزول كذلك. قد يقوم طبيبك بتغيير جرعتك بناءً على النتائج. قد يسبب هذا الدواء تأثيرًا غير مرغوب (ويُسمّى استطالة كيويتي) على وظائف القلب، ولذلك سيُقوم طبيبك أيضًا بفحص هذا التأثير عن طريق إجراء تخطيط كهربية القلب (ECG) قبل أن تبدأ العلاج وأثناء العلاج. إذا كانت متلازمة كوشينغ لديك ناجمة عن ورم حميد (يُسمّى الورم الغُدّي) في الغدة النخامية، فقد يفكر طبيبك في إيقاف علاجك إذا أظهر فحص الغدة النخامية أن الورم الغُدّي قد امتد إلى المناطق المجاورة.
1. ما هو إستوريزا وفيم يُستخدم ما هو إستوريزا، وفيم يُستخدم - ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا - كيفية تناول إستوريزا - الآثار الجانبية المُحتملة - كيفية تخزين إستوريزا - محتويات العبوة ومعلومات إضافية	ما هو إستوريزا إستوريزا هو دواء يحتوي على مادة فعّالة تُسمّى الأوزيلودروستات. فيم يُستخدم إستوريزا يُستخدم إستوريزا العلاج البالغين الذين يعانون من متلازمة كوشينغ الداخلية المنشأ، وهي حالة يُفرز فيها الجسم كميات كبيرة جدًا من هرمون يُسمّى الكورتيزول. ويمكن لهذه الزيادة الكبيرة في الكورتيزول أن تسبّب في مجموعة من الأعراض مثل زيادة الوزن (خاصةً في المنطقة المحيطة بالخصر)، والوجه على الشكل القمري وسهولة الإصابة بالكدمات وعدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة شعر الجسم والوجه والشعور بالضعف أو التعب أو التورّع بشكل عام.
كيف يعمل إستوريزا يمنع إستوريزا الإنزيم الرئيسي الذي يصنع الكورتيزول في الغدد الكظرية. ويكون تأثير ذلك هو تقليل الإفراط في إنتاج الكورتيزول وتحسين أعراض متلازمة كوشينغ الداخلية المنشأ.	لا يُنصح بهذا الدواء للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وذلك بسبب نقص البيانات المتعلقة بهؤلاء المرضى.

2. ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا لا تتناول إستوريزا في الحالات التالية: إذا كنت تعاني من الحساسية من المادة الفعّالة الأوزيلودروستات أو أيٍّ من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6).	1. ما هو إستوريزا وفيم يُستخدم ما هو إستوريزا، وفيم يُستخدم - ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا - كيفية تناول إستوريزا - الآثار الجانبية المُحتملة - كيفية تخزين إستوريزا - محتويات العبوة ومعلومات إضافية
كيف يعمل إستوريزا يمنع إستوريزا الإنزيم الرئيسي الذي يصنع الكورتيزول في الغدد الكظرية. ويكون تأثير ذلك هو تقليل الإفراط في إنتاج الكورتيزول وتحسين أعراض متلازمة كوشينغ الداخلية المنشأ.	3. كيفية تناول إستوريزا أخبر طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت حاملًا أو تقومين بالرضاعة الطبيعية أو تعتقدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل. وسائل منع الحمل يجب على النساء اللواتي يمكن أن يصبحن حوامل استخدام وسيلة فعّالة لمنع الحمل أثناء العلاج، ولمدة أسبوعٍ على الأقل بعد تناول آخر جرعة. استشري طبيبك عن الحاجة إلى وسائل منع الحمل قبل بدء تناول إستوريزا. القيادة واستخدام الآلات قد يسبب العلاج بإستوريزا الشعور بالدوار أو التعب. لا تقُدِ السيارة أو تقم بتشغيل الآلات إذا شعرت بهذه الأعراض. تعاني من قصور الغدة الكظرية (انخفاض مستويات الكورتيزول): - ضعف - دوار خفيف - تعب - فقدان الشهية - الغثيان (الشعور بالإعياء) - القيء بعد التوقف عن استخدام إستوريزا، قد تستمر هذه الأعراض لعدة أشهر. يجب عليك الاتصال بطبيبك حيث قد تحتاج إلى مضاعفة جرعة الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) لكل قرص، أي أنه "خالي من الصوديوم" بشكل أساسي.
4. الآثار الجانبية المُحتملة مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبّب هذا الدواء في حدوث آثار جانبية، وإن لم يكن الجميع يحدث لهم ذلك. قد تكون بعض الآثار الجانبية للدواء خطيرة يُرجى ملاحظة مايلي بشكل خاص: أخبر طبيبك فورًا إذا كنت تعاني من اضطراب في القلب أو اضطراب ضربات القلب، مثل تسارع ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب، حتى أثناء الراحة، أو خفقان القلب، أو فقدان الوعي أو الإغماء (قد يكون هذا علامة على حالة تُسمّى استطالة فترة كيويتي، أحد الأعراض الجانبية التي قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص). أخبر طبيبك فورًا إذا كانت لديك اثنان أو أكثر من هذه الأعراض: الضعف، الدوار الخفيف، التعب (الإرهاق)، قلّة الشهية، الغثيان (الشعور بالمرض)، القيء. قد يشير هذا إلى أنك تعاني من قصور الغدة الكظرية (انخفاض مستويات	4. الآثار الجانبية المُحتملة مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبّب هذا الدواء في حدوث آثار جانبية، وإن لم يكن الجميع يحدث لهم ذلك. قد تكون بعض الآثار الجانبية للدواء خطيرة يُرجى ملاحظة مايلي بشكل خاص: أخبر طبيبك فورًا إذا كنت تعاني من اضطراب في القلب أو اضطراب ضربات القلب، مثل تسارع ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب، حتى أثناء الراحة، أو خفقان القلب، أو فقدان الوعي أو الإغماء (قد يكون هذا علامة على حالة تُسمّى استطالة فترة كيويتي، أحد الأعراض الجانبية التي قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص). أخبر طبيبك فورًا إذا كانت لديك اثنان أو أكثر من هذه الأعراض: الضعف، الدوار الخفيف، التعب (الإرهاق)، قلّة الشهية، الغثيان (الشعور بالمرض)، القيء. قد يشير هذا إلى أنك تعاني من قصور الغدة الكظرية (انخفاض مستويات

5. كيفية تخزين إستوريزا يُحفظ هذا الدواء بعيدًا عن مرأى ومتناول الأطفال ولا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المُدوّن على الملصق والعلبة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر. لا تقم بتخزين الدواء في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية. قُم بتخزين الدواء في العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة. لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. سوف تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.	6. محتويات العبوة ومعلومات إضافية ما هي محتويات دواء إستوريزا المادة الفعّالة هي أوزيلودروستات 1 أو 5 ملغ أوزيلودروستات أو 10 ملغ أوزيلودروستات.
المكونات الأخرى هي: - في لب القرص: السليلوز الدقيق، التيلور، مانتينول، كروس كارميلوز الصوديوم (انظر القسم 2 "يحتوي إستوريزا على الصوديوم")، ستيرات المغنيسيوم، السيليكا الغروية اللاماتية. - في مادة الغلاف: الهيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، أكاسيد الحديد (E172، انظر أدناه)، مكروغول والثالك. - إستوريزا 1 ملغ أقراص مغلفة، وتتكوّن مادة الغلاف من أكسيد الحديد الأصفر وأكسيد الحديد الأحمر. - إستوريزا 5 ملغ أقراص مغلفة، وتتكوّن مادة الغلاف من أكسيد الحديد الأصفر. - إستوريزا 10 ملغ أقراص مغلفة، وتتكوّن مادة الغلاف من أكسيد الحديد الأصفر وأكسيد الحديد الأحمر وأكسيد الحديد الأسود. كيف يبدو دواء إستوريزا، وما محتويات العبوة يتوافر دواء إستوريزا في عبوات تحتوي على 60 قرصًا مغلفًا (6 شرائط × 10 أقراص). أقراص 1 ملغ بلون أصفر فاتح، مستديرة، غير مُحزّزة ومعلّمة بالرقم "1" على جانب واحد. القطر التقريبي 6.1 ملم. أقراص 5 ملغ باللون الأصفر، مستديرة، غير مُحززة ومعلّمة بالرقم "5" على جانب واحد. القطر التقريبي 7.1 ملم. أقراص 10 ملغ باللون البني البرتقالي الفاتح، مستديرة، غير مُحززة ومعلّمة بالرقم "10" على جانب واحد. القطر التقريبي 9.1 ملم.	المكونات الأخرى هي: - في لب القرص: السليلوز الدقيق، التيلور، مانتينول، كروس كارميلوز الصوديوم (انظر القسم 2 "يحتوي إستوريزا على الصوديوم")، ستيرات المغنيسيوم، السيليكا الغروية اللاماتية. - في مادة الغلاف: الهيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، أكاسيد الحديد (E172، انظر أدناه)، مكروغول والثالك. - إستوريزا 1 ملغ أقراص مغلفة، وتتكوّن مادة الغلاف من أكسيد الحديد الأصفر وأكسيد الحديد الأحمر. - إستوريزا 5 ملغ أقراص مغلفة، وتتكوّن مادة الغلاف من أكسيد الحديد الأصفر. - إستوريزا 10 ملغ أقراص مغلفة، وتتكوّن مادة الغلاف من أكسيد الحديد الأصفر وأكسيد الحديد الأحمر وأكسيد الحديد الأسود. كيف يبدو دواء إستوريزا، وما محتويات العبوة يتوافر دواء إستوريزا في عبوات تحتوي على 60 قرصًا مغلفًا (6 شرائط × 10 أقراص). أقراص 1 ملغ بلون أصفر فاتح، مستديرة، غير مُحزّزة ومعلّمة بالرقم "1" على جانب واحد. القطر التقريبي 6.1 ملم. أقراص 5 ملغ باللون الأصفر، مستديرة، غير مُحززة ومعلّمة بالرقم "5" على جانب واحد. القطر التقريبي 7.1 ملم. أقراص 10 ملغ باللون البني البرتقالي الفاتح، مستديرة، غير مُحززة ومعلّمة بالرقم "10" على جانب واحد. القطر التقريبي 9.1 ملم.
مالك رخصة التسويق ريكورداتي رير ديزيزس برج هيكلا 52 شارع جنرال ديغول إف – 92800 بونو فرنسا الشركة المُصنّعة بالجملة والمسؤولة عن التعبئة الأولية والثانوية بين فارماسوتيكال سيرفيسيز ليميتد الوحدات 23-24، تفر نأوباك المنطقة الصناعية، تفر نأوباك، تريديغار، 3AA NP22، المملكة المتحدة الشركة المُصنّعة المسؤولة عن تصريح النهائي ميلمانوت هيلث كير المحدودة قطعة 7، شمال المدينة الحرم الجامعي للأعمال، ستامولين، مقاطعة ميث، K32 YD60، أيرلندا	مالك رخصة التسويق ريكورداتي رير ديزيزس برج هيكلا 52 شارع جنرال ديغول إف – 92800 بونو فرنسا الشركة المُصنّعة بالجملة والمسؤولة عن التعبئة الأولية والثانوية بين فارماسوتيكال سيرفيسيز ليميتد الوحدات 23-24، تفر نأوباك المنطقة الصناعية، تفر نأوباك، تريديغار، 3AA NP22، المملكة المتحدة الشركة المُصنّعة المسؤولة عن تصريح النهائي ميلمانوت هيلث كير المحدودة قطعة 7، شمال المدينة الحرم الجامعي للأعمال، ستامولين، مقاطعة ميث، K32 YD60، أيرلندا
2. ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا لا تتناول إستوريزا في الحالات التالية: إذا كنت تعاني من الحساسية من المادة الفعّالة الأوزيلودروستات أو أيٍّ من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6).	2. ما هو إستوريزا وفيم يُستخدم ما هو إستوريزا، وفيم يُستخدم - ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا - كيفية تناول إستوريزا - الآثار الجانبية المُحتملة - كيفية تخزين إستوريزا - محتويات العبوة ومعلومات إضافية
كيف يعمل إستوريزا يمنع إستوريزا الإنزيم الرئيسي الذي يصنع الكورتيزول في الغدد الكظرية. ويكون تأثير ذلك هو تقليل الإفراط في إنتاج الكورتيزول وتحسين أعراض متلازمة كوشينغ الداخلية المنشأ.	3. كيفية تناول إستوريزا أخبر طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت حاملًا أو تقومين بالرضاعة الطبيعية أو تعتقدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل. وسائل منع الحمل يجب على النساء اللواتي يمكن أن يصبحن حوامل استخدام وسيلة فعّالة لمنع الحمل أثناء العلاج، ولمدة أسبوعٍ على الأقل بعد تناول آخر جرعة. استشري طبيبك عن الحاجة إلى وسائل منع الحمل قبل بدء تناول إستوريزا. القيادة واستخدام الآلات قد يسبب العلاج بإستوريزا الشعور بالدوار أو التعب. لا تقُدِ السيارة أو تقم بتشغيل الآلات إذا شعرت بهذه الأعراض. تعاني من قصور الغدة الكظرية (انخفاض مستويات الكورتيزول): - ضعف - دوار خفيف - تعب - فقدان الشهية - الغثيان (الشعور بالإعياء) - القيء بعد التوقف عن استخدام إستوريزا، قد تستمر هذه الأعراض لعدة أشهر. يجب عليك الاتصال بطبيبك حيث قد تحتاج إلى مضاعفة جرعة الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) لكل قرص، أي أنه "خالي من الصوديوم" بشكل أساسي.

دولة الامارات العربية المتحدة قسم القِطعة الدوائية والأجهزة الطبية ص.ب: 1853 هاتف: 80011111 البريد الإلكتروني: pv@ede.gov.ae إدارة الدواء وزارة الصحة ووقاية المجتمع- دبي	دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الرجاء الاتصال بالجهات المعنية في كل دولة هذا المستحضر هو دواء - الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وتتولاه خلفًا للتعليمات يعرّضُك للخطر. - اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلي الذي صرف لك الدواء. - الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفوائده وأضراره. - لا تقطع فترة العلاج المقرّرة لك من تلقاء نفسك. - لا تكرر الوصفة الطبية نفسها دون استشارة الطبيب. - احفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال. مجلس وزراء الصحة العرب اتحاد الصيدالة العرب
1. ما هو إستوريزا وفيم يُستخدم ما هو إستوريزا، وفيم يُستخدم - ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا - كيفية تناول إستوريزا - الآثار الجانبية المُحتملة - كيفية تخزين إستوريزا - محتويات العبوة ومعلومات إضافية	1. ما هو إستوريزا وفيم يُستخدم ما هو إستوريزا، وفيم يُستخدم - ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا - كيفية تناول إستوريزا - الآثار الجانبية المُحتملة - كيفية تخزين إستوريزا - محتويات العبوة ومعلومات إضافية
2. ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا لا تتناول إستوريزا في الحالات التالية: إذا كنت تعاني من الحساسية من المادة الفعّالة الأوزيلودروستات أو أيٍّ من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6).	2. ما هو إستوريزا وفيم يُستخدم ما هو إستوريزا، وفيم يُستخدم - ما يجب أن تعرفه قبل أن تتناول إستوريزا - كيفية تناول إستوريزا - الآثار الجانبية المُحتملة - كيفية تخزين إستوريزا - محتويات العبوة ومعلومات إضافية
كيف يعمل إستوريزا يمنع إستوريزا الإنزيم الرئيسي الذي يصنع الكورتيزول في الغدد الكظرية. ويكون تأثير ذلك هو تقليل الإفراط في إنتاج الكورتيزول وتحسين أعراض متلازمة كوشينغ الداخلية المنشأ.	3. كيفية تناول إستوريزا أخبر طبيبك قبل تناول هذا الدواء إذا كنت حاملًا أو تقومين بالرضاعة الطبيعية أو تعتقدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل. وسائل منع الحمل يجب على النساء اللواتي يمكن أن يصبحن حوامل استخدام وسيلة فعّالة لمنع الحمل أثناء العلاج، ولمدة أسبوعٍ على الأقل بعد تناول آخر جرعة. استشري طبيبك عن الحاجة إلى وسائل منع الحمل قبل بدء تناول إستوريزا. القيادة واستخدام الآلات قد يسبب العلاج بإستوريزا الشعور بالدوار أو التعب. لا تقُدِ السيارة أو تقم بتشغيل الآلات إذا شعرت بهذه الأعراض. تعاني من قصور الغدة الكظرية (انخفاض مستويات الكورتيزول): - ضعف - دوار خفيف - تعب - فقدان الشهية - الغثيان (الشعور بالإعياء) - القيء بعد التوقف عن استخدام إستوريزا، قد تستمر هذه الأعراض لعدة أشهر. يجب عليك الاتصال بطبيبك حيث قد تحتاج إلى مضاعفة جرعة الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) لكل قرص، أي أنه "خالي من الصوديوم" بشكل أساسي.
4. الآثار الجانبية المُحتملة مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبّب هذا الدواء في حدوث آثار جانبية، وإن لم يكن الجميع يحدث لهم ذلك. قد تكون بعض الآثار الجانبية للدواء خطيرة يُرجى ملاحظة مايلي بشكل خاص: أخبر طبيبك فورًا إذا كنت تعاني من اضطراب في القلب أو اضطراب ضربات القلب، مثل تسارع ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب، حتى أثناء الراحة، أو خفقان القلب، أو فقدان الوعي أو الإغماء (قد يكون هذا علامة على حالة تُسمّى استطالة فترة كيويتي، أحد الأعراض الجانبية التي قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص). أخبر طبيبك فورًا إذا كانت لديك اثنان أو أكثر من هذه الأعراض: الضعف، الدوار الخفيف، التعب (الإرهاق)، قلّة الشهية، الغثيان (الشعور بالمرض)، القيء. قد يشير هذا إلى أنك تعاني من قصور الغدة الكظرية (انخفاض مستويات	4. الآثار الجانبية المُحتملة مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبّب هذا الدواء في حدوث آثار جانبية، وإن لم يكن الجميع يحدث لهم ذلك. قد تكون بعض الآثار الجانبية للدواء خطيرة يُرجى ملاحظة مايلي بشكل خاص: أخبر طبيبك فورًا إذا كنت تعاني من اضطراب في القلب أو اضطراب ضربات القلب، مثل تسارع ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب، حتى أثناء الراحة، أو خفقان القلب، أو فقدان الوعي أو الإغماء (قد يكون هذا علامة على حالة تُسمّى استطالة فترة كيويتي، أحد الأعراض الجانبية التي قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص). أخبر طبيبك فورًا إذا كانت لديك اثنان أو أكثر من هذه الأعراض: الضعف، الدوار الخفيف، التعب (الإرهاق)، قلّة الشهية، الغثيان (الشعور بالمرض)، القيء. قد يشير هذا إلى أنك تعاني من قصور الغدة الكظرية (انخفاض مستويات

 RECORDATI RARE DISEASES	 Perigord Pharmaceutical Solutions A Tech Medtronic Company	www.perigord-as.com
WO:	ISTURISA-MENA-all-LL-02-PLFT0301B	Production Site: PCI, Tredegar, Wales, UK
Comp. Description:	ISTURISA-MENA-all-LL	ACC: Melanie Kamke
		Printing Colours: Black
Comp. No. New:	PLFT0301B MENA	Printed Prefixes On Artwork: n.a.
Comp. No. Old:	PLFT0301A MENA	Variable Data In Line: n.a.
Format/Dimension:	655 x 300 mm	
Tech. Drawing No.:	ISTURISA LEAFLET SPECIFICATION 200121 V1	
Technical Colours:	Cutting Dimensions Guides	
Printed Prefixes In Line:	n.a.	
Min. Font Size Text (RA):	11 pt	
Font Type:	News Gothic Bold, Regular; TimesNewRomanPSMT, BoldMT;	
Proof No.:	4	08.05.2025 A. Tsvetanova
! PLEASE TURN OVERPRINTING ON !		