

Choose a pet: --Please choose a class-- ▾

fiche

# Fonctions numériques

## I. Fonction numérique


### Activité :

On considère un rectangle de longueur  $(x-1)\text{cm}$  et de largeur  $(x-2)\text{cm}$  tel que  $x$  un réel supérieur strictement à 2.

On désigne par  $f(x)$  la **surface** de ce rectangle

1. Déterminer l'expression de  $f(x)$
2. Déterminer la surface du rectangle si  $x = 2$  et si  $x = 4$
3. Déterminer les valeurs possibles de  $x$  si  $f(x) = 8$  et si  $f(x) = 12$

### i Définition



Soit  $D$  une partie de  $\mathbb{R}$

On appelle fonction numérique (noté  $f$ ) : toute relation qui a associée chaque nombre réel  $x$  de  $D$  par un seul nombre réel  $y$  qu'on note  $f(x)$  et on écrit

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow f(x) = y$$

- $f(x) = y$  : S'appelle l'image de  $x$  par la fonction  $f$
- Le nombre  $x$  s'appelle antécédent de  $y$  par la fonction  $f$

### Application 0

On considère une fonction numérique définie par  $f(x) = 3x^2 - 1$

1. Déterminer les images de 1 ; -2 et  $\frac{3}{4}$  par la fonction  $f$
2. Déterminer les antécédents, s'ils existent, des nombres suivants 0, 5 et -4 par la fonction  $f$

## II. Ensemble de définition

### Activité :

Soit  $f$  une fonction numérique définie par  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$

- Déterminer les images de 0 ; 2 ;
- Peut-on calculer les images de 1 et -1 par la fonction  $f$  ?

### Définition

On appelle ensemble de définition d'une fonction numérique  $f$ , l'ensemble des nombres réels  $x$  pour lesquels l'image  $f(x)$  est bien définie et se note souvent  $D_f$ . On écrit  $D_f = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in \mathbb{R}\}$ .

### Remarque

Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction  $f$  ; il faut **éliminer** tous les nombres réels pour lesquels

- le dénominateur est nul
- le nombre sous la racine carrée est négatif.

Soient  $P(x)$  et  $Q(x)$  deux fonctions polynômes.

Fonction	Ensemble de definition
$x \rightarrow P(x)$	$D_f = \mathbb{R}$
$x \rightarrow \frac{P(x)}{Q(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) \neq 0\}$
$x \rightarrow \sqrt{P(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0\}$
$x \rightarrow \frac{P(x)}{\sqrt{Q(x)}}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) > 0\}$
$x \rightarrow \sqrt{\frac{P(x)}{Q(x)}}$	$D_f = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\right\}$
$x \rightarrow \frac{\sqrt{P(x)}}{\sqrt{Q(x)}}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0 \text{ et } Q(x) > 0\}$

### +Exemple

Soient  $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$  et  $f(x) = \frac{3x - 1}{2x + 1}$

### Application 1

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes:

$f_1 : x \mapsto x^2 + 3x - 5$	$f_2 : x \mapsto \frac{-2x+4}{3x+4}$	$f_3 : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x^2+x-2}$
$f_4 : x \mapsto \frac{4x^2-5}{\sqrt{2x^2+2x-4}}$	$f_5 : x \mapsto \frac{\sqrt{2-x}}{ x+2 -3}$	$f_6 : x \mapsto \sqrt{\frac{2-x}{4x+2}}$
$f_7 : x \mapsto \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{4x+2}}$	$f_8 : x \mapsto \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)-1}$	

## III. égalité de deux fonctions

### i Définition

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions.  $D_f$  et  $D_g$  sont leurs ensembles de définition respectifs.

On dit que  $f$  et  $g$  sont égales, et on écrit  $f = g$ , si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- $D_f = D_g$
- $f(x) = g(x)$  pour tout  $x \in D_f$

### Exemple 0

Soit  $f(x) = \sqrt{x^2}$  et  $g(x) = |x|$

### Application 2

Déterminer si les deux fonctions  $f$  et  $g$  sont égales dans les cas suivants :

- $f(x) = \frac{1}{x}$  et  $g(x) = \frac{x}{x^2}$

### Exercices

Exercice 8 - page : 277

## IV. représentation graphique

### Activité

On considère la fonction numérique  $f$  définie par  $f(x) = 2x + 1$

Construire le graphe de la fonction  $f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

### Définition :

- Dans un plan muni d'un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  la courbe représentative d'une fonction  $f$ , notée souvent  $(C_f)$ , est l'ensemble des points du plan  $M(x; f(x))$  où  $x \in D_f$
- Autrement dit :

$$M(x, y) \in (C_f) \Leftrightarrow x \in D_f \text{ et } y = f(x)$$

### Remarque :

L'équation  $y = f(x)$  est appelée l'équation de la courbe  $(C_f)$ .

### Exemple 1

Tracer le courbe de  $f : x \rightarrow |x|$

### Application 3

On considère la fonction numérique  $f$  définie par :  $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$

1. Déterminer  $D_f$  l'ensemble de définition de la fonction  $f$ .
2. Déterminer les points appartenant à  $(C_f)$  parmi les points suivants :

$$O(0;0); B\left(3; \frac{9}{4}\right); C(1;1)$$

## V. Fonction paire - Fonction impaire

### Activité

On considère la fonction numérique  $f$  définie par :  $f(x) = |x| - 1$

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $f$ .
2. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , montrer que  $f(-x) = f(x)$
3. Vérifiez que  $f(x) = x - 1$  si  $x \geq 0$  et  $f(x) = -x - 1$  si  $x < 0$
4. En déduire la nature de la courbe  $(C_f)$ , puis tracer  $C_f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .
5. En déduire que la courbe  $C_f$  admet un axe de symétrie à déterminer.

### i Définition

Soit  $D$  une partie de  $\mathbb{R}$ .

On dit que  $D$  est symétrique par rapport à zéro si pour tout  $x \in D$  on a  $-x \in D$ .

### Exemple 2

Déterminer les parties symétriques par rapport à zéro parmi les parties suivantes :

- $[-2 : 2]$
- $[-2 : 1]$
- $[-3 : -2] \cup [2 : 4]$
- $\mathbb{R}$
- $\mathbb{R}^*$
- $[0; +\infty[$
- $\mathbb{R} - \{2\}$

### **i Définition : fonction paire**

On dit que  $f$  est une fonction paire si :

- Si  $x \in D_f$  alors  $-x \in D_f$  ( $D_f$  est symétrique par rapport à zéro )
- Pour tout  $x \in D_f$  on a :  $f(-x) = f(x)$

La courbe d'une fonction paire est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

### **Exemple 3**

Soit  $f(x) = \frac{1}{x^2}$

### **Application 4**

Déterminer si  $f$  est une fonction paire dans les cas suivants :

- $f(x) = x^2 + 3$
- $f(x) = \sqrt{x} + 1$

### **Définition : fonction impaire**

On dit que  $f$  est une fonction impaire si :

- Si  $x \in D_f$  alors  $-x \in D_f$
- Pour tout  $x \in D_f$  on a :  $f(-x) = -f(x)$

La courbe d'une fonction impaire est **symétrique par rapport à l'origine du repère**.

### **Application 5**

Étudier la parité des fonctions :

- $f(x) = \frac{2}{x}$
- $f(x) = x^3 - x$
- $f(x) = |x| - \frac{1}{x^2}$
- $f(x) = \sin(x)$
- $f(x) = \cos(x)$
- $f(x) = \tan(x)$
- $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$
- $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$


### **Exercice**

Tracer une fonction paire et une fonction impaire

## **VI. Variations d'une fonction تغيرات الدالة**

## Activité

Soit  $f$  la fonction numérique représentée ci-contre :



1. Déterminer puis comparer  $f(-2)$  et  $f(-1)$
2. Comment les valeurs de  $f(x)$  change lorsque les valeurs de  $x$  augmentes sur  $[-2; 0]$  ?
3. Déterminer puis comparer  $f(2)$  et  $f(1)$  .
4. Comment les valeurs de  $f(x)$  change lorsque les valeurs de  $x$  augmentes sur  $[0; 2]$  ?

## Definition

Soit la fonction  $f$  et  $a, b \in D_f$


- Si  $a > b$  et  $f(a) \geq f(b)$  alors  $f$  est **croissante**(تزايدية)
- Si  $a > b$  et  $f(a) > f(b)$  alors  $f$  est **strictement croissante**
- Si  $a > b$  et  $f(a) \leq f(b)$  alors  $f$  est **décroissante**(تناقصية)
- Si  $a > b$  et  $f(a) < f(b)$  alors  $f$  est **strictement décroissante**
- Si  $a > b$  et  $f(a) = f(b)$  alors  $f$  est **constante**(ثابتة)

## Exemple 4

Soit  $f(x) = -x + 3$

## Exemple 5

Soit la fonction  $f$



Donner les variations de  $f$

### **Propriété : Taux de variation**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $D$  et  $a, b \in D$

Le Taux de variation est  $T = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$

- Si  $T \geq 0$  alors  $f$  est croissante sur  $I$
- Si  $T \leq 0$  alors  $f$  est décroissante sur  $I$
- Si  $T = 0$  alors  $f$  est constante sur  $I$

### **Exemple 6**

Soit  $f(x) = 2x + 1$

### **Application 6**

Soit  $f(x) = x^2 - 4x + 3$

1. montrer que le taux de variation est :  $T = a + b - 4$
2. étudier la monotonie de  $f$  sur  $] -\infty; 2]$  et  $[2; +\infty[$
3. dresser le tableau de variation de  $f$



## Exercice

Soit  $f(x) = \frac{-x + 2}{x - 1}$

1. Soit  $x, y \in D_f$  Montrer que  $f(x) - f(y) = \frac{-(x - y)}{(x - 1)(y - 1)}$
2. déduire que le taux de variation est :  $T = \frac{-1}{(x - 1)(y - 1)}$
3. étudier la monotonie de  $f$  sur  $] -\infty; 1]$  et  $[1; +\infty[$
4. dresser le tableau de variation de  $f$

## VII. Maximum et minimum d'une fonction

### i Définition

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$


1. On dit  $m$  est un minimum (une valeur minimale) de  $f$  sur  $I$  si pour tout  $x \in I$  on  $f(x) \geq m$
2. On dit  $M$  est un maximum (une valeur maximale) sur  $I$  si pour tout  $x \in I$  on  $f(x) \leq M$
3. un extremum = minimum **ou** maximum

### Exemple 7

Soit  $f$  une fonction définie par  $f(x) = x + \frac{1}{x}$

1. Montrer que 2 est le minimum de  $f$  sur  $\mathbb{R}_*^+$
2. Montrer que -2 est le maximum de  $f$  sur  $\mathbb{R}_*^-$

## Physique



## VIII. Parabole et Hyperbole

### 8.1. Fonction $x \rightarrow ax^2$

#### Activité

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2$  et  $(C_f)$  sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Etudier la parité de la fonction  $f$ .
2. Dédire la propriété géométrique de  $C_f$
3. Etudier la monotonie sur  $\mathbb{R}^+$  puis déduire la monotonie sur  $\mathbb{R}^-$ .
4. Dresser le tableau de variation
5. Construire  $C_f$  la courbe de la fonction  $f$  dans un repère orthonormé.
6. Refaire les mêmes questions pour la fonction  $g$  qui est définie par  $g(x) = -2x^2$

#### Définition


Soit  $a \in \mathbb{R}^*$ .

La courbe représentative de la fonction définie par  $f(x) = ax^2$  dans un repère orthonormé s'appelle une parabole de **sommet** l'origine du repère et l'axe des ordonnées son **axe de symétrie**.


Les variations de la fonction  $f$  :

- Si  $a > 0$  alors la fonction est croissante sur  $\mathbb{R}^+$  et décroissante sur  $\mathbb{R}^-$
- Si  $a < 0$  alors la fonction est croissante sur  $\mathbb{R}^-$  et décroissante sur  $\mathbb{R}^+$

• Si  $a < 0$


$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f(x)$			

• Si  $a > 0$

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f(x)$			

### Exemple 8

$$f(x) = 2x^2$$



### Application 7

Soit  $f$  une fonction sur  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2$

1. Dresser le tableau de variation sur  $\mathbb{R}$ .
2. Donner la nature de  $C_f$  en précisant ses éléments caractéristiques.
3. Construire  $C_f$ .

## 8.2. Fonction $x \rightarrow \frac{a}{x}$

### Activité




Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{x}$  et  $a \in \mathbb{R}$

1. Déterminer  $D_f$
2. Etudier la parité de la fonction  $f$ .
3. Dédire la propriété géométrique de  $C_f$
4. Etudier la monotonie sur  $\mathbb{R}_*^+$ , puis déduire la monotonie sur  $\mathbb{R}_*^-$ .
5. Dresser le tableau de variation

6. Construire  $C_f$  la courbe de la fonction  $f$  dans un repère orthonormé.

### **Définition**

La courbe de la fonction  $f$  s'appelle une hyperbole de centre  $O$  et d'asymptotes les droites d'équations  $x = 0$  et  $y = 0$



### **Application 8**

Soit  $f$  une fonction sur  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{3}{x}$

1. Dresser le tableau de variation sur  $\mathbb{R}$ .
2. Donner la nature de  $C_f$  en précisant ses éléments caractéristiques.

### 3. Construire $C_f$ .


#### **i Propriété : fonction périodique**

On dit que  $f$  est une fonction périodique de période  $T$  si pour tout  $x \in D_f$  :


- $(x + T) \in D_f$
- $f(x + T) = f(x)$

#### **Exemple 9**

On a  $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$  et  $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$  alors  $\sin(x)$  et  $\cos(x)$  sont des fonctions périodiques de période :  $T = 2\pi$



o



**i Propriété :**  $f(x) = ax^2 + bx + c$

Soit  $f(x) = ax^2 + bx + c$

La forme canonique de  $f$  :  $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$

La courbe de  $f$  est une parabole de sommet  $\Omega\left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$  et d'axe de symétrie  $x = -\frac{b}{2a}$

	$a > 0$	$a < 0$																
La courbe $(C_f)$																		
Tableau de variations de $f$	<table><tr><td><math>x</math></td><td><math>+\infty</math></td><td><math>-\frac{b}{2a}</math></td><td><math>-\infty</math></td></tr><tr><td><math>f(x)</math></td><td></td><td><math>f(-\frac{b}{2a})</math></td><td></td></tr></table>	$x$	$+\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$-\infty$	$f(x)$		$f(-\frac{b}{2a})$		<table><tr><td><math>x</math></td><td><math>+\infty</math></td><td><math>-\frac{b}{2a}</math></td><td><math>-\infty</math></td></tr><tr><td><math>f(x)</math></td><td></td><td><math>f(-\frac{b}{2a})</math></td><td></td></tr></table>	$x$	$+\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$-\infty$	$f(x)$		$f(-\frac{b}{2a})$	
$x$	$+\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$-\infty$															
$f(x)$		$f(-\frac{b}{2a})$																
$x$	$+\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$-\infty$															
$f(x)$		$f(-\frac{b}{2a})$																
Extremums	$f(-\frac{b}{2a})$ est la valeur minimale de $f$ sur $\mathbb{R}$	$f(-\frac{b}{2a})$ est la valeur maximale de $f$ sur $\mathbb{R}$																

## Application 9

On considère la fonction  $f$  définie par :  $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$

- Déterminer  $D_f$  l'ensemble de définition de la fonction  $f$
- montrer que  $f(x) = 2\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + \frac{49}{8}$
- Dresser le tableau de variations de  $f$
- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la courbe  $C_f$
- Tracer ( $C_f$ ) dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$



**Propriété :**  $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$

Soit la fonction  $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$

La formule réduite de  $f$  est :  $f(x) = \beta + \frac{\lambda}{x + \alpha}$

La courbe de la fonction  $f$  est une hyperbole de centre  $\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$  et d'asymptotes les droites d'équations  $x = -\frac{d}{c}$  et  $y = \frac{a}{c}$



	$\Delta > 0$	$\Delta < 0$																
La courbe ( $\mathcal{C}_f$ )																		
Tableau de variations de $f$	<table data-bbox="368 575 849 743"><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>-\frac{d}{c}</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td><math>f(x)</math></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	$x$	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$	$f(x)$				<table data-bbox="951 564 1443 743"><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>-\frac{d}{c}</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td><math>f(x)</math></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	$x$	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$	$f(x)$			
$x$	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$															
$f(x)$																		
$x$	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$															
$f(x)$																		

## Application 10

On considère la fonction  $f$  définie par :  $f(x) = \frac{-x + 2}{x - 1}$

1. Déterminer  $D_f$  l'ensemble de définition de la fonction  $f$
2. montrer que  $f(x) = -1 + \frac{1}{x - 1}$
3. Dresser le tableau de variations de  $f$
4. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la courbe  $C_f$
5. Tracer ( $C_f$ ) dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

## IX. Résolution graphique des équations et des inéquations

### i Propriété

L'équation	$f(x) = m$	$f(x) = g(x)$
Les abscisses des points d'intersection de	$(\mathcal{C}_f)$ avec la droite $y = m$	$(\mathcal{C}_f)$ avec $(\mathcal{C}_g)$

L'inéquation	$f(x) > m$	$f(x) > g(x)$
Sont les intervalles dont	$(\mathcal{C}_f)$ est au-dessus de la droite $y = m$	$(\mathcal{C}_f)$ est au-dessus de $(\mathcal{C}_g)$

### Application 11

Soient  $f$  et  $g$  les fonctions définies par :  $f(x) = x^2 - 2x - 3$  et  $g(x) = \frac{-x-7}{x+1}$

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $(\mathcal{C}_f)$  et de  $(\mathcal{C}_g)$

- 1) Résoudre graphiquement puis algébriquement l'équation  $f(x) = 0$
- 2) Résoudre graphiquement les inéquations  $f(x) \geq 0$  et  $f(x) \leq 0$
- 3) Résoudre graphiquement l'équation  $f(x) = 5$
- 4) Résoudre graphiquement les inéquations  $f(x) \geq 5$  et  $f(x) \leq 5$
- 5) Résoudre graphiquement l'équation  $f(x) = g(x)$
- 6) Résoudre graphiquement les inéquations  $f(x) \geq g(x)$  et  $f(x) \leq g(x)$