^{အရေးကြီးသော} ကျန်းမာရေး သတိပြုရန်အချက်



ကြံလူနာသည် လူတစ်ဦးနေ့စဉ်ပျမ်းမျှလိုအဝ်သော ကော်တီဇုန်းဆေးပမာကကိုကြာရှည်စွာသောက်သုံးနေရပါသည်။

ရောဂါဗိစီးမှုများသောအချိန် – ပြင်းထန်စွာနာမကျန်းဖြစ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒက်ရာရခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝမ်းလျှောခြင်းအခြေအနေတွင် Hydrocortisone 100mg ကို သွေးကြောဆေးသွင်းခြင်း/ အသားဆေးထိုးခြင်း နှင့် 0.9% Saline ဆေးသွင်းခြင်းကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

အမည်

လူနာအမှတ်စဉ်နံပါတ် / မွေးသက္ကရာဇ်

မြန်မာနိုင်ငံဟော်မုန်းရောဂါအထူးကုဆေးပညာအဖွဲ့