

*Biblioteczka Opracowań Matematycznych*

Wiesława Regel

210 calek nieoznaczonych z pełnymi rozwiązaniami  
krok po kroku...



Wydawnictwo *Bil*  
Wydanie pierwsze 2005

ISBN 83-922733-0-3


BIBLIOTEKA GŁÓWNA  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ  
Czytelnia na Wydziale FT i MS

Fiz. 153330-00-00/01



153330000001

Copyright © by Wydawnictwo Biła  
Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Printed in Poland



II 153330

Wydawnictwo Biła  
35-124 Rzeszów  
Ul. Krajobrazowa 1/7  
e-mail: wydawnictwo\_bila@poczta.fm  
tel: 608 503 856

Biblioteka  
Główna PG

## Całka nieoznaczona

### 1. Całkowanie bezpośrednie oraz przez rozkład

Całkowanie bezpośrednie polega na zastosowaniu gotowych wzorów, które można znaleźć w każdych tablicach matematycznych z elementami matematyki wyższej. Poniżej podany jest zestaw podstawowych wzorów do bezpośredniego całkowania.

Całkowanie przez rozkład to najbardziej elementarna metoda całkowania. Polega ona na przekształcaniu wyrażenia podcałkowego tak, aby można było zastosować gotowy wzór, czyli przejść do całkowania bezpośredniego. Oczywiście nie wszystkie wyrażenia podcałkowe można przekształcić tak, aby zastosować gotowy wzór. Najczęściej stosowane przekształcenia polegają na zastosowaniu dobrze znanych wzorów, np.: wzorów skróconego mnożenia, rozdzielenia wyrażen algebraicznych na sumę prostszych wyrażen, wzorów trygonometrycznych ujmujących zależności pomiędzy poszczególnymi funkcjami trygonometrycznymi itp. A zatem przed przystąpieniem do całkowania dobrze jest zatrzymać się na chwilę i spróbować dostrzec możliwość zastosowania jakiegoś wzoru.

#### Tablica Podstawowych Catek:

$$(1.1) \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (\text{dla } n \neq -1)$$

$$(1.2) \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (1.3) \quad \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$(1.4) \quad \int e^x dx = e^x + C \quad (1.5) \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(6) \int \sin x dx = -\cos x + C \quad (1.7.)$$

(1.8)

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

(1.9)

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

(1.10)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

(1.11)

$$\int \frac{-dx}{1+x^2} = \operatorname{arccot} x + C$$

(1.12)

$$\int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C$$

Podczas całkowania korzystamy z ważnych własności całek. Poniżej podane są własności całek nieoznaczonych:

$$(1.13) \quad k \int f dx = \int k f dx \quad (1.14) \quad \int dx = x + C$$

$$(1.15) \quad \int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx \text{ - addytywność całki,}$$

$$(1.16) \quad d \int f dx = f dx.$$

Całkowanie to inaczej wyznaczanie tzw. funkcji pierwotnej. Całkowanie jest działaniem odwrotnym do różniczkowania (wyznaczania pochodnej). Jednak całkowanie nie jest działaniem jednoznacznym co oznacza, że funkcja  $f(x)$  może mieć nieskończenie wiele całek (rodzina funkcji). Przy obliczaniu całki nieoznaczonej dopisujemy „C” co oznacza właśnie niejednoznaczność całki.

## PRZYKŁADY

## CALKOWANIA

$$\int (2x^4 + 6x + \frac{10}{x}) dx = \int 2x^4 dx + \int 6x dx + \int \frac{10}{x} dx = 2 \int x^4 dx +$$

$$\int x dx + 10 \int \frac{dx}{x} = \frac{2x^5}{5} + \frac{6x^2}{2} + 10 \ln |x| + C = \frac{x^5}{3} + 3x^2 +$$

- 4 -

$$+ 10 \ln |x| + C.$$

57

$$\int \frac{20x^{10} + 5}{x^6} dx = \int \frac{20x^{10}}{x^6} dx + \int \frac{5}{x^6} dx = 20 \int \frac{x^{10}}{x^6} dx + 5 \int \frac{dx}{x^6} =$$

$$= 20 \int x^4 dx + 5 \int x^{-6} dx = \frac{20x^5}{5} + \frac{5x^{-5}}{-5} + C = 4x^5 - \frac{1}{x^5} + C$$

$$58 \int \frac{2x^5 - 5}{x^4} dx = \int \frac{2x^5}{x^4} dx - \int \frac{5}{x^4} dx = 2 \int \frac{1}{x^3} dx - 5 \int x^{-4} dx =$$

$$= 2 \int x^{-3} dx - \frac{5x^{-3}}{-3} + C = \frac{2x^{-2}}{-2} + \frac{5}{3x^3} + C = -\frac{1}{x^2} + \frac{5}{3x^3} + C$$

$$59 \int \frac{(x^2 + 1)^2}{x^3} dx = \int \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{x^3} dx = \int \frac{x^4}{x^3} dx + 2 \int \frac{x^2}{x^3} dx + \int \frac{dx}{x^3} =$$

$$= \int x dx + 2 \int \frac{dx}{x} + \int x^{-3} dx = \frac{x^2}{2} + 2 \ln |x| + \frac{x^{-2}}{-2} + C = \frac{x^2}{2} +$$

$$+ 2 \ln |x| - \frac{1}{2x^2} + C$$

60

$$\int (\sqrt[3]{x} + 2\sqrt[5]{x}) dx = \int x^{\frac{1}{3}} dx + 2 \int x^{\frac{1}{5}} dx = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + \frac{2x^{\frac{6}{5}}}{\frac{6}{5}} + C =$$

$$= \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{4} + \frac{5x^{\frac{6}{5}}}{5} + C = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + \frac{5}{5} \sqrt[5]{x^6} + C$$

61

$$\int \left( \frac{10}{3\sqrt[3]{x}} + \frac{2}{3\sqrt{x^2}} \right) dx = \frac{10}{3} \int \frac{dx}{x^{\frac{1}{3}}} + 2 \int \frac{dx}{x^{\frac{2}{3}}} = \frac{10}{3} \int x^{-\frac{1}{3}} dx +$$

$$+ 2 \int x^{-\frac{2}{3}} dx = \frac{10}{3} \frac{x^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + \frac{2x^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} + C = 5x^{\frac{2}{3}} + 6x^{\frac{1}{3}} + C = 5\sqrt[3]{x^2} + 6\sqrt[3]{x} + C$$

- 5 -

$$\frac{71}{2e^x \left(1 - \frac{e^{-x}}{x^2}\right) dx = 2 \int e^x dx - \int \frac{2e^x e^{-x}}{x^2} dx = 2 \int e^x dx - 2 \int x^{-2} dx =$$

$$= 2e^x - \frac{2x^{-1}}{-1} + C = 2e^x + \frac{2}{x} + C$$

$$\frac{81}{\int \frac{4 \cos^2 x}{3 \cos^2 x \sin^2 x} dx = \frac{4}{3} \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \frac{4}{3} \int \frac{\cos^2 x - 1 + \cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx =$$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{2 \cos^2 x - 1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \frac{4}{3} \int \frac{2 \cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx - \frac{4}{3} \int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \frac{8}{3} \int \frac{dx}{\sin^2 x} -$$

$$- \frac{4}{3} \int \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = -\frac{8}{3} cte x - \frac{4}{3} \int \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx - \frac{4}{3} \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx =$$

$$= -\frac{8}{3} cte x - \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\cos^2 x} = -\frac{8}{3} cte x + \frac{4}{3} cte x - \frac{4}{3} cte x + C =$$

$$= -\frac{4}{3} cte x - \frac{4}{3} cte x + C$$

$$\frac{91}{\int cte^x x dx = \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \int dx = -cte x - x + C$$

$$\frac{101}{\int \frac{10 dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = 10 \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = 10 \int \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx +$$

$$+ 10 \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx + C = 10 \int \frac{dx}{\cos^2 x} + 10 \int \frac{dx}{\sin^2 x} = 10 cte x - 10 cte x + C$$

W powyższych całkach wykorzystano własności całki, wzory (1.1)-(1.10) oraz wzory:

Wzór skróconego mnożenia:  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Definicje potęgi o wykładniku całkowitym i wymiernym:

$$(1.17) \quad x^{-a} = \frac{1}{x^a}, \quad (1.18) \quad x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

Wzory trygonometryczne:

$$(1.19) \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad (1.20) \quad cte x = \cos x$$

$$(1.21) \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

**Uwaga:**

Najczęściej pojawiającym się błędem przy stosowaniu wzoru (1.1) jest pominięcie wykładnika potęgi o wykładniku ujemnym oraz stosowanie wzoru (1.1) dla  $n = -1$ .

## 2. Całkowanie przez podstawianie

**Całkowanie przez podstawianie** polega na wprowadzeniu nowej zmiennej. Po wprowadzeniu nowej zmiennej wykonuje się także przekształcenie różniczki  $dx$ . W praktyce oznacza to, że oznaczając:  $G(x) = T(u)$  otrzymujemy  $G'(x)dx = T'(u)du$ , skąd po dalszych przekształceniach otrzymujemy  $dx$ . Sposób ten jasno pokazały przykłady.

W bardziej skomplikowanych przypadkach całkowania metodę tę stosujemy pośrednio przy okazji stosowania innej metody.

### PRZYKŁADY CAŁKOWANIA

$$\frac{111}{\int \frac{1}{2} \sin 4x dx = \frac{1}{2} \int \sin 4x dx = \left| \begin{array}{l} 4x = t \\ 4dx = dt \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \sin t dt =$$

$$= \frac{1}{8} \int \sin t dt = -\frac{1}{8} \cos t + C = -\frac{1}{8} \cos 4x + C$$

$$\frac{121}{\int 3 \cos \frac{x}{5} dx = 3 \int \cos \frac{x}{5} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x}{5} = t \\ \frac{dx}{5} = dt \end{array} \right| = 3 \int 5 \cos t dt = 15 \int \cos t dt =$$

$$= -15 \sin t + C = -15 \sin \frac{x}{5} + C$$

$$\begin{array}{l} \boxed{13/} \\ \int (8x-5)^5 dx = \left| \begin{array}{l} 8x-5=t \\ 8dx=dt \\ dx=\frac{dt}{8} \end{array} \right| = \int t^5 \frac{dt}{8} = \frac{1}{8} \int t^5 dt = \frac{t^6}{48} + C = \frac{(8x-5)^6}{48} + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{14/} \\ \int \frac{4x dx}{3x^2+5} = \left| \begin{array}{l} 3x^2+5=t \\ 6x dx=dt \\ x dx=\frac{dt}{6} \end{array} \right| = 4 \int \frac{\frac{dt}{6}}{t} = \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t} = \frac{2}{3} \ln|t| + C = \frac{2}{3} \ln|3x^2+5| + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{15/} \\ \int \frac{2e^{3x} dx}{2+5e^{3x}} = \left| \begin{array}{l} 2+5e^{3x}=t \\ 15e^{3x} dx=dt \\ e^{3x} dx=\frac{dt}{15} \end{array} \right| = 2 \int \frac{\frac{dt}{15}}{t} = \frac{2}{15} \int \frac{dt}{t} = \frac{2}{15} \ln|t| + C = \frac{2}{15} \ln|2+5e^{3x}| + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{16/} \\ \int c \lg x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \left| \begin{array}{l} \sin x=t \\ \cos x dx=dt \end{array} \right| = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| = \ln|\sin x| + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{17/} \\ \int \sqrt{4x-1} dx = \left| \begin{array}{l} 4x-1=t^2 \\ 4dx=2tdt \\ dx=\frac{tdt}{2} \end{array} \right| = \int t \frac{tdt}{2} = \frac{1}{2} \int t^2 dt = \frac{1}{6} t^3 + C = \frac{\sqrt{(4x-1)}^3}{6} + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{18/} \\ \int \sqrt[4]{10-2x} dx = \left| \begin{array}{l} 10-2x=t^4 \\ -2dx=4t^3 dt \\ dx=-2t^3 dt \\ t=\sqrt[4]{10-2x} \end{array} \right| = \int t(-2t^3 dt) = -2 \int t^4 dt = -\frac{2t^5}{5} + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{19/} \\ \int e^{\frac{-x}{4}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{-x}{4}=t \\ -dx=4dt \\ dx=-4dt \end{array} \right| = -4 \int e^t dt = -4e^t + C = -4e^{\frac{-x}{4}} + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{20/} \\ 5 \int e^{-x^3} x^2 dx = \left| \begin{array}{l} -x^3=t \\ -3x^2 dx=dt \\ x^2 dx=-\frac{dt}{3} \end{array} \right| = 5 \int e^t \left( \frac{-dt}{3} \right) = -\frac{5}{3} \int e^t dt = -\frac{5}{3} e^t + C = -\frac{5}{3} e^{-x^3} + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{21/} \\ \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \left| \begin{array}{l} \sqrt{x}=t \\ \frac{dx}{\sqrt{x}}=2dt \end{array} \right| = 2 \int e^t \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \int e^t dt = 2e^t + C = 2e^{\sqrt{x}} + C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \boxed{22/} \\ \int \sqrt[4]{2x^5+10} dx = \left| \begin{array}{l} 2x^5+10=t^4 \\ 10x^4 dx=4t^3 dt \\ x^4 dx=\frac{4}{10} t^3 dt \\ t=\sqrt[4]{2x^5+10} \end{array} \right| = \frac{2}{5} \int t^4 dt = \frac{2}{25} t^5 + C = \frac{2}{25} \sqrt[5]{(2x^5+10)^5} + C \end{array}$$

23/

$$\int \frac{2x^2 dx}{\sqrt{3+x^3}} = \left| \begin{array}{l} 3+x^3 = t^3 \\ 3x^2 dx = 5t^4 dt \\ x^3 dx = \frac{5}{3} t^4 dt \\ t = \sqrt[3]{3+x^3} \end{array} \right| = 2 \int \frac{\frac{5}{3} t^4 dt}{t} = \frac{10}{3} \int t^3 dt = \frac{10}{12} t^4 + C = \frac{5}{6} \sqrt[3]{(3+x^3)^4} + C$$

24/

$$\int \frac{12 x dx}{\sqrt{1-3x^2}} = \left| \begin{array}{l} 1-3x^2 = t^2 \\ -6x dx = 2t dt \\ x dx = -\frac{1}{3} t dt \\ t = \sqrt{1-3x^2} \end{array} \right| = 12 \int \frac{-\frac{1}{3} t dt}{t} = -4 \int dt = -4t + C = -4\sqrt{1-3x^2} + C$$

25/

$$\int \frac{\cos 2x}{\sin x \cos x} dx = 2 \int \frac{\cos 2x}{2 \sin x \cos x} dx = \int \frac{2 \cos 2x}{\sin 2x} dx = \left| \begin{array}{l} \sin 2x = t \\ 2 \cos 2x dx = dt \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|\sin 2x| + C$$

26/

$$\int \frac{\sin x dx}{1+3 \cos x} = \left| \begin{array}{l} 1+3 \cos x = t \\ -3 \sin x dx = dt \\ \sin x dx = -\frac{dt}{3} \end{array} \right| = \int \frac{-\frac{dt}{3}}{t} = -\frac{1}{3} \ln|t| + C = -\frac{1}{3} \ln|1+3 \cos x| + C$$

27/

$$\int \frac{dx}{x(1+\ln x)} = \left| \begin{array}{l} 1+\ln x = t \\ \frac{dx}{x} = dt \end{array} \right| = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|1+\ln x| + C$$

28/

$$\int \sin^2 x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} \sin x = t \\ \cos x dx = dt \end{array} \right| = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C = \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

29/

$$\int \cos^5 x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} \cos x = t \\ -\sin x dx = dt \end{array} \right| = -\int t^5 dt = -\frac{t^6}{6} + C = -\frac{1}{6} \cos^6 x + C$$

30/

$$\int \frac{\sin x dx}{\cos^5 x} = \left| \begin{array}{l} \cos x = t \\ -\sin x dx = dt \\ \sin x dx = -dt \end{array} \right| = \int \frac{-dt}{t^5} = -\int t^{-5} dt = \frac{t^{-4}}{4} + C = \frac{1}{4 \cos^4 x} + C$$

31/

$$\int 2e^{\sin x} \cos x dx = \left| \begin{array}{l} \sin x = t \\ \cos x dx = dt \end{array} \right| = 2 \int e^t dt = 2e^t + C = 2e^{\sin x} + C$$

32/

$$\int 10e^{x^5+1} x^4 dx = \left| \begin{array}{l} x^5+1 = t \\ 5x^4 dx = dt \\ x^4 dx = \frac{dt}{5} \end{array} \right| = 10 \int e^t \frac{dt}{5} = 2 \int e^t dt = 2e^t + C = 2e^{x^5+1} + C$$

33/

$$\int \frac{2t g x dx}{\cos^2 x} = 2 \int t g x \frac{dx}{\cos^2 x} = \left| \begin{array}{l} t g x = t \\ \frac{dx}{\cos^2 x} = dt \end{array} \right| = 2 \int t dt = t^2 + C = t g^2 x + C$$

34/

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{dx}{\frac{1}{e^x} + \frac{1}{e^x}} = \int \frac{dx}{\frac{2}{e^{2x} + 1}} = \int \frac{e^{2x} dx}{e^{2x} + 1} = \left| \begin{array}{l} e^x = t \\ e^x dx = dt \end{array} \right| = \int \frac{dt}{t^2 + 1}$$

$$= \arctan t + C = \arctan(e^x) + C$$

35/

$$\int \frac{\sqrt{10+\ln|x|}}{2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{10+\ln|x|}}{x} dx = \left| \begin{array}{l} 10+\ln|x| = t^2 \\ \frac{dx}{x} = 2t dt \\ t = \sqrt{10+\ln|x|} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int 2t^2 dt = \int t^2 dt =$$

$$= \frac{t^3}{3} + C = \frac{\sqrt{(10+\ln|x|)^3}}{3} + C$$

$$\underline{36/} \int \frac{2 \cos x dx}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \left| \frac{\sin x = t}{\cos x dx = dt} \right| = 2 \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = 2 \arcsin t + C = 2 \arcsin(\sin x) + C$$

$$\underline{37/} \int \frac{\sqrt{5 + 3 \ln x}}{2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{5 + 3 \ln x}}{x} dx = \left| \begin{array}{l} 5 + 3 \ln x = t^2 \\ \frac{3 dx}{x} = 2 t dt \\ \frac{dx}{x} = \frac{2}{3} t dt \\ t = \sqrt{5 + 3 \ln x} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int t \frac{2 t dt}{3} = \frac{1}{3} \int t^2 dt = \frac{t^3}{9} + C = \frac{(\sqrt{5 + 3 \ln x})^3}{9} + C$$

$$\underline{38/} \int (e^x + e^{-x})^2 dx = \int (e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x}) dx = \int e^{2x} dx + 2 \int e^x e^{-x} dx + \int e^{-2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} + 2x - \frac{1}{2} e^{-2x} + C$$

$$\underline{39/} \int \frac{x^3 dx}{\cos^2 x^4} = \left| \begin{array}{l} x^4 = t \\ 4x^3 dx = dt \\ \frac{dx}{\cos^2 x^4} = \frac{dt}{\cos^2 t} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{1}{4} dt}{\cos^2 t} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\cos^2 t} = \frac{1}{4} \operatorname{tg} t + C = \frac{1}{4} \operatorname{tg} x^4 + C$$

$$\underline{40/} \int \frac{dx}{5 + \sqrt{x}} = \left| \begin{array}{l} x = t^2 \\ dx = 2t dt \end{array} \right| = \int \frac{2t dt}{5 + t} = 2 \int \frac{t dt}{5 + t} = 2 \int \frac{t + 5 - 5}{t + 5} dt = 2 \int dt - 10 \int \frac{dt}{t + 5} = 2t - 10 \ln|t + 5| + C = 2\sqrt{x} - 10 \ln|\sqrt{x} + 5| + C$$

$$\underline{41/} \int \frac{x^3 dx}{(x+1)^{10}} = \left| \begin{array}{l} x+1 = t \\ x = t-1 \\ dx = dt \end{array} \right| = \int \frac{(t-1)^3 dt}{t^{10}} = \int \frac{(t^3 - 3t^2 + 3t - 1) dt}{t^{10}} = \int \frac{t^3 dt}{t^{10}} - 3 \int \frac{t^2 dt}{t^{10}} + 3 \int \frac{t dt}{t^{10}} - \int \frac{dt}{t^{10}} = \int t^{-7} dt - 3 \int t^{-8} dt + 3 \int t^{-9} dt - \int t^{-10} dt = -\frac{1}{6t^6} + \frac{3}{7t^7} - \frac{1}{8t^8} + \frac{1}{9t^9} + C = -\frac{1}{6(x+1)^6} + \frac{3}{7(x+1)^7} - \frac{1}{8(x+1)^8} + \frac{1}{9(x+1)^9} + C$$

-12-

$$\underline{42/} \int \frac{3x+2}{3x^2+4x+10} dx = \left| \begin{array}{l} 3x^2+4x+10 = t \\ (6x+4) dx = dt \\ (3x+2) dx = \frac{dt}{2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{dt}{2}}{t} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln|t| + C = \frac{1}{2} \ln|3x^2+4x+10| + C$$

$$\underline{43/} \int \frac{dx}{6+x^2} = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{6}}\right)^2} = \left| \begin{array}{l} t = \frac{x}{\sqrt{6}} \\ dt = \frac{dx}{\sqrt{6}} \\ dx = \sqrt{6} dt \end{array} \right| = \frac{1}{6} \int \frac{\sqrt{6} dt}{1+t^2} = \frac{\sqrt{6}}{6} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} t + C = \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{6}} + C$$

$$\underline{44/} \int \frac{dx}{x^2+16} = \int \frac{dx}{16 \left[ \left(\frac{x}{4}\right)^2 + 1 \right]} = \frac{1}{16} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{4}\right)^2 + 1} = \left| \begin{array}{l} \frac{x}{4} = t \\ \frac{dx}{4} = dt \\ dx = 4 dt \end{array} \right| = \frac{1}{16} \int \frac{4 dt}{t^2 + 1}$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{1}{4} \operatorname{arctg} t + C = \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{x}{4} + C$$

$$\underline{45/} \int \frac{dx}{\sqrt{5-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{5 \left( 1 - \left(\frac{x}{\sqrt{5}}\right)^2 \right)}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{\sqrt{5}}\right)^2}} = \left| \begin{array}{l} \frac{x}{\sqrt{5}} = t \\ \frac{dx}{\sqrt{5}} = dt \end{array} \right| = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{\sqrt{5} dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \operatorname{arcsin} t + C = \operatorname{arcsin} \frac{x}{\sqrt{5}} + C$$

-13-

$$\boxed{46/} \quad \int x^2 \sqrt{x^3 + 10} \, dx = \left| \begin{array}{l} x^3 + 10 = t^2 \\ 3x^2 dx = 2t dt \\ x^2 dx = \frac{2}{3} \frac{dt}{t} \end{array} \right| = \frac{2}{3} \int t^2 dt = \frac{2}{9} t^3 + C = \frac{2 \sqrt{(x^3 + 10)^3}}{9} + C$$

$$\boxed{47/} \quad \int \frac{x dx}{x^4 + 1} = \left| \begin{array}{l} x^2 = t \\ 2x dx = dt \\ x dx = \frac{dt}{2} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{1}{2} \arctg t + C = \frac{1}{2} \arctg x^2 + C$$

$$\boxed{48/} \quad \int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx = \int \sin x dx - \int \cos^2 x \sin x dx =$$

$$= -\cos x - \left| \begin{array}{l} \cos x = t \\ -\sin x dx = dt \end{array} \right| = -\cos x + \int t^2 dt = -\cos x + \frac{t^3}{3} + C = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$$

$$\boxed{49/} \quad \int \frac{5x^2 dx}{\sqrt{1-x^6}} = \left| \begin{array}{l} x^3 = t \\ 3x^2 dx = dt \\ x^2 dx = \frac{dt}{3} \end{array} \right| = \frac{5}{3} \int \frac{\frac{dt}{3}}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{5}{3} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{5}{3} \arcsin t + C = \frac{5}{3} \arcsin x^3 + C$$

Całkowanie przez podstawienie to jedna z najważniejszych metod całkowania. Stosujemy ją wówczas gdy zastosowanie nowej zmiennej dla fragmentu wyrażenia podcałkowego upraszcza całkę. Nie ma niestety ogólnych przepisów kiedy i jak tego dokonać. Umiejętność doboru odpowiedniego podstawienia nabywa się drogą wprawy. Z całą pewnością metodę tą możemy zastosować gdy licznik ułamka podcałkowego jest pochodną mianownika. Korzystamy wówczas ze wzoru:

$$(1.22) \quad \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln |f(x)|$$

### 3. Całkowanie przez części

**Całkowanie przez części** stosuje się wówczas, gdy pod całką występuje iloczyn funkcji algebraicznej lub przestępnej. Całkowanie przez części odbywa się według wzoru:

$$(1.23) \quad \int u dv = uv - \int v du$$

przy czym jako funkcję  $u$ , przyjmuje się funkcję, której różniczkowanie upraszcza wyrażenie podcałkowe, a za  $dv$  tę część wyrażenia podcałkowego, którego całka jest znana lub może być łatwo wyznaczona.

### PRZYKŁADY CAŁKOWANIA

$$\boxed{50/} \quad \int x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \sin x dx \\ du = dx \\ v = -\cos x \end{array} \right| = -x \cos x + \int \cos x dx =$$

$$= -x \cos x + \sin x + C$$

$$\boxed{51/} \quad \int x^2 \cos x dx = \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ dv = \cos x dx \\ du = 2x dx \\ v = \sin x \end{array} \right| = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx =$$

$$= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C$$

(Dla obliczenia całki (51) wykorzystano całkę (50)).

$$\boxed{52/} \quad \int x e^x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = e^x dx \\ du = dx \\ v = e^x \end{array} \right| = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$$

$$\boxed{53/} \quad \int x^3 e^x dx = \left| \begin{array}{l} u = x^3 \\ dv = e^x dx \\ du = 3x^2 dx \\ v = e^x \end{array} \right| = x^3 e^x - 3 \int x^2 e^x dx =$$

$$= x^3 e^x - 3 \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ dv = e^x dx \\ du = 2x dx \\ v = e^x \end{array} \right| = x^3 e^x - 3(x^2 e^x - 2 \int x e^x dx) =$$

$$= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6 \int x e^x dx = x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6 \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = e^x dx \\ du = dx \\ v = e^x \end{array} \right| =$$

$$= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6 \int e^x dx = x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6e^x + C$$



$$\begin{aligned} \underline{54/} \quad \int e^x \sin x dx &= \left| \begin{array}{cc} u = e^x & du = e^x dx \\ dv = \sin x & v = -\cos x \end{array} \right| = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx = \\ &= -e^x \cos x + \left| \begin{array}{cc} u = e^x & du = e^x dx \\ dv = \cos x & v = \sin x \end{array} \right| = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx \end{aligned}$$

A zatem biorąc pod uwagę początek i koniec obliczeń mamy:

$$\int e^x \sin x dx = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

$$2 \int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x$$

$$\int e^x \sin x dx = \frac{e^x \sin x - e^x \cos x}{2}$$

$$\begin{aligned} \underline{55/} \quad \int e^{-2x} \sin 3x dx &= \left| \begin{array}{cc} u = e^{-2x} & du = -2e^{-2x} dx \\ dv = \sin 3x & v = -\frac{\cos 3x}{3} \end{array} \right| = \frac{-e^{-2x} \cos 3x}{3} - \frac{2}{3} \int e^{-2x} \cos 3x dx \\ &= \frac{-e^{-2x} \cos 3x}{3} - \frac{2}{3} \left| \begin{array}{cc} u = e^{-2x} & du = -2e^{-2x} dx \\ dv = \cos 3x & v = \frac{\sin 3x}{3} \end{array} \right| = \frac{-e^{-2x} \cos 3x}{3} - \\ &= \frac{-2}{3} \left( \frac{e^{-2x} \sin 3x}{3} + \frac{2}{3} \int e^{-2x} \sin 3x dx \right) = \frac{-e^{-2x} \cos 3x}{3} - \frac{2e^{-2x} \sin 3x}{9} - \frac{4}{9} \int e^{-2x} \sin 3x dx \end{aligned}$$

$$\text{Stąd: } \frac{13}{9} \int e^{-2x} \sin 3x dx = \frac{-e^{-2x} \cos 3x}{3} - \frac{2e^{-2x} \sin 3x}{9}$$

$$\int e^{-2x} \sin 3x dx = \frac{-3e^{-2x} \cos 3x - 2e^{-2x} \sin 3x}{13}$$

$$\begin{aligned} \underline{56/} \quad \int \sin^2 \frac{x}{3} dx &= \left| \begin{array}{cc} \frac{x}{3} = t & \frac{dx}{3} = dt \\ dv = 3dt & \end{array} \right| = 3 \int \sin^2 t dt = 3 \int \sin t \sin t dt = \left| \begin{array}{cc} u = \sin t & du = \cos t dt \\ dv = \sin t & v = -\cos t \end{array} \right| = \\ &= -3 \sin t \cos t + 3 \int \cos^2 t dt = -3 \sin t \cos t + 3 \int (1 - \sin^2 t) dt = -3 \sin t \cos t + 3 \int dt - 3 \int \sin^2 t dt \\ 3 \int \sin^2 t dt &= -3 \sin t \cos t + 3t - 3 \int \sin^2 t dt \end{aligned}$$

$$\int \sin^2 t dt = \frac{-3 \sin t \cos t}{6} + \frac{3t}{6} \quad \int \sin^2 \frac{x}{3} = \frac{-\sin \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3}}{2} + \frac{x}{6}$$

$$\underline{57/} \quad \int \cos^2 \frac{x}{4} dx = \left| \begin{array}{cc} \frac{x}{4} = t & \frac{dx}{4} = dt \\ \end{array} \right| = 4 \int \cos^2 t dt = \left| \begin{array}{cc} u = \cos t & du = -\sin t dt \\ dv = \cos t & v = \sin t \end{array} \right| =$$

$$4(\cos t \sin t + \int \sin^2 t dt) = 4 \cos t \sin t + 4 \int (1 - \cos^2 t) dt = 4 \cos t \sin t + 4 \int dt - 4 \int \cos^2 t dt$$

$$8 \int \cos^2 t dt = 4t + 4 \cos t \sin t$$

$$\int \cos^2 t dt = \frac{t}{2} + \frac{\cos t \sin t}{2} + C = \frac{x}{8} + \frac{\cos \frac{x}{4} \sin \frac{x}{4}}{2} + C$$

$$\begin{aligned} \underline{58/} \quad \int \sqrt{x} \ln x dx &= \left| \begin{array}{cc} u = \ln x & du = \frac{dx}{x} \\ dv = x^{\frac{1}{2}} dx & v = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \end{array} \right| = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{2}{3} \int \frac{x^{\frac{3}{2}}}{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{2}{3} \int x^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{4}{9} x^{\frac{3}{2}} + C \end{aligned}$$

$$\underline{59/} \quad \int \ln |x| dx = \left| \begin{array}{cc} u = \ln |x| & du = \frac{dx}{x} \\ dv = dx & v = x \end{array} \right| = x \ln |x| - \int dx = x \ln |x| - x + C$$

$$\underline{60/} \quad \int (\ln |x|)^2 dx = \int \ln |x| \ln |x| dx = \left| \begin{array}{cc} u = \ln |x| & du = \frac{dx}{x} \\ dv = \ln |x| dx & v = x \ln |x| - x \end{array} \right|$$

$$= \ln |x| (x \ln |x| - x) - \int \ln |x| dx + \int dx = x \ln^2 |x| - 2x \ln |x| + 2x + C$$

$$\underline{61/} \quad \int \frac{(\ln |x|)^2}{x^5} dx = \left| \begin{array}{cc} u = \ln^2 |x| & du = \frac{2 \ln |x| dx}{x} \\ dv = x^{-5} dx & v = \frac{-1}{4x^4} \end{array} \right| = -\frac{(\ln |x|)^2}{4x^4} + \frac{1}{2} \int \frac{\ln |x| dx}{x^3} =$$

$$= -\frac{(\ln |x|)^2}{4x^4} + \frac{1}{2} \left| \begin{array}{cc} u = \ln |x| & du = \frac{dx}{x} \\ dv = x^{-3} dx & v = \frac{-1}{4x^4} \end{array} \right| = -\frac{(\ln |x|)^2}{4x^4} - \frac{\ln |x|}{8x^4} + \frac{1}{8} \int \frac{dx}{x^3} =$$

$$= -\frac{(\ln|x|)^2}{4x^4} - \frac{\ln|x|}{8x^4} - \frac{1}{32x^4} + C$$

$$\underline{62/} \int x \ln^2|x| dx = \left| u = \ln^2|x| \quad du = \frac{2 \ln|x|}{x} dx \right| = \frac{x^2 \ln^2|x|}{2} - \int x \ln x dx = \frac{x^2 \ln^2 x}{2} -$$

$$\left| u = \ln|x| \quad du = \frac{dx}{x} \right| = \frac{x^2 \ln^2|x|}{2} - \frac{x^2 \ln|x|}{2} + \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2 \ln^2|x|}{2} - \frac{x^2 \ln|x|}{2} + \frac{x^2}{4} + C$$

$$\underline{63/} \int \frac{\ln|x|}{x^2} dx = \left| u = \ln|x| \quad du = \frac{dx}{x} \right| = -\frac{\ln|x|}{x} + \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{\ln|x|}{x} - \frac{1}{x} + C$$

$$\underline{64/} \int x \ln|x-1| dx = \left| u = \ln|x-1| \quad du = \frac{dx}{x-1} \right| = \frac{x^2 \ln|x-1|}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{x-1} =$$

$$= \frac{x^2 \ln|x-1|}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 + 1 + \frac{1}{x-1}}{x-1} dx = \frac{x^2 \ln|x-1|}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} - \frac{\ln|x-1|}{2} + C$$

$$\underline{65/} \int \cos(\ln x) x dx = \left| u = \cos(\ln x) \quad du = -\frac{\sin(\ln x)}{x} dx \right| = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx =$$

$$= x \cos(\ln x) + \left| u = \sin(\ln x) \quad du = \frac{\cos(\ln x)}{x} dx \right| = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) x dx$$

$$2 \int \cos(\ln x) x dx = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)$$

$$\int \cos(\ln x) x dx = -\frac{x \cos(\ln x)}{2} + \frac{x \sin(\ln x)}{2} + C$$

$$\underline{66/} \int \arcsin x dx = \left| u = \arcsin x \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \right| = x \arcsin x - \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$\left| 1-x^2 = t^2 \right| = x \arcsin x + \int dt = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\underline{67/} \int \arctg x dx = \left| u = \arctg x \quad du = \frac{dx}{1+x^2} \right| = x \arctg x - \int \frac{x dx}{1+x^2} =$$

$$= x \arctg x - \left| 1+x^2 = t \quad 2x dx = dt \right| = \frac{dt}{2} = x \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} =$$

$$= x \arctg x - \frac{1}{2} \ln|1+x^2| + C$$

$$\underline{68/} \int x \arctg x dx = \left| u = \arctg x \quad du = \frac{dx}{1+x^2} \right| = \frac{x^2 \arctg x}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{1+x^2} = \frac{x^2 \arctg x}{2} -$$

$$- \frac{1}{2} \int \frac{x^2 + 1 - 1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \arctg x}{2} - \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{x^2 \arctg x}{2} - \frac{x}{2} + \frac{\arctg x}{2} + C$$

$$\underline{69/} \int x^2 \arctg x dx = \left| u = \arctg x \quad du = \frac{dx}{1+x^2} \right| = \frac{x^3 \arctg x}{3} - \frac{1}{3} \int \frac{x^3 dx}{1+x^2} =$$

$$= \frac{x^3 \arctg x}{3} - \frac{1}{3} \int \left( x + \frac{x}{1+x^2} \right) dx = \frac{x^3 \arctg x}{3} - \frac{x^2}{6} - \frac{1}{3} \ln|1+x^2| =$$

$$= \frac{x^3 \arctg x}{3} - \frac{x^2}{6} - \frac{1}{6} \int \frac{dt}{t} = \frac{x^3 \arctg x}{3} - \frac{x^2}{6} - \frac{\ln|1+x^2|}{6} + C$$

$$\int \frac{x dx}{\sin^2 x} = \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \frac{dx}{\sin^2 x} \end{array} \right| \begin{array}{l} du = dx \\ v = -\operatorname{ctg} x \end{array} = -x \operatorname{ctg} x + \int \operatorname{ctg} x dx = -x \operatorname{ctg} x + \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{x \cos x dx}{\sin^3 x} = \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \frac{\cos x}{\sin^3 x} \end{array} \right| \begin{array}{l} du = dx \\ v = \int \frac{dx}{\sin^3 x} \end{array} = I$$

Pomocniczo obliczamy:

$$\int \frac{dx}{\cos^3 x} = \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{1}{t} dt = \int t^{-1} dt = \frac{-1}{-1} = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$I = -\frac{x}{2 \sin^2 x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\frac{x}{2 \sin^2 x} - \frac{1}{2} \operatorname{ctg} x + C$$

$$\int \arccos x dx = \left| \begin{array}{l} u = \arccos x \\ dv = dx \end{array} \right| \begin{array}{l} du = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ v = x \end{array} = x \arccos x + \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$= x \arccos x + \left| \begin{array}{l} 1-x^2 = t^2 \\ -2x dx = 2t dt \end{array} \right| = x \arccos x - \int \frac{t dt}{t} = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arccos^2 x dx = \left| \begin{array}{l} u = \arccos x \\ dv = \arccos x dx \end{array} \right| \begin{array}{l} du = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ v = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} \end{array} =$$

$$= x \arccos^2 x - \sqrt{1-x^2} \arccos x - \int dx + \int \frac{x \arccos x dx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arccos^2 x - 2\sqrt{1-x^2} \arccos x - 2x + C$$

$$\int \frac{\arcsin \frac{x}{2} dx}{\sqrt{2-x}} = \left| \begin{array}{l} u = \arcsin \frac{x}{2} \\ dv = \frac{dx}{\sqrt{2-x}} \end{array} \right| \begin{array}{l} du = \frac{dx}{2\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}} \\ v = \int \frac{dx}{\sqrt{2-x}} \end{array} = -2\sqrt{2-x} \arcsin \frac{x}{2} + \int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}} dx$$

Pomocniczo obliczymy całkę:

$$\int \frac{\sqrt{2-x}}{4-x^2} dx = 2 \int \frac{\sqrt{2-x}}{(2-x)(2+x)} dx = 2 \int \frac{dx}{\sqrt{2+x}} = 4 \int \frac{dz}{2+z} = 4 \ln |2+z| + C$$

$$\int \frac{\arcsin \frac{x}{2} dx}{\sqrt{2-x}} = 4\sqrt{2+x} - 2\sqrt{2-x} \arcsin \frac{x}{2} + C$$

$$\int x \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int 2x \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int x \sin 2x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ dv = \sin 2x dx \end{array} \right| \begin{array}{l} du = dx \\ v = -\frac{\cos 2x}{2} \end{array} = -\frac{x}{2} \cos 2x +$$

$$+ \frac{1}{4} \int \cos 2x dx = -\frac{x}{4} \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x + C$$

$$\int \frac{(x-1)e^x}{x^2} dx = \int \frac{x e^x}{x^2} dx - \int \frac{e^x}{x^2} dx = \int \frac{e^x}{x} dx - \int \frac{e^x}{x^2} dx = \left| \begin{array}{l} u = \frac{1}{x} \\ dv = e^x dx \end{array} \right| \begin{array}{l} du = -\frac{dx}{x^2} \\ v = e^x \end{array} = \frac{e^x}{x} + \int \frac{e^x}{x^2} dx - \int \frac{e^x}{x^2} dx = \frac{e^x}{x} + C$$

#### 4. Całki funkcji wymiernych

Jeżeli wyrażenie podcałkowe ma postać funkcji wymiernej to mamy do czynienia z całkowaniem funkcji wymiernej. W zależności od postaci tej funkcji możemy stosować różne metody całkowania. Mogą wystąpić zatem przypadki:

- a) ułamek podcałkowy jest właściwy (tzn. mianownik ma niższy stopień niż licznik), wówczas rozkładamy mianownik na czynniki a cały ułamek rozkładamy na sumę ułamków prostych pierwszego lub drugiego rodzaju – metoda współczynnika nieoznaczonego.

Funkcję wymierną jednej zmiennej postaci:



II 153330

$$(1.24) \quad \frac{A}{(x-a)^r} \quad \text{nazywamy ułamkiem prostym pierwszego rodzaju.}$$

Funkcję wymierną jednej zmiennej postaci:

$$(1.25) \quad \frac{Ax+B}{(x^2+bx+c)^r} \quad \text{nazywamy ułamkiem prostym drugiego rodzaju.}$$

b/ ułamek podcałkowy jest niewłaściwy, wówczas należy wyłączyć wyrażenie całkowie poprzez wykonanie dzielenia wielomianów. Resztę z tego dzielenia należy zapisać w postaci ułamka właściwego i postąpić jw.

c/ licznik ułamka podcałkowego jest pochodną mianownika tego ułamka. Należy wówczas zastosować wzór (1.22) ze str. 14.

d/ licznik ułamka podcałkowego można rozłożyć na składniki, z których jeden jest pochodną mianownika a drugi stanowi nowy przypadek.

e/ funkcję wymierną przez odpowiednie podstawienie da się sprowadzić do postaci funkcji wymiernej, której całka jest postaci  $\arctg x$ .

$$(1.26) \quad \int \frac{dx}{(x-k)^2+b} = \left| \frac{x-k=\sqrt{b}t}{dx=\sqrt{b}dt} \right| = \int \frac{\sqrt{b}dt}{b t^2+b} = \frac{\sqrt{b}}{b} \int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{1}{\sqrt{b}} \arctg t + C =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{b}} \arctg \left( \frac{x-k}{\sqrt{b}} \right)$$

## PRZYKŁADY CAŁKOWANIA

$$\underline{77/} \quad \int \frac{dx}{(2x-5)^3} = \left| \frac{2x-5=t}{2dx=dt} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^3} = -\frac{1}{4t^2} + C = -\frac{1}{4(2x-5)^2} + C$$

$$\underline{78/} \quad \int \frac{6x+5}{3x^2+5x-3} dx = \ln |3x^2+5x-3| + C$$

$$\underline{79/} \quad \int \frac{4x-20}{2x^2-20x+100} dx = \ln |2x^2-20x+100| + C$$

$$\underline{80/} \quad \int \frac{6+x}{12x+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2(6+x)}{12x+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{12+2x}{12x+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln |2x+x^2| + C$$

$$\underline{81/} \quad \int \frac{dx}{x^2+4x+4} = \int \frac{dx}{(x+2)^2} = \left| \frac{x+2=t}{dx=dt} \right| = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} = -\frac{1}{x+2} + C$$

$$\underline{82/} \quad I = \int \frac{dx}{-x^2+6x-5} = -\int \frac{dx}{(x-5)(x-1)}$$

Pomocniczo rozkładamy funkcję wymierną na ułamki proste. A zatem:

$$\frac{1}{(x-5)(x-1)} = \frac{A}{x-5} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1)+B(x-5)}{(x-5)(x-1)} = \frac{x(4+B)-A-5B}{(x-5)(x-1)}$$

$$\text{Stąd:} \quad \begin{cases} A+B=0 \\ -A-5B=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=\frac{1}{4} \\ B=-\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$I = -\frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-5} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} = -\frac{1}{4} \ln |x-5| + \frac{1}{4} \ln |x-1| + C$$

$$\underline{83/} \quad \int \frac{dx}{4x-5x^2} = \int \frac{dx}{x(4-5x)} = I$$

$$\frac{1}{x(4-5x)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{4-5x} = \frac{x(B-5A)+4A}{x(4-5x)}$$

$$\begin{cases} B-5A=0 \\ 4A=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=\frac{1}{4} \\ B=\frac{5}{4} \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x} + \frac{5}{4} \int \frac{dx}{4-5x} = \frac{\ln|x|}{4} - \frac{\ln|4-5x|}{4} + C$$

$$\underline{84/} \quad \int \frac{3x+4}{x^2-x-2} dx = \int \frac{\frac{3}{2}(2x-1)+\frac{11}{2}}{x^2-x-2} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x-2} dx + \frac{11}{2} \int \frac{dx}{x^2-x-2} =$$

$$= \frac{3}{2} \ln |x^2-x-2| + \frac{11}{2} \int \frac{dx}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}} = \frac{3}{2} \ln |x^2-x-2| + \frac{11}{3} \arctg \frac{2\left(x-\frac{1}{2}\right)}{3} + C$$

$$4 - \frac{85}{\int \frac{x-4}{(x-2)(x-3)} dx = I}$$

$$\frac{x-4}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{x(1+B) - 3 \cdot 1 - 2B}{(x-2)(x-3)}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -3A-2B=-4 \end{cases} \quad \begin{cases} A=2 \\ B=-1 \end{cases}$$

$$I = 2 \int \frac{dx}{x-2} - \int \frac{dx}{x-3} = 2 \ln|x-2| - \ln|x-3| + C$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+7}{x^2+x-2} dx &= \int \frac{2x+1+6}{x^2+x-2} dx = \int \frac{2x+1}{x^2+x-2} dx + \int \frac{6dx}{x^2+x-2} = \\ &= \ln|x^2+x-2| + I \end{aligned}$$

$$\frac{6}{x^2+x-2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} = \frac{x(A+B) - A + 2B}{(x+2)(x-1)}$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -A + 2B = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} A = -2 \\ B = 2 \end{cases}$$

$$I = \int \frac{-2dx}{x+2} + \int \frac{2dx}{x-1} = -2 \ln|x+2| + 2 \ln|x-1| + C$$

$$\int \frac{2x+7}{x^2+x-2} dx = \ln|x^2+x-2| - 2\ln|x+2| + 2\ln|x-1| + C$$

$$\underline{871} \quad \int \frac{3x^2 + 2x - 3}{x^3 - x} dx = \int \frac{3x^2 - 1 + 2x - 2}{x(x-1)} dx = \int \frac{3x^2 - 1}{x^3 - x} dx + \int \frac{2x - 2}{x(x^2 - 1)} dx =$$

$$= \ln|x^3 - x| + 2 \int \frac{dx}{x(x+1)} = \ln|x^3 - x| + I$$

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} = \frac{x(A+B) + A}{x(x+1)}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ A=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \end{cases}$$

$$I = 2 \int \frac{dx}{x} - 2 \int \frac{dx}{x+1} = 2 \ln|x| - 2 \ln|x+1|$$

$$\int \frac{3x^2 + 2x - 3}{x^3 - x} dx = \ln|x^3 - x| + 2\ln|x| - 2\ln|x+1| + C$$

$$\int \frac{(x+1)^3}{x^2-x} dx = \int \left( x+4+\frac{7x+1}{x^2-x} \right) dx = \frac{x^2}{2} + 4x + \int \frac{7x+1}{x^2-x} dx = \frac{x^2}{2} + 4x + I$$

$$I = \int \frac{8dx}{x} - \int \frac{\begin{cases} A=8 \\ B=-1 \end{cases}}{x-1} = 8 \ln|x| - \ln|x-1| + C$$

$$\int \frac{(x+1)^3}{x^2-x} dx = \frac{x^2}{2} + 4x + 8 \ln|x| + \ln|x-1| + C$$

$$\text{[89]} \quad \int \frac{dx}{x^4 - x^3 + x^2} = 1$$

$$\frac{1}{x^2(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - x + 1} = \frac{\alpha^2(A + C) - x^2(A - B - D) + x(A - B) + B}{x^2(x^2 - x + 1)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A + C = 0 \\ -A + B + D = 0 \\ A - B = 0 \\ B = 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} A = 1 \\ B = 1 \\ C = -1 \\ D = 0 \end{array} \right.$$

$$I = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x^2} - \int \frac{x dx}{x^2 - x + 1} = \ln|x| - \frac{1}{x} - I_1$$

$$I_1 = \int \frac{x dx}{x^2 - x + 1} = \int \frac{x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{x^2 - x + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x - \frac{1}{2}}{x^2 - x + 1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 - x + 1} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2 - x + 1| + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$$

$$= \frac{1}{2} \ln |x^2 - x + 1| + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

$$I = \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \ln|x^2 - x + 1| - \frac{\sqrt{3}}{3} \arctg \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

**90.**  $\int \frac{2x+5}{(x-2)^2} dx = \frac{x-2=t}{x=t+2} = \int \frac{2(t+2)+5}{t^2} dt = \int \frac{2t+9}{t^2} dt = 2 \int \frac{dt}{t} + 9 \int \frac{dt}{t^2} = 2 \ln|t| - \frac{9}{t} + C =$

$$= 2 \ln|x-2| - \frac{9}{x-2} + C$$

$$\begin{aligned} \underline{91I} \quad \int \frac{x-1}{4x^3-4x+1} dx &= \int \frac{\frac{1}{8}(8x-4) - \frac{1}{2}}{4x^3-4x+1} dx = \frac{1}{8} \int \frac{8x-4}{4x^3-4x+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{4x^3-4x+1} = \\ &= \frac{1}{8} \ln|4x^3-4x+1| - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(2x-1)^2} = \frac{1}{8} \ln|4x^3-4x+1| - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x-1} + C \\ &= \frac{1}{8} \ln|4x^3-4x+1| - \frac{1}{4(2x-1)} + C \end{aligned}$$

$$\underline{92I} \quad \int \frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2+x} dx = I$$

$$\frac{2x^2-5x+1}{x^3-2x^2+x} = \frac{2x^2-5x+1}{x(x^2-2x+1)} = \frac{2x^2-5x+1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} = \frac{x^2(A+B)+x(C-B-2A)+A}{x(x-1)^2}$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ C-B-2A=-5 \\ A=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=1 \\ B=1 \\ C=-2 \end{cases}$$

$$I = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x-1} - 2 \int \frac{dx}{(x-1)^2} = \ln|x| + \ln|x-1| + \frac{2}{x-1} + C$$

$$\begin{aligned} \underline{93I} \quad \int \frac{5x-1}{x^3-3x-2} dx &= \int \frac{5x-1}{x^3-2x-x-2} dx = I \\ \frac{5x-1}{(x^3-x)-2(x+1)} &= \frac{5x-1}{x(x^2-1)-2(x+1)} = \frac{5x-1}{(x+1)^2(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-2} = \\ &= \frac{x^2(A+C)+x(-A+B+2C)+(-2A-2B+C)}{(x+1)^2(x-2)} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ -A+B+2C=5 \\ -2B-2A+C=-1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-1 \\ B=2 \\ C=1 \end{cases}$$

$$I = \int \frac{-dx}{x+1} + 2 \int \frac{dx}{(x+1)^2} + \int \frac{dx}{x-2} = -\ln|x+1| - \frac{2}{x+1} + \ln|x-2| + C$$

$$\begin{aligned} \underline{94I} \quad \int \frac{5x+2}{x^2+2x+10} dx &= \int \frac{\frac{5}{2}(2x+2) - 3}{x^2+2x+10} dx = \frac{5}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+10} dx - 3 \int \frac{dx}{x^2+2x+10} = \\ &= \frac{5}{2} \ln|x^2+2x+10| - 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2+9} = \frac{5}{2} \ln|x^2+2x+10| - \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} + C \end{aligned}$$

(Wydrukowano wzór (1.26)).

$$\underline{95I} \quad \int \frac{x+2}{x^3-2x^2} dx = I$$

$$\frac{x+2}{x^3-2x^2} = \frac{x+2}{x^2(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-2} = \frac{x^2(A+C)+x(B-2A)-2B}{x^2(x-2)}$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ B-2A=1 \\ -2B=2 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-1 \\ B=-1 \\ C=1 \end{cases}$$

$$I = \int \frac{-dx}{x} + \int \frac{-dx}{x^2} + \int \frac{dx}{2x-2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln|2x-2| - \ln|x| + C$$

$$\underline{96I} \quad \int \frac{x^2 dx}{x-2} = \int (x + \frac{4}{x-2}) dx = \frac{x^2}{2} + 4 \ln|x-2| + C$$

$$\begin{aligned} \underline{97I} \quad \int \frac{x^4 dx}{x^2+k^2} &= \int (x^2 - k^2 + \frac{k^4}{x^2+k^2}) dx = \frac{x^3}{3} - k^2 x - k^4 \int \frac{dx}{x^2+k^2} = \frac{x^3}{3} - k^2 x - k^4 \int \frac{\frac{dx}{x}}{(\frac{x}{k})^2+1} = \\ &= \frac{x^3}{3} - k^2 x - k^4 \operatorname{arctg} \left( \frac{x}{k} \right) + C \end{aligned}$$

$$\underline{98I} \quad \int \frac{2x^2+x+4}{x^3+x^2+4x+4} dx = \int \frac{2x^2+x+4}{x^2(x+1)+4(x+1)} dx = \int \frac{2x^2+x+4}{(x^2+4)(x+1)} dx = I$$

$$\begin{aligned} \frac{2x^2+x+4}{(x^2+4)(x+1)} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+4} = \frac{A(x^2+4) + (Bx+C)(x+1)}{(x^2+4)(x+1)} \\ \begin{cases} A+B=2 \\ B+C=1 \\ 4A+C=4 \end{cases} \quad \begin{cases} A=1 \\ B=1 \\ C=0 \end{cases} \quad I &= \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{xdx}{x^2+4} = \ln|x+1| + \frac{1}{2} \ln|x^2+4| + C \end{aligned}$$

**99/**

$$\int \frac{dx}{x^3+8} = \int \frac{dx}{(x+2)(x^2-2x+4)} = I$$

$$\frac{1}{(x+2)(x^2-2x+4)} = \frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+4} = \frac{x^2(A+B) + x(-2A+2B+C) + 4A+2C}{(x+2)(x^2-2x+4)}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -2A+2B+C=0 \\ 4A+2C=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=\frac{1}{12} \\ B=-\frac{1}{12} \\ C=\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{12} \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{-\frac{1}{12}x + \frac{1}{3}}{x^2-2x+4} dx = \frac{1}{12} \ln|x+2| - \frac{1}{24} \int \frac{2x - \frac{1}{3}}{x^2-2x+4} dx = \frac{1}{12} \ln|x+2| -$$

$$\frac{1}{24} \int \frac{2x-8}{x^2-2x+4} dx = \frac{1}{12} \ln|x+2| - \frac{1}{24} \int \frac{2x-2-6}{x^2-2x+4} dx = \frac{1}{12} \ln|x+2| - \frac{1}{24} \ln|x^2-2x+4| + \frac{6}{24} \int \frac{dx}{x^2-2x+4}$$

$$= \frac{1}{12} \ln|x+2| - \frac{1}{24} \ln|x^2-2x+4| + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x-1)^2+3} = \frac{1}{12} \ln|x+2| - \frac{1}{24} \ln|x^2-2x+4| + \frac{1}{4\sqrt{3}} \arctg \frac{x-1}{\sqrt{3}} + C$$

**100/**

$$\int \frac{3x^2+2x+1}{(x+1)^2(x^2+1)} dx = I$$

$$\frac{3x^2+2x+1}{(x+1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} = \frac{x^2(A+C) + x^2(A+B+2C+D) + x(4+C+2D) + A+B+D}{(x+1)^2(x^2+1)}$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ A+B+2C+D=3 \\ A+C+2D=2 \\ A+B+D=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \\ C=1 \\ D=1 \end{cases}$$

$$I = \int \frac{-dx}{x+1} + \int \frac{dx}{(x+1)^2} + \int \frac{x+1}{x^2+1} dx = -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + \arctg x + C$$

**101/**

$$\int \frac{x dx}{1-x^4} = \int \frac{x dx}{(1-x)(1+x)(1+x^2)} = I$$

- 28 -

$$\frac{x}{(1-x)(1+x)(1+x^2)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x} + \frac{Cx+D}{1+x^2} = \frac{x^3(A-B-C) + x^2(4+B-D) + x(4-B+C) + A+B+D}{(1-x)(1+x)(1+x^2)}$$

$$\begin{cases} A-B-C=0 \\ A+B-D=0 \\ A-B+C=1 \\ A+B+D=0 \end{cases} \quad \begin{cases} A=\frac{1}{4} \\ B=-\frac{1}{4} \\ C=\frac{1}{2} \\ D=0 \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1-x} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1+x} + \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{x^2+1} = -\frac{1}{4} \ln|1-x| - \frac{1}{4} \ln|1+x| + \frac{1}{4} \ln|x^2+1| + C$$

**102/**

$$\int \frac{dx}{x^4+4} = I$$

$$\frac{1}{x^4+4} = \frac{1}{(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)} = \frac{Ax+B}{x^2-2x+2} + \frac{Cx+D}{x^2+2x+2} =$$

$$\frac{x^3(A+C) + x^2(2A+B-2C+D) + x(2A+2B+2C-2D) + 2B+2D}{x^4+4}$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ 2A+B-2C+D=0 \\ 2A+2B+2C-2D=0 \\ 2B+2D=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-\frac{1}{8} \\ B=\frac{1}{4} \\ C=\frac{1}{8} \\ D=\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$I = \int \frac{-\frac{1}{8}x + \frac{1}{4}}{x^2-2x+2} dx + \int \frac{\frac{1}{8}x + \frac{1}{4}}{x^2+2x+2} dx = -\frac{1}{8} \int \frac{x-2}{x^2-2x+2} dx + \frac{1}{8} \int \frac{x+2}{x^2+2x+2} dx = -\frac{1}{8} I_1 + \frac{1}{8} I_2$$

$$-\frac{1}{8} I_1 = -\frac{1}{8} \int \frac{2(x-2)}{x^2-2x+2} dx = -\frac{1}{16} \int \frac{2x-2-2}{x^2-2x+2} dx = -\frac{1}{16} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+2} dx + \frac{1}{8} \int \frac{dx}{x^2-2x+2} =$$

$$= -\frac{1}{16} \ln|x^2-2x+2| + \frac{1}{8} \int \frac{dx}{(x-1)^2+1} = -\frac{1}{16} \ln|x^2-2x+2| + \frac{1}{8} \arctg(x-1)$$

$$= \frac{5}{3} \sqrt{3x^2-2x+1} - \frac{7\sqrt{3}}{9} \ln|x-\frac{1}{3}| + \sqrt{x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}} + C$$

$$\frac{1}{8} \int \frac{x+2}{x^2+2x+2} dx = \frac{1}{16} \int \frac{2(x+2)}{x^2+2x+2} dx = \frac{1}{16} \int \frac{2x+2+2}{x^2+2x+2} dx = \frac{1}{16} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx + \frac{1}{16} \int \frac{2}{x^2+2x+2} dx =$$

$$= \frac{1}{16} \ln|x^2+2x+2| + \frac{1}{8} \arctan(x+1)$$

$$I = \frac{1}{16} \ln|x^2+2x+2| + \frac{1}{8} \arctan(x+1) + C$$

**103/**  $\int \frac{2x^3 dx}{x^6-8} = 2 \int \frac{x^3 dx}{x^6-8} = 2 \int \frac{\frac{1}{2} t^{-1/2}}{t^3-8} = \int \frac{t^{1/2} dt}{t^3-8} = I$

$$\frac{1}{t^3-8} = \frac{1}{(t-2)(t^2+2t+4)} = \frac{A}{t-2} + \frac{Bt+C}{t^2+2t+4} = \frac{t^2(A+B) + t(2A-2B+C) + 4A-2C}{t^3-8}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -2A-2B+C=1 \\ 4A-2C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-\frac{1}{6} \\ B=\frac{1}{6} \\ C=\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{6} \int \frac{dt}{t-2} + \int \frac{-\frac{1}{6}t + \frac{1}{6}}{t^2+2t+4} dt = \frac{1}{6} \ln|t-2| - \frac{1}{12} \int \frac{t-1}{t^2+2t+4} dt = \frac{1}{6} \ln|x^2-2| - \frac{1}{12} \int \frac{2t-4}{t^2+2t+4} dt$$

$$= \frac{1}{6} \ln|x^2-2| - \frac{1}{12} \int \frac{2t+2}{t^2+2t+4} dt + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2+2t+4} = \frac{1}{6} \ln|x^2-2| - \frac{1}{12} \ln|x^2+2x+4| +$$

$$+ \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(x^2+1)^2+3} = \frac{1}{6} \ln|x^2-2| - \frac{1}{12} \ln|x^2+2x+4| + \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{x^2+1}{\sqrt{3}} + C$$

Dla obliczenia całek funkcji wymiernych typu:

$$(1.27) \quad I_n = \int \frac{dx}{(x^2+1)^n}$$

stosuje się wzór rekurencyjny, którego wyprowadzenie można znaleźć w innych opracowaniach. Wzór ten jest następujący:

$$(1.28) \quad I_n = \frac{1}{2n-2} \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} \quad \text{gdzie} \quad I_1 = \int \frac{dx}{(x^2+1)}$$

Całka 104/ jest obliczona z wykorzystaniem wzoru (1.28).

**104/**  $\int \frac{2x+1}{(x^2+2x+5)^3} dx = \int \frac{2x+2-1}{(x^2+2x+5)^3} dx = \int \frac{2x+2}{(x^2+2x+5)^3} dx - \int \frac{1}{(x^2+2x+5)^3} dx =$

$$= -\frac{1}{x^2+2x+5} - I_2$$

$$I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+2x+5)^3} = \int \frac{dx}{[(x+1)^2+4]^3} = \left| \frac{x+1}{2} \right| = \int \frac{2dt}{4(t^2+1)^3} = \frac{1}{8} \int \frac{dt}{(t^2+1)^3} =$$

$$= \frac{1}{16} \frac{t}{t^2+1} + \frac{1}{16} \int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{1}{16} \frac{t}{t^2+1} + \frac{1}{16} \arctan t = \frac{1}{8} \frac{x+1}{x^2+2x+5} + \frac{1}{16} \arctan \frac{x+1}{2}$$

Ostatecznie więc:

$$I = -\frac{1}{x^2+2x+5} - \frac{1}{8} \frac{x+1}{x^2+2x+5} - \frac{1}{16} \arctan \frac{x+1}{2} = \frac{-x-9}{8(x^2+2x+5)} - \frac{1}{16} \arctan \frac{x+1}{2} + C$$

**Uwaga:**

Najczęściej pojawiające się błędy przy wyznaczaniu całek funkcji wymiernych to: błędy obliczeniowe, błędne propozycje rozkładu funkcji wymiernej na ułamki proste.

Poniżej podano dodatkowo kilka propozycji rozkładu funkcji wymiernej na ułamki proste.

$$\frac{5x+2}{(x-2)^2(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x^2} + \frac{E}{2x+1} + \frac{F}{(2x+1)^2}$$

$$\frac{3x+7}{(2x^2-7x+3)(x^2-x-6)^2} = \frac{3x+7}{(x-3)(2x-1)(x+2)^2} = \frac{3x+7}{(x-3)^2(2x-1)(x+2)^2}$$

$$= \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{C}{(x-3)^3} + \frac{D}{2x-1} + \frac{E}{x+2} + \frac{F}{(x+2)^2}$$

## 5. Całki funkcji niewymiernych

Jest wiele postaci funkcji algebraicznych z niewymiernościami.

Stąd też jest wiele metod całkowania funkcji niewymiernych.



Warto wymienić następujące:

a/ jeżeli funkcja podcałkowa jest powyższej postaci  $\int R(x\sqrt{ax+b})dx$  to aby wyznaczyć całkę należy zastosować podstawienie:  $ax+b=t^n$ .

b/ jeżeli funkcja podcałkowa zawiera pierwiastek kwadratowy z trójmianu kwadratowego typu:

(1.29)  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}}$  to dla wyznaczenia całki należy zastosować pierwsze

podstawienie Eulera. Pomijając szczegóły wyprowadzenia wzoru otrzymujemy:

(1.30)  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}} = \ln|x+\sqrt{x^2+k}|+C$

W ten sposób obliczamy każdą całkę postaci  $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$  gdzie  $a>0$ .

c/ każdą całkę postaci  $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$  gdzie  $a < 0$  obliczamy wykorzystując

(1.31)  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$

d/ całki postaci  $\int \sqrt{ax^2+bx+c} dx$  gdzie  $a < 0$  wyznaczamy wykorzystując wzór:

(1.32)  $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{|a|} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C$

e/ całki postaci  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$  obliczamy korzystając ze wzoru:

(1.33)  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{|a|} - \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C$

f/ całki postaci  $\int \sqrt{ax^2+bx+c} dx$  gdzie  $a > 0$  wyznaczamy ze wzoru:

(1.34)  $\int \sqrt{x^2+k} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2+k} + \frac{1}{2} k \ln|x+\sqrt{x^2+k}| + C$

g/ całki postaci  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$  gdzie  $a > 0$ , wyznaczamy ze wzoru:

(1.35)  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+k}} = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2+k} - \frac{1}{2} k \ln|x+\sqrt{x^2+k}| + C$

h/ przy obliczaniu całek postaci  $\int \frac{P_n(x) dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$  stosujemy metodę współczynnika niewyznaczonych. Metoda ta zostanie przedstawiona na przykładach.

## PRZYKŁADY CAŁKOWANIA

105/

$$\int \frac{2x+1}{\sqrt{4x+1}} dx = \left| \begin{array}{l} 4x+1=t^2 \\ 4dx=2tdt \end{array} \right| \frac{t^2-1}{2} + 1 \cdot \frac{t}{2} dt = \frac{1}{4} \int t^2 + 1 dt = \frac{t^3}{12} + t + C =$$

$$\left| \begin{array}{l} 2x = \frac{t^2-1}{2} \\ 2x = \frac{t^2-1}{2} \end{array} \right|$$

$$= \frac{\sqrt{(4x+1)^3}}{12} + \sqrt{4x+1} + C$$

106/

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x+\sqrt{x}}} = \left| \begin{array}{l} x=t^6 \\ dx=6t^5 dt \end{array} \right| = \int \frac{6t^5 dt}{t^2+t^3} = \int \frac{6t^3 dt}{t^2(1+t)} = 6 \int \frac{t^3 dt}{1+t} =$$

$$= 6 \int \left( t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt = \frac{6t^3}{3} - \frac{6t^2}{2} + 6t - 6 \ln|t+1| + C = \frac{6\sqrt{x}}{3} - 3\sqrt[3]{x} + 3\sqrt[6]{x} - 6 \ln|\sqrt[6]{x}+1| + C$$



$$\text{115/} \quad \int \sqrt{1-4x^2} dx = \int \sqrt{4\left(\frac{1}{4}-x^2\right)} dx = 2 \int \sqrt{\frac{1}{4}-x^2} dx = \frac{1}{4} \arcsin 2x + x \sqrt{\frac{1}{4}-x^2} + C$$

116/

$$\int \sqrt{10-3x-x^2} dx = \int \sqrt{\frac{49}{4}-\left(x+\frac{3}{2}\right)^2} dx = \left| \begin{array}{l} x+\frac{3}{2}=t \\ dx=dt \end{array} \right| \int \sqrt{\frac{49}{4}-t^2} dt = \frac{49}{8} \arcsin \frac{2t}{7} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{49}{4}-t^2} + C =$$

$$= \frac{49}{8} \arcsin \frac{2x+3}{7} + \frac{1}{2} \sqrt{10+3x-x^2} + C$$

$$\text{117/} \quad \int \sqrt{3x^2+10x+9} dx = \int \sqrt{3\left(x+\frac{5}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}} dx = \int \sqrt{\left(x+\frac{5}{3}\right)^2 + \frac{2}{9}} dx =$$

$$\left| \begin{array}{l} x+\frac{5}{3}=t \\ dx=dt \end{array} \right| = \sqrt{3} \int \sqrt{t^2 + \frac{2}{9}} dt = \sqrt{3} \frac{1}{2} \sqrt{t^2 + \frac{2}{9}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{2}{9} \ln \left| t + \sqrt{t^2 + \frac{2}{9}} \right| + C =$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \left( x + \frac{5}{3} \right) \sqrt{\frac{3x^2+10x+9}{3}} + \frac{\sqrt{3}}{9} \ln \left| x + \frac{5}{3} + \sqrt{\frac{3x^2+10x+9}{3}} \right| + C =$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \left( x + \frac{5}{3} \right) \sqrt{3x^2+10x+9} + \frac{\sqrt{3}}{9} \ln \left| 3x+5 + \sqrt{3(3x^2+10x+9)} \right| + C$$

$$\text{118/} \quad \int \frac{5x^2-2x+10}{\sqrt{3x^2-5x+8}} dx = (ax+b) \sqrt{3x^2-5x+8} + \int \frac{4dx}{\sqrt{3x^2-5x+8}}$$

Różniczkujemy obustronnie:

$$\frac{5x^2-2x+10}{\sqrt{3x^2-5x+8}} = a \sqrt{3x^2-5x+8} + (ax+b) \frac{6x-5}{2\sqrt{3x^2-5x+8}} + \frac{4}{\sqrt{3x^2-5x+8}}$$

Obustronnie mnożymy przez  $\sqrt{3x^2-5x+8}$ 

$$5x^2-2x+10 = a(3x^2-5x+8) + (ax+b) \frac{6x-5}{2} + 4$$

Stąd układ równań:

$$\begin{cases} 10 = 12a \\ -4 = -10a - 5a + 6b \\ 20 = 16a - 5b + 24 \end{cases} \quad \begin{cases} a = \frac{5}{6} \\ b = \frac{17}{12} \\ A = \frac{165}{24} \end{cases}$$

Wstawiamy do wyjściowego wzoru:

-36-

$$I = \left( \frac{5}{6}x + \frac{17}{12} \right) \sqrt{3x^2-5x+8} + \frac{55}{8} \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-5x+8}}$$

$$I_1 = \frac{55\sqrt{3}}{24} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + \frac{71}{36}}} = \frac{55\sqrt{3}}{24} \ln \left| t + \sqrt{t^2 + \frac{71}{36}} \right| + C = \frac{55\sqrt{3}}{24} \ln \left| \frac{6x-5}{6} + \sqrt{\frac{3x^2-5x+8}{3}} \right|$$

$$I = \left( \frac{5}{6}x + \frac{17}{12} \right) \sqrt{3x^2-5x+8} + \frac{55\sqrt{3}}{24} \ln \left| 3x - \frac{5}{2} + \sqrt{3} \sqrt{3x^2-5x+8} \right| + C$$

$$\text{119/} \quad \int \frac{x^3-x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}} dx = (ax^2+bx+c) \sqrt{x^2+2x+2} + A \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}}$$

$$\frac{x^3-x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}} = (2ax+b) \sqrt{x^2+2x+2} + (ax^2+bx+c) \frac{2(x+1)}{2\sqrt{x^2+2x+2}} + \frac{A}{\sqrt{x^2+2x+2}}$$

$$x^3-x+1 = (2ax+b)(x^2+2x+2) + (ax^2+bx+c)(x+1) + A$$

$$x^3-x+1 = x^3(3a) + x^2(5a+2b) + x(4a+3b+c) + (2b+c+A)$$

$$\begin{cases} 3a=1 \\ 5a+2b=0 \\ 4a+3b+c=-1 \\ 2b+c+A=1 \end{cases} \quad \begin{cases} a=\frac{1}{3} \\ b=-\frac{5}{6} \\ c=\frac{1}{6} \\ A=\frac{15}{6} \end{cases}$$

$$I = \left( \frac{1}{3}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} \right) \sqrt{x^2+2x+2} + \frac{15}{6} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}}$$

$$I_1 = \frac{5}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} = \frac{5}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2+1}} \left| \begin{array}{l} x+1=t \\ dx=dt \end{array} \right| = \frac{5}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} = \frac{5}{2} \ln |x+1| + \sqrt{x^2+2x+2} + C$$

$$I = \left( \frac{1}{3}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6} \right) \sqrt{x^2+2x+2} + \frac{5}{2} \ln |x+1| + \sqrt{x^2+2x+2} + C$$

- 37 -

Do obliczenia całek (118) i (119) zastosowano metodę współczynnika niewyznaczonych.

$$\underline{\text{120.}} \quad \int (2x-5)\sqrt{2+3x-x^2} dx = \int \frac{(2x-5)(2+3x-x^2)}{\sqrt{2+3x-x^2}} dx = \int \frac{-2x^3+11x^2-11x-10}{\sqrt{2+3x-x^2}} dx$$

Dla wyznaczenia całki (20) należy w dalszej kolejności zastosować metodę współczynników nieoznaczonych.

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &= t \\ \frac{dx}{x\sqrt{10x-x^2}} &= \frac{1}{x} = t \\ &= \int \frac{-dt}{t^2} = -\int \frac{1}{t^2} = -\int \frac{1}{\sqrt{10}-t}} \\ &= -\int \frac{dt}{\sqrt{10}-t}} = -\int \frac{tdt}{t\sqrt{10}-t}} = -\int \frac{tdt}{\sqrt{10}-t}} \\ &= -\int \frac{\sqrt{10x-x^2}}{5x} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{122}{122} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x+2}} &= \int \frac{1}{x+1} \cdot \frac{1}{f} \cdot dx = -\int \frac{dt}{f^2} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{f^2+1}} \\ &= -\ln \left| x + \sqrt{f^2+1} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x+1} + \sqrt{\left( \frac{1}{x+1} \right)^2 + 1} \right| + C = \ln \left| \frac{x+1}{1 + \sqrt{x^2+2x+2}} \right| + C \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\sqrt{123}} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}} = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right| \quad \frac{dx}{x^2} = -\frac{dl}{l^2} = \int \frac{-l^3 dl}{l^2 \sqrt{1+\frac{1}{l^2}}} = -\int \frac{l^2 dl}{\sqrt{l^2+1}}$$

$$C + \frac{1 + \sqrt{1 + x^2}}{x} \ln \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1 + x^2} + 1}{\sqrt{1 + x^2} - 1} \right| + C = -\frac{1}{2} \sqrt{1 + x^2} + \frac{1}{2} \ln \left| k + \sqrt{1 + x^2} \right| + C$$

Dla wyznaczenia całek 121/, 122/, 123/ zastosowano poniższe podstawienie

$$\frac{dx}{(x-k)^n \sqrt{ax^2+bx+c}}.$$

naależy podstawić (1.37)  $\frac{1}{X-k}$

## 6. Calki funkcji trygonometrycznych

Jedną z ważniejszych metod całkowania funkcji trygonometrycznych jest zastosowanie jednego z podstawień tzw. uniwersalnego. Wzory (1.38) oraz (1.39) dotyczą właśnie tych dwóch podstawień. Podstawienia te pozwalają sprowadzić całkę zawierającą funkcje trygonometryczne do całki funkcji wymiernej.

(1.38)

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \frac{x}{2} &= u & x &= 2 \operatorname{arctg} u & dx &= \frac{2 du}{1+u^2} & \sin x &= \frac{2u}{1+u^2} \\ \cos x &= \frac{1-u^2}{1+u^2} & \operatorname{tg} x &= \frac{2u}{1-u^2} \end{aligned}$$

(1.39)

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} x &= n & x &= \operatorname{arctg} n & dx &= \frac{dn}{1+n^2} & \sin^2 x &= \frac{n^2}{1+n^2} \\ \cos^2 x &= \frac{1}{1+n^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{124/}{\int \frac{dx}{3\sin x + 4\cos x}} &= \int \frac{2du}{\frac{1+u^2}{3} + 4 \cdot \frac{1-u^2}{1+u^2}} = \int \frac{du}{-2u^2 + 3u + 2} = \int \frac{du}{-2(u-2)\left(u+\frac{1}{2}\right)} = \\ &= -\int \frac{du}{(u-2)(2u+1)} = I \end{aligned}$$

$$\frac{1}{(n-2)(2u+1)} = \frac{A}{n-2} + \frac{B}{2u+1} = \frac{u(4+B)+A-2B}{(n-2)(2u+1)}$$

$$\begin{cases} 2A + B = 0 \\ A - 2B = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} A = -\frac{1}{5} \\ B = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$I = -\frac{1}{5} \int \frac{du}{u-2} + \frac{2}{5} \int \frac{du}{2u+1} = -\frac{1}{5} \ln|u-2| + \frac{2u+1=I}{2} \left| \frac{2}{5} \int \frac{dI}{I} = -\frac{1}{5} \ln|u-2| + \frac{1}{5} \ln|2u+1| \right| =$$

$$+ C - \frac{1}{5} \ln \left| \frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right| - \frac{1}{5} \ln \left| \frac{2u + 1}{u - 2} \right| = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{2lg \frac{x^2 + 1}{x^2 - 2}}{u - 2} \right| + C$$

$$\begin{aligned} \frac{125/}{\int \frac{dx}{1+3\cos^2 x}} &= \int \frac{\frac{du}{1+u^2}}{1+3\frac{1}{1+u^2}} = \int \frac{du}{u^2+4} = \int \frac{du}{\left(\frac{u}{2}\right)^2+1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\left(\frac{u}{2}\right)^2+1} = \frac{1}{2} \left| \frac{u}{2} = z \right| \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z^2+1} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} z + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{u}{2} + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x}{2} + C \end{aligned}$$

Dla całki  $\frac{124/}{\int \frac{dx}{1+3\cos^2 x}}$  zastosowano wzory (1.38), a dla całki  $\frac{125/}{\int \frac{dx}{1+3\cos^2 x}}$  wzory (1.39). Aby wyznaczyć niektóre całki zawierające funkcje trygonometryczne należy przekształcać wyrażenia podcałkowe wykorzystując wzory trygonometryczne. Wyznaczenie poniższych całek odbywa się z wykorzystaniem wzorów trygonometrycznych.

$$\frac{126/}{\int \cos 2x \cos 3x dx} = \frac{1}{2} \int 2 \cos 2x \cos 3x dx = \frac{1}{2} \int (\cos ax + \cos bx) dx = I$$

Wykorzystano wzór:

$$(1.40) \quad \cos ax + \cos bx = 2 \cos \frac{ax+bx}{2} \cos \frac{ax-bx}{2}$$

$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = 2 \\ \frac{a-b}{2} = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} a=5 \\ b=-1 \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{2} \int (\cos 5x + \cos(-x)) dx = \frac{1}{2} \int \cos 5x dx + \frac{1}{2} \int \cos x dx = \frac{1}{10} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin x + C$$

$$\frac{127/}{\int \sin 2x \sin 5x dx} = -\frac{1}{2} \int (\cos ax - \cos bx) dx = I$$

Dla wyznaczenia całki  $\frac{127/}{\int \sin 2x \sin 5x dx}$  wykorzystamy wzór:

$$(1.41) \quad \cos ax - \cos bx = -2 \sin \frac{ax+bx}{2} \sin \frac{ax-bx}{2}$$

$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = 2 \\ \frac{a-b}{2} = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} a=7 \\ b=-3 \end{cases}$$

$$I = -\frac{1}{2} \int (\cos 7x - \cos(-3x)) dx = -\frac{1}{2} \int \cos 7x dx + \frac{1}{2} \int \cos 3x dx = -\frac{1}{14} \sin 7x + \frac{1}{6} \sin 3x + C$$

$$\begin{aligned} \frac{128/}{\int \frac{dx}{\sin x}} &= \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{\sin x dx}{1 - \cos^2 x} = \int \frac{\cos x = z}{-\sin x dx = dz} = -\int \frac{dz}{1-z^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z+1} \\ &= \frac{1}{2} \ln|z-1| - \frac{1}{2} \ln|z+1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C \end{aligned}$$

- 40 -

$$\frac{129/}{\int \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} dx} = \int \frac{\sin^2 x \sin x dx}{\cos^3 x} = \int \frac{(1 - \cos^2 x) \sin x dx}{\cos^3 x} = \int \frac{\cos x = t}{-\sin x dx = dt} = -\int \frac{(1-t^2) dt}{t^3} =$$

$$= -\int \frac{2t^2 + t^4}{t^3} dt = -\int \frac{dt}{t^3} + 2 \int \frac{t dt}{t^3} = \frac{1}{2t^2} - 2 \ln|t| + C = \frac{1}{2\cos^2 x} + 2 \ln|\cos x| - \frac{\cos^2 x}{2} + C$$

$$\begin{aligned} \frac{130/}{\int \frac{dx}{\cos x}} &= \int \frac{dx}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sin\left(\frac{t}{2} + x\right)} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sin\left(\frac{t}{2} + x\right)} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sin\left(\frac{t}{2} + x\right)} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sin\left(\frac{t}{2} + x\right)} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sin\left(\frac{t}{2} + x\right)} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t}{2} + C \right| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{131/}{\int \frac{dx}{\sin x \cos^2 x}} &= \int \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\sin x \cos^2 x} dx = \int \frac{\cos^2 x dx}{\sin x \cos^2 x} + \int \frac{\sin^2 x dx}{\sin x \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\sin x} + \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \\ &= \frac{1}{2} \ln|\operatorname{tg} x| - \frac{1}{t} + C = \frac{1}{2} \ln|\operatorname{tg} x| - \frac{1}{\cos x} + C \end{aligned}$$

$$\frac{132/}{\int \operatorname{tg}^2 x dx} = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int dx = \operatorname{tg} x - x + C$$

Wykorzystano wzór:

$$(1.42) \quad \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$$

$$\frac{133/}{\int \frac{xdx}{\cos^2 x}} = \left| \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = \frac{dx}{\cos^2 x} & v = \operatorname{tg} x \end{array} \right| = x \operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg} x dx = x \operatorname{tg} x - \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = x \operatorname{tg} x + \ln|\cos x| + C$$

$$\begin{aligned} \frac{134/}{\int \frac{5 \sin x + \cos x}{2 \sin^2 x \cos x + 2 \cos^3 x} dx} &= \int \frac{5 \sin x + \cos x}{2 \sin^2 x \cos x + 2 \cos^3 x} \cdot \frac{1}{\cos^3 x} dx = \int \frac{5 \sin x + \cos x}{2 \sin^2 x \cos^3 x + 2 \cos^3 x} dx = \int \frac{5 \operatorname{tg} x + 1}{2 \operatorname{tg}^2 x + 2 \cos^3 x} dx \\ &= \int \frac{\operatorname{tg} x = t}{\cos^2 x = dt} = \frac{1}{2} \int \frac{5t + 3}{t^2 + 1} dt = \frac{5}{4} \int \frac{5t + 3}{t^2 + 1} dt = \frac{5}{4} \int \frac{2t + \frac{6}{t}}{t^2 + 1} dt = \frac{5}{4} \ln|t^2 + 1| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} t + C = \frac{5}{4} \ln|\operatorname{tg}^2 x + 1| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos x} &= \int \frac{\sin x = t}{\cos x = \sqrt{1-t^2}} = \int \frac{dt}{t^2(1-t^2)} = \int \frac{-dt}{t^2(t-1)(t+1)} = \int \frac{dt}{t^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t-1} \\ dx &= \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{t} + \frac{1}{2} \ln|t+1| - \frac{1}{2} \ln|t-1| + C = -\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sin x + 1}{\sin x - 1} \right| + C$$

$$\int \frac{\cos^3 x dx}{\sin^2 x + 1} = \int \cos^2 x \cos x dx = \int \sin x = t \quad \cos x dx = dt = \int \frac{(1-t^2) dt}{t^2 + 1} = \int (-1 + \frac{2}{t^2 + 1}) dt =$$

$$= -\int dt + 2 \int \frac{dt}{t^2 + 1} = -t + 2 \arctan t + C = -\sin x + 2 \arctan(\sin x) + C$$

$$\int \frac{t g x dx}{t g x + 2} = \left| \frac{\sin x}{\cos x} \right| = \int \frac{\sin x dx}{\sin x + 2 \cos x} = \left| \frac{t g x = t}{\sin x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}} \right| \frac{dx = \frac{dt}{1+t^2}}{\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}} =$$

$$= \int \frac{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} + 2} = \int \frac{t dt}{(t+2)\sqrt{1+t^2}} = -\frac{2}{5} \int \frac{dt}{t+2} + \frac{1}{5} \int \frac{(2t+1) dt}{t^2+1} = -\frac{2}{5} \ln|t+2| + \frac{1}{5} \ln|t^2+1| + \frac{1}{5} \arctan t + C =$$

$$= -\frac{2}{5} \ln|g x + 2| + \frac{1}{5} \ln|g^2 x + 1| + \frac{1}{5} \arctan(g x) + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^3 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^3 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^3 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos x} = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \int \frac{dx}{\cos^3 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^3 x} + \int \frac{dx}{\cos x} = \int \sin x \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx + \int \frac{dx}{\cos x} =$$

$$= \left| u = \sin x \quad \frac{du}{dx} = \cos x \right| \frac{1}{\cos^3 x} = \int \frac{\sin x dx}{\cos^3 x} + \frac{1}{2} \ln \left| g \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right|$$

Pomocniczo wyznaczamy:

$$\int \frac{\sin x dx}{\cos^3 x} = \left| \cos x = t \quad -\sin x dx = dt \right| = -\int \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{2t^2} + C = \frac{1}{2 \cos^2 x} + C$$

$$I_1 = \frac{\sin x}{2 \cos^2 x} + \frac{1}{2} \ln \left| g \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C$$

$$I_2 = \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos x} dx = \int \frac{dx}{\cos x} + \int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x} = \ln \left| g \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| +$$

$$+ \left| \frac{\sin x = t}{\cos x dx = dt} \right| = \ln \left| g \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + \int \frac{dt}{t^2} = \ln \left| g \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| - \frac{1}{\sin x} + C$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$I = \frac{\sin x}{2 \cos^2 x} - \frac{1}{\sin x} + \frac{3}{2} \ln \left| g \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C$$

$$\int \sin^4 x \cos^5 x dx = \int \sin^4 x \cos^4 x \cos x dx = \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x)^2 \cos x dx = \left| \sin x = t \quad \cos x dx = dt \right| =$$

$$= \int t^4 (1-t^2)^2 dt = \int (t^4 - 2t^6 + t^8) dt = \frac{t^5}{5} - \frac{2t^7}{7} + \frac{t^9}{9} + C = \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{2 \sin^7 x}{7} + \frac{\sin^9 x}{9} + C$$

$$\int \frac{\sqrt{t g x} dx}{\sin 2x} = \int \frac{\sqrt{t g x} dx}{2 \sin x \cos x} = \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{t g x} \cos x}{\sin x \cos^2 x} dx = \left| t g x = t \right| \frac{dx}{\cos^2 x} =$$

$$= \frac{1}{2} \int t^{\frac{1}{2}} t^{-1} dt = t^{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{t g x} + C$$

## 7. Całki funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Całki postaci  $\int R(e^x) dx$  wyznacza się przez podstawienie  $e^x = t$ .

### P R Z Y K Ł A D Y C A Ł K O W A N I A

$$\int (e^{3x} + \sqrt{e^x}) dx = \left| e^x = t \quad e^x dx = dt \right| \frac{dt}{t} = \int \left( t^3 + t^{\frac{1}{2}} \right) \frac{dt}{t} = \frac{t^3}{3} - \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = \frac{1}{3} e^{3x} - 2 e^{\frac{1}{2}x} + C$$

$$\int \frac{e^x + 1}{e^x - 1} dx = \left| e^x = t \quad dx = \frac{dt}{t} \right| = \int \frac{t+1}{t-1} \frac{dt}{t} = \int \frac{t+1}{t(t-1)} dt = I$$

Pomocniczo rozkładamy funkcję wymierną na ułamki proste:

$$\frac{r+1}{r(r-1)} = -\frac{1}{r} + \frac{2}{r-1}$$

$$I = \int \frac{-dr}{r} + 2 \int \frac{dr}{r-1} = -\ln|r| + 2 \ln|r-1| + C = -\ln e^r + \ln(e^r - 1)^2 + C$$

**142/**

$$\int \frac{e^{2x} dx}{e^2 + 2} = \left| e^x = r \quad dx = \frac{dr}{r} \right| = \int \frac{r^2 dr}{r(r+2)} = \int \left( r - 2 + \frac{4r}{r(r+2)} \right) dr = \frac{r^2}{2} - 2r + 4 \ln|r+2| + C = \frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + 4 \ln|e^x + 2| + C$$

**143/**

$$\int \frac{dx}{e^{3x} - e^x} = \left| e^x = r \quad dx = \frac{dr}{r} \right| = \int \frac{dr}{r^2(r^2-1)} = \int \frac{dr}{r^2(r-1)(r+1)} = -\int \frac{dr}{r^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dr}{r-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dr}{r+1} = -\frac{1}{r} + \frac{1}{2} \ln|r-1| - \frac{1}{2} \ln|r+1| = \frac{1}{e^x} + \frac{1}{2} \ln|e^x - 1| - \frac{1}{2} \ln|e^x + 1| + C$$

Pomocniczo rozłożono funkcję wymierną na ułamki proste:

$$\frac{1}{r^2(r^2-1)} = \frac{A}{r} + \frac{B}{r^2} + \frac{C}{r-1} + \frac{D}{r+1} = -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{2(r-1)} - \frac{1}{2(r+1)}$$

**144/**

$$\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \left| e^x = r \quad dx = \frac{dr}{r} \right| = \int \frac{r' - \frac{1}{r'}}{r + \frac{1}{r'}} = \int \frac{r'^2 - 1}{r^2 + 1} \frac{dr}{r} = \int \left( \frac{1}{r} - \frac{2r}{r^2 + 1} \right) dr = -\int \frac{dr}{r} + 2 \int \frac{r dr}{r^2 + 1} =$$

$$= -\ln|e^x| + \ln|e^{2x} + 1| + C = \ln|e^{2x} + 1| - x + C$$

**145/**

$$\int x^3 e^{-x} dx = \left| \begin{array}{ll} u = x^3 & du = 3x^2 dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{array} \right| = -xe^{-x} + 3 \int x^2 e^{-x} dx \quad \left| \begin{array}{ll} u = x^2 & du = 2x dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{array} \right| =$$

$$= -xe^{-x} - 3x^2 e^{-x} + 6 \int xe^{-x} dx = -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} + 6 \left| \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = e^{-x} & v = -e^{-x} \end{array} \right| =$$

$$= -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} - 6xe^{-x} + 6 \int e^{-x} dx = -xe^{-x} - 3x^2 e^{-x} - 6xe^{-x} - 6e^{-x} + C$$

**146/**  $\int \frac{a^x dx}{a^{2x} + 1} = \left| a^x = r \quad \ln a^x = \ln r \quad dx = \frac{dr}{r \ln a} \right| = \int \frac{dr}{\ln a (r^2 + 1)} = \frac{1}{\ln a} \int \frac{dr}{r^2 + 1} =$

$$= \frac{1}{\ln a} \arctan r + C = \frac{1}{\ln a} \arctan(a^x) + C$$

**147/**

$$\int \log_3 x dx = \int \frac{\ln x dx}{\ln 3} = \frac{1}{\ln 3} \int \ln x dx = \frac{1}{\ln 3} \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & du = \frac{dx}{x} \\ dv = dx & v = x \end{array} \right| = \frac{1}{\ln 3} (x \ln x - x) + C$$

Do wyznaczenia całki **147/** wykorzystano wzór:

$$3^{\log_3 x} = x \quad \ln 3 \log_3 x = \ln x \quad \log_3 x = \frac{\ln x}{\ln 3} \quad (1.43)$$

**148/**

$$\int \frac{e^{-3x} dx}{\sqrt{1+e^{-3x}}} = \left| \sqrt{1+e^{-3x}} = t \quad -\frac{3e^{-3x} dx}{2\sqrt{1+e^{-3x}}} = dt \right| = -\frac{2}{3} \int dt = -\frac{2t}{3} + C = -\frac{2\sqrt{1+e^{-3x}}}{3} + C$$

## 8. Całki funkcji hiperbolicznych

Całki funkcji hiperbolicznych wyznacza się tymi samymi sposobami co inne całki. Należy wykorzystywać wzory dotyczące związków pomiędzy tymi funkcjami oraz wzory dotyczące całkowania funkcji hiperbolicznych. Poniżej podane są najważniejsze z nich.

$$(1.44) \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (1.45) \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$(1.46) \quad \operatorname{th} x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (1.47) \quad \operatorname{ctg} h x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$(1.48) \quad \cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x \quad (1.49) \quad \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$(1.50) \quad \operatorname{ch}^2 x = \frac{\operatorname{ch} 2x + 1}{2} \quad (1.51) \quad \operatorname{sh}^2 x = \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{2}$$

$$(1.52) \quad \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x = \frac{\operatorname{sh} 2x}{2} \quad (1.53) \quad \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$$

$$(1.54) \quad \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C \quad (1.55) \quad \int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C$$

$$(1.56) \quad \int \frac{dx}{sh^2 x} = -chl x + C$$

# PRZYKŁADY CAŁKOWANIA

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} dx = \int \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} dx = \int \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du \quad \left( u = \frac{1}{x}, \quad \frac{du}{dx} = -\frac{1}{x^2} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{[50]} \quad \int ch^3 x dx &= \int chx ch^2 x dx = \int (chx)(1 + sh^2 x) dx = \int shx = I \quad chx dx = d| = \int (1 + t^2) dt = \\ &= I + \frac{t^3}{3} + C = shx + \frac{sh^3 x}{3} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} &= \left| x = \sinh \sqrt{x^2 + 1} = \cosh \right. & dx = \cosh t &= \int \frac{\cosh t}{\sinh^2 t \cosh t} = \int \frac{dt}{\sinh^2 t} = -\coth t + C \\ &= -\frac{\cosh t}{\sinh t} + C = -\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{5x} \int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx &= \left| x = \cosh t \quad \sqrt{x^2-1} = \sinh t \quad dx = \sinh t \, dt \right| = \frac{1}{5} \int \frac{\sinh t \cosh t}{\cosh t} dt = \frac{1}{5} \int \sinh^2 t \cosh t \, dt \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{\sinh^2 t}{\sinh^2 t + 1} \cosh t \, dt = \left| \sinh t = k \quad \cosh t = dk \right| = \frac{1}{5} \int \frac{k^2 dk}{k^2 + 1} = \frac{1}{5} k - \frac{1}{5} \arctan k + C = \frac{1}{5} \sinh t - \frac{1}{5} \arctan \sinh t + C \\ &= \frac{1}{5} \sqrt{x^2-1} - \frac{1}{5} \arctan \sqrt{x^2-1} + C \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\sqrt{(x^2 + 4)^3}} = \frac{1}{x} = \frac{2 \sin}{2 \cos} \frac{\sqrt{x^2 + 4} = 2 \cos}{dx = 2 \cos t} \left| = \int \frac{2 \cos t}{(2 \cos)^3} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\cos^2 t} = \right.$$

$$\begin{aligned} \frac{154}{2} \\ \int \sqrt{x^2+9} dx &= \left| x = 3\sinh t \right| \quad \sqrt{x^2+9} = 3ch t \quad dx = 3ch t dt \quad = 9 \int ch^2 t dt = 9 \int \frac{ch 2t + 1}{2} \\ &= \frac{9}{2} ch 2t dt + \frac{9}{2} \int dt = \frac{9}{2} sh 2t + \frac{9}{2} t + C = \frac{9}{2} \frac{x\sqrt{x^2+9}}{2} + \frac{9}{2} \ln \left| \frac{x+\sqrt{x^2+9}}{3} \right| + C \end{aligned}$$

- 46 -

$$\int |x^2 - x| dx = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int (x^2 - x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + C_1 \quad \text{dla } x \in (-\infty, 0] \\ I_2 &= \int (x - x^2) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + C_2 \quad \text{dla } x \in [0, 1] \\ I_3 &= \int (x^2 - x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + C_3 \quad \text{dla } x \in [1, \infty) \end{aligned}$$

Ostatecznie pozostało dobrać tak stałe  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  aby funkcja podcałkowa pozostała ciągła w punktach  $x = 0$  oraz  $x = 1$ .

Jeżeli  $C_1 = C = C_2$  oraz  $C_3 = 1/3 + C_1$  to warunek ten będzie spełniony.

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x+\sqrt{x+2}} dx &= \int \frac{t^2-1}{t^2-2+t} 2tdt = 2 \int \frac{t^3-t}{t^2+t-2} dt = 2 \int (t-1 + \frac{2t-2}{t^2+t-2}) dt = \\ &= t^2-2t+4 \int \frac{t-1}{t^2+t-2} dt = x+2-2\sqrt{x+2}+4 \int \frac{t-1}{(t-1)(t+2)} dt = x+2-2\sqrt{x+2}+4 \int \frac{dt}{t+2} = \\ &= x+2-2\sqrt{x+2}+4 \ln|t+2|+C = x+2-2\sqrt{x+2}+4 \ln|\sqrt{x+2}+2|+C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{157}{2} \left| \frac{x + \sqrt{2x-3}}{x-1} \right|_{x=1}^{2x-3} = \frac{2x-3}{2} \left| \frac{t^2+3}{t^2+3} + t \right|_{t=1}^{t^3+2t^2+3t} = \int \frac{t^3+2t^2+3t}{t^2+1} dt = \int (t+2+\frac{2t-2}{t^2+1}) dt \\ & = \frac{t^2}{2} + 2t + \frac{2 \ln t}{t^2+1} - 2 \int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{2x-3}{2} + 2\sqrt{2x-3} + \ln|t|^2 + 1 - 2 \arctan t + C = \frac{2x-3}{2} + 2\sqrt{2x-3} + \ln|2x-3| - 2 \arctan \sqrt{2x-3} + C \end{aligned}$$

$$\frac{158}{\int \frac{dx}{x - \sqrt{x^2 - x + 1}}} = \left| \sqrt{x^2 - x + 1} = x - t \quad x = \frac{t^2 - 1}{2t - 1} \quad dx = \frac{2(t^2 - t + 1)}{(2t - 1)^2} dt \right| =$$

- 47 -



$$= \int \frac{2(t^2 - t + 1)}{(2t - 1)^2} dt = 1$$

$$\frac{t^2 - t + 1}{(2t - 1)^2} = \frac{A}{2t - 1} + \frac{B}{(2t - 1)^2} + \frac{C}{(2t - 1)^3}$$

$$\begin{cases} 4A + 2B = 1 \\ C - 4A - B = -1 \\ A = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -\frac{3}{2} \\ C = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$I = 2 \int \frac{dt}{t} - 3 \int \frac{dt}{2t - 1} + 3 \int \frac{dt}{(2t - 2)^2} = 2 \ln|t| - \frac{3}{2} \ln|2t - 1| - \frac{3}{2t} = 2 \ln|x - \sqrt{x^2 - x + 1}| - \frac{3}{2} \ln|2x - 2\sqrt{x^2 - x + 1} - 1| - \frac{3}{2(x - \sqrt{x^2 - x + 1} - 1)} + C$$

**159/**

$$\int \frac{\sin^2 x dx}{1 + \cos^2 x} = \int \frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos^2 x} = \int \frac{1}{1 + \cos^2 x} - \int \frac{\cos^2 x}{1 + \cos^2 x}$$

$$\int \frac{1}{1 + \cos^2 x} = \int \frac{1}{1 + \frac{1 + \cos 2x}{2}} = \int \frac{2}{2 + 1 + \cos 2x} = \int \frac{2}{3 + \cos 2x}$$

$$\int \frac{2}{3 + \cos 2x} = \int \frac{2}{3 + \frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2}} = \int \frac{4}{6 + e^{2ix} + e^{-2ix}} = \int \frac{4}{e^{2ix} + 6 + e^{-2ix}} = \int \frac{4e^{2ix}}{e^{4ix} + 6e^{2ix} + 1} = \int \frac{4e^{2ix}}{(e^{2ix} + 3)^2} = \int \frac{4u}{(u + 3)^2} = \int \frac{4(u + 3 - 3)}{(u + 3)^2} = \int \frac{4}{u + 3} - \int \frac{12}{(u + 3)^2} = 4 \ln|u + 3| + \frac{12}{u + 3} = 4 \ln|e^{2ix} + 3| + \frac{12}{e^{2ix} + 3}$$

$$= 2 \int \frac{dt}{2 \left( \left( \frac{t}{\sqrt{2}} \right)^2 + 1 \right)} - \arctg t = \sqrt{2} \arctg \left( \frac{t}{\sqrt{2}} \right) - \arctg(t \sqrt{2}) + C$$

**160/**

$$\int x|x| dx = F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + C_1 & x > 0 \\ \frac{x^2}{2} & x = 0 \\ -\frac{x^2}{2} + C_2 & x < 0 \end{cases}$$

Funkcja F(x) jest różniczkowalna w R, więc jest także różniczkowalna dla x = 0. Stąd:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = F(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{x^2}{2} + C_1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( -\frac{x^2}{2} + C_2 \right) = C$$

$$C_1 = C_2 = C$$

gdzie C jest dowolną stałą.

**161/**  $\int |x - 1| dx = I$

$$F(x) = \begin{cases} x - 1 & x > 1 \\ 0 & x = 1 \\ -x + 1 & x < 1 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - x + C_1 & x > 1 \\ C & x = 1 \\ -\frac{x^2}{2} + x + C_2 & x < 1 \end{cases}$$

Ponieważ F(x) jest różniczkowalna w R, więc jest różniczkowalna w punkcie x = 1 a stąd ciągła dla x = 1. Stąd:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = F(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{x^2}{2} - x + C_1 \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left( -\frac{x^2}{2} + x + C_2 \right) = C$$

$$C_1 - \frac{1}{2} = C_2 + \frac{1}{2} = C$$

$$C_2 = C_1 - 1$$

gdzie C<sub>1</sub> jest dowolną stałą.

**162/**

$$\int \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \int \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \int \frac{\arcsin x}{1 - x^2} dx$$

$$= \int \frac{\arcsin x}{1 - x^2} dx = \int \frac{\arcsin x}{(1 - x)(1 + x)} dx = \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx$$

$$= \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx = \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx = \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx$$

$$= \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx = \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx = \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx$$

$$= \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx = \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx = \int \frac{\arcsin x}{1 - x} dx - \int \frac{\arcsin x}{1 + x} dx$$

**163/**

$$\int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2}$$

$$= \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2}$$

$$= \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2} = \int \frac{x^2 \arctg x dx}{1 + x^2}$$

**164/**

$$\int \frac{x \operatorname{arctg} x dx}{(1+x^2)^2} = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arctg} x \\ dv = \frac{xdx}{(1+x^2)^2} \end{array} \right| \quad \frac{du}{1+x^2} = \frac{dx}{1+x^2} \quad v = \int dv = -\frac{1}{2(1+x^2)} = -\frac{\operatorname{arctg} x}{2(1+x^2)^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} =$$

$$= -\frac{\operatorname{arctg} x}{2(1+x^2)^2} + \frac{1}{2} \left( \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x \right) = \frac{(x^2-1) \operatorname{arctg} x + x}{4(x^2+1)} + C$$

Do obliczenia całki **164/** wykorzystano wzór rekurencyjny (1.28).

**165/**

$$\int \frac{\operatorname{arcsin} x}{x^2} dx = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arcsin} x \\ dv = \frac{dx}{x^2} \end{array} \right| \quad \frac{du}{x} = \frac{dx}{x \sqrt{1-x^2}} \quad v = -\frac{1}{x} = -\frac{1}{x} \quad \frac{du}{x} = \frac{dx}{x \sqrt{1-x^2}} = \frac{\operatorname{arcsin} x}{x} + I$$

$$I = \int \frac{dx}{x \sqrt{1-x^2}} = \left| \begin{array}{l} \frac{1}{x} = t \\ \frac{dx}{x^2} = dt \end{array} \right| = \int \frac{-\frac{dt}{t^2}}{1-\frac{1}{t^2}} = \int \frac{-\frac{dt}{t^2}}{\frac{t^2-1}{t^2}} = \int \frac{-dt}{t^2-1} = -\ln |t^2-1| = -\ln \left| \frac{1}{x^2} - 1 \right| =$$

$$= -\ln \left| \frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} \right| + C$$

$$\int \frac{\operatorname{arcsin} x}{x^2} dx = \frac{\operatorname{arcsin} x}{x} - \ln \left| \frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} \right| + C = \frac{\operatorname{arcsin} x}{x} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C$$

**166/**

$$\int \frac{\operatorname{arcsin} e^x}{e^x} dx = e^x dx = dt = \int \frac{\operatorname{arcsin} t}{t^2} dt = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arcsin} t \\ dv = \frac{dt}{t^2} \end{array} \right| \quad \frac{du}{v} = \frac{dt}{t^2} \quad v = -\frac{1}{t} = -\frac{1}{e^x} \quad \frac{du}{v} = \frac{dt}{t^2} = -\frac{\operatorname{arcsin} t}{t} + \int \frac{dt}{t \sqrt{1-t^2}} =$$

$$= -\frac{\operatorname{arcsin} e^x}{e^x} + I$$

$$I = \int \frac{dt}{t \sqrt{1-t^2}} = \left| \begin{array}{l} \frac{1}{t} = z \\ \frac{dt}{t^2} = dz \end{array} \right| = \int \frac{-\frac{dz}{z^2}}{\sqrt{z^2-1}} = \int \frac{-dz}{\sqrt{z^2-1}} = -\ln |z + \sqrt{z^2-1}| = -\ln \left| \frac{1}{t} + \sqrt{\frac{1}{t^2}-1} \right| =$$

$$I = -\ln \left| \frac{1 + \sqrt{1-e^{2x}}}{e^x} \right| = -\ln |1 + \sqrt{1-e^{2x}}| + \ln e^x = x - \ln |1 + \sqrt{1-e^{2x}}|$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$\int \frac{\operatorname{arcsin} e^x}{e^x} dx = -e^{-x} \operatorname{arcsin} e^x + x - \ln |1 + \sqrt{1-e^{2x}}| + C$$

**167/**

$$\int x^3 \operatorname{arctg} x dx = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arctg} x \\ dv = x^3 dx \end{array} \right| \quad \frac{du}{v} = \frac{dx}{x^4} = \frac{x^4 \operatorname{arctg} x}{4} - \frac{1}{4} \int \frac{x^4 dx}{1+x^2} = \frac{x^4 \operatorname{arctg} x}{4} - \frac{1}{4} \int \frac{x^4-1+1}{1+x^2} dx =$$

$$\frac{x^4 \operatorname{arctg} x}{4} - \frac{x^3}{4} + \frac{x}{4} \operatorname{arctg} x - \frac{(x^4-1) \operatorname{arctg} x - x^3 + x}{4} + C$$

**168/**

$$\int \frac{dx}{(1+4x^2) \operatorname{arctg} 2x} = \left| \begin{array}{l} u = \operatorname{arctg} 2x \\ du = \frac{2dx}{1+4x^2} \end{array} \right| = \frac{2dx}{1+4x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{2u} = -\frac{1}{2 \operatorname{arctg} 2x} + C$$

**169/**

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \arccos^2 x} = \left| \begin{array}{l} u = \arccos x \\ du = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \end{array} \right| = \int \frac{du}{u^2} = \frac{1}{u} = \frac{1}{\arccos x} + C$$

**170/**

$$\int \ln(x + \sqrt{x^2+1}) dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) \\ dv = dx \end{array} \right| \quad \frac{du}{v} = \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = x \ln |x + \sqrt{x^2+1}| - \int \frac{xdx}{\sqrt{x^2+1}} =$$

$$= x \ln |x + \sqrt{x^2+1}| - \frac{1}{2} \int \frac{2xdx}{\sqrt{x^2+1}} = x \ln |x + \sqrt{x^2+1}| - \sqrt{x^2+1} + C$$

**171/**

$$\int \ln |3+4x| dx = \left| \begin{array}{l} 3+4x = t \\ 4dx = dt \end{array} \right| = \frac{1}{4} \int dt \ln t = \frac{1}{4} \left( u = \ln t \quad \frac{du}{v} = \frac{dt}{t} \right) = \frac{1}{4} t \ln t - \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t} =$$

$$= \frac{1}{4} (3+4x) \ln |3+4x| - \frac{1}{4} (3+4x) + C$$

**172/**

$$\int \frac{dx}{x(1+\ln^2|x|)} = \left| \begin{array}{l} \ln|x| = t \\ \frac{dx}{x} = dt \end{array} \right| = \int \frac{dt}{1+t^2} = \operatorname{arctg} t + C = \operatorname{arctg} (\ln|x|) + C$$



**183/**

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^3-1}} = |x^3-1=t^2 \quad 3x^2 dx = 2tdt \quad x^3=t^2+1| = \frac{2}{3} \int \frac{tdt}{t(t^2+1)} = \frac{2}{3} \operatorname{arctg} t = \frac{2}{3} \operatorname{arctg} \sqrt{x^3-1} + C$$

**184/**

$$\int \frac{dx}{1+tgx} = \left| \begin{array}{l} tgx = t \\ \frac{dx}{1+tgx} = \frac{dt}{1+t^2} = dx \end{array} \right| = \int \frac{1+t^2}{1+t^2} = \int \frac{dt}{(1+t)(1+t^2)} = I$$

Pomocniczo należy rozłożyć funkcję wymierną na ułamki proste:

$$\frac{1}{(1+t)(1+t^2)} = \frac{A}{1+t} + \frac{Bt+C}{1+t^2} = \frac{A}{1+t} + \frac{t^2(A+B) + t(B+C) + A+C}{(1+t)(1+t^2)}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ B+C=0 \\ A+C=1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-\frac{1}{2} \\ B=\frac{1}{2} \\ C=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t} - \frac{1}{2} \int \frac{t-t^2}{1+t^2} = \frac{1}{2} \ln|1+t| - \frac{1}{2} \int \frac{tdt}{1+t^2} + \frac{1}{2} \int \frac{t^2}{1+t^2} = \frac{1}{2} \ln|1+t| + t - \frac{1}{4} \ln|1+t^2| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t =$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \ln|1+tgx| - \frac{1}{4} \ln|1+tg^2x| + \frac{x}{2} + C = \frac{1}{2} \left( x + \ln \left| \frac{1+tgx}{\sqrt{1+tg^2x}} \right| \right) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x + \sin x}{\cos x} \right| + \frac{x}{2} + C \\ &= \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln|\cos x + \sin x| + C \end{aligned}$$

**185/**

$$\int \frac{\sin 2x}{\cos^4 x} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x dx}{\cos^4 x} = 2 \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx = \left| \begin{array}{l} \cos x = t \\ -\sin x dx = dt \end{array} \right| = -2 \int \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{t^2} + C = \frac{1}{\cos^2 x} + C$$

**186/**

$$\int \frac{\ln(\cos x) dx}{\sin^2 x} = \left| \begin{array}{l} u = \ln(\cos x) \quad du = -\frac{\sin x}{\cos x} dx \\ dv = \frac{dx}{\sin^2 x} \quad v = -\operatorname{ctg} x \end{array} \right| = -\operatorname{ctg} x \ln|\cos x| - \int dx = -\operatorname{ctg} x \ln|\cos x| - x + C$$

**187/**

$$\int \sqrt{1-\sin x} dx = \int \frac{\sqrt{(1-\sin x)(1+\sin x)}}{\sqrt{1+\sin x}} dx = \int \frac{\sqrt{1-\sin^2 x}}{\sqrt{1+\sin x}} dx = \int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin x}} = \left| \begin{array}{l} \sin x = t \\ \cos x dx = dt \end{array} \right|$$

- 54 -

$$= \int \frac{dt}{\sqrt{1+t}} = \left| \begin{array}{l} 1+t=z \\ dt=dz \end{array} \right| = \int z^{-1/2} dz = 2z^{1/2} + C = 2\sqrt{z} + C = 2\sqrt{1+t} + C = 2\sqrt{1+\sin t} + C$$

**188/**

$$\int \frac{\ln(x^2+1)}{x^3} dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln(x^2+1) \quad du = \frac{2x dx}{x^2+1} \\ dv = \frac{dx}{x^3} \quad v = -\frac{1}{2x^2} \end{array} \right| = -\frac{\ln(x^2+1)}{2x^2} + \int \frac{2x dx}{2x^2(x^2+1)} =$$

$$= -\frac{\ln(x^2+1)}{2x^2} + \int \frac{dx}{x(x^2+1)} = -\frac{\ln(x^2+1)}{2x^2} + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$

Do obliczenia całki wykorzystano rozkład funkcji wymiernej:

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{x^2(A+B) + Cx + A}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$

**189/**

$$\int \frac{a^x dx}{a^{2x}+1} = \left| \begin{array}{l} a^x = t \quad a^{2x} = t^2 \quad a^x \ln a dx = dt \\ \ln a \end{array} \right| = \frac{dt}{\ln a} = \frac{1}{\ln a} \int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{1}{\ln a} \operatorname{arctg}(a^x) + C$$

**190/**

$$\begin{aligned} \int \frac{1-\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx &= \left| \begin{array}{l} \sqrt{x} = t^2 \quad \frac{dx}{2\sqrt{x}} = 2t dt \\ t^2 = z \end{array} \right| = 2 \int (1-\sin^2 t) 2t dt = 4 \int t dt - 4 \int t \sin^2 t dt = 2t^2 - \int 2t dt = dz \\ &= 2t^2 - \int \sin z dz = 2(t^2 + \cos z) = 2(\sqrt{x} + \cos t^2) + C = 2\sqrt{x} + 2 \cos \sqrt{x} + C \end{aligned}$$

**191/**

$$\int \frac{(x+1)^3}{\sqrt{(x-1)^2}} dx = \left| \begin{array}{l} x+1=t^2 \quad x-1=t^2-2 \quad dx=2tdt \\ \sqrt{(t^2-2)^2} \end{array} \right| = \int \frac{\sqrt{(x+1)^2} \sqrt{x+1}}{\sqrt{(t^2-2)^2}} 2tdt = \int \frac{2t^4 dt}{t^2-2}$$

$$\int (2t^2 + 4 + \frac{8}{t^2-2}) dt = \frac{2t^3}{3} + 4t + 8 \int \frac{dt}{t^2-2} = I$$

$$8 \int \frac{dt}{t^2-2} = 2\sqrt{2} \int \frac{dt}{t-\sqrt{2}} - 2\sqrt{2} \int \frac{dt}{t+\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \ln|t-\sqrt{2}| - 2\sqrt{2} \ln|t+\sqrt{2}| = 2\sqrt{2} \ln \left| \frac{t-\sqrt{2}}{t+\sqrt{2}} \right| + C$$

$$I = \frac{2(x+1)\sqrt{x+1} + 12\sqrt{x+1}}{3} + 2\sqrt{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}} \right| + C$$

- 55 -

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}} &= \left| \frac{1}{x} - \frac{dx}{x^3} = dt \right| = - \int \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}} = - \int \frac{tdt}{\sqrt{1-t^2}} = \left| \frac{1-t^2}{2} = \frac{dz}{2} \right| \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dz}{\sqrt{z}} = \frac{1}{2} 2\sqrt{z} + C = \sqrt{z} + C = \sqrt{1-t^2} + C = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x+1}{2x^3+x^2-x} dx &= \int \frac{4x+1}{x(x+1)(2x-1)} dx = \int \frac{-dx}{x} + \int \frac{1}{x+1} + \int \frac{4}{3} \frac{dx}{2x-1} = -\ln|x| + \frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{2}{3} \ln|2x-1| + C \\ \text{Do obliczenia całki [193] wykorzystano rozkład funkcji wymiernej:} \\ \frac{4x+1}{x(x+1)(2x-1)} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{2x-1} = \frac{x^2(2A+2B+C) + x(A-B+C) - A}{x(x+1)(2x-1)} \end{aligned}$$

$$\text{Stąd } A = -1, \quad B = \frac{1}{3}, \quad C = \frac{4}{3}.$$

$$\begin{aligned} \int [2^x - 2] dx &= F(x) + C \\ F'(x) &= \begin{cases} -2^x + 2 & \text{dla } x \in (-\infty, 1) \\ 2^x - 2 & \text{dla } x \in (1, \infty) \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} -\frac{2^x}{\ln 2} + 2x + C_1 & \text{dla } x \in (-\infty, 1) \\ \frac{2^x}{\ln 2} - 2x + C_2 & \text{dla } x \in (1, \infty) \end{cases} \end{aligned}$$

Aby funkcja  $F(x)$  była ciągła dla  $x = 1$  musi być spełniony warunek:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2^x}{\ln 2} + 2x + C_1 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2^x}{\ln 2} - 2x + C_2 = F(1) \\ -\frac{2}{\ln 2} + 2 + C_1 &= \frac{2}{\ln 2} - 2 + C_2 \end{aligned}$$

$$C_1 = \frac{4}{\ln 2} - 4 + C_2$$

$$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{1-x^4}} = \left| x^4 = t, \quad 4x^3 dx = dt \right| = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{4} \arcsin t + C = \frac{1}{4} \arcsin x^4 + C$$

$$\int \frac{2^x - 5^x}{10^x} dx = \int \frac{2^x}{10^x} dx - \int \frac{5^x}{10^x} dx = \int \left( \frac{1}{5} \right)^x dx - \int \left( \frac{1}{2} \right)^x dx = \int 5^{-x} dx - \int 2^{-x} dx = -\frac{5^{-x}}{\ln 5} + \frac{2^{-x}}{\ln 2} + C$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + \sqrt[3]{x^2} - 1}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{x^3}{x^{1/2}} dx + \int \frac{x^{2/3}}{x^{1/2}} dx - \int \frac{1}{x^{1/2}} dx = \int x^{5/2} dx + \int x^{1/6} dx - \int x^{-1/2} dx = \\ &= \frac{2}{7} x^{7/2} \sqrt{x} + \frac{6}{7} x^{7/6} \sqrt{x} - 2\sqrt{x} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1-x}{1-\sqrt[3]{x}} dx &= \left| x = t^3, \quad dx = 3t^2 dt \right| = \int \frac{1-t^3}{1-t} dt = 3 \int (1+t+t^2) t^2 dt = 3 \int (t^2 + t^3 + t^4) dt = \\ &= t^3 + \frac{3t^4}{4} + \frac{3t^5}{5} + C = x + \frac{3\sqrt[3]{x^4}}{4} + \frac{3\sqrt[3]{x^5}}{5} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int x^2 dx &= \left| \begin{matrix} u = x^2 & du = 2x dx \\ dv = 2^x dx & v = \frac{2^x}{\ln 2} \end{matrix} \right| = \frac{1}{\ln 2} x^2 2^x - \frac{2}{\ln 2} \int x 2^x dx = \frac{1}{\ln 2} x^2 2^x - \frac{2}{\ln 2} \int x^2 2^x dx = \\ &= \frac{1}{\ln 2} x^2 2^x - \frac{2}{\ln 2} \left( x \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} \int 2^x dx \right) = \frac{x^2 2^x}{\ln 2} - \frac{2x^2}{(\ln 2)^2} - \frac{2}{(\ln 2)^3} + C = \frac{2^x}{\ln 2} \left( x^2 - \frac{2x}{\ln 2} - \frac{2}{(\ln 2)^2} \right) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x} \arctg \sqrt{x} dx &= \left| x = t^2, \quad \sqrt{x} = t, \quad dx = 2t dt \right| = \int 2t^2 \arctg t dt = \left| \begin{matrix} u = \arctg t & du = \frac{dt}{1+t^2} \\ dv = 2t^2 dt & v = \frac{2t^3}{3} \end{matrix} \right| = \\ &= \frac{2t^3}{3} \arctg t - \frac{2}{3} \int \frac{t^3 dt}{1+t^2} = \frac{2t^3}{3} \arctg t - \frac{2}{3} \int \left( t - \frac{t}{1+t^2} \right) dt = \frac{2}{3} t^3 \arctg t - \frac{t^2}{3} - \frac{1}{3} \ln|1+t^2| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} x \sqrt{x} \arctg \sqrt{x} - \frac{1}{3} x - \frac{1}{3} \ln|1+t^2| + C \\ &= \frac{2}{3} x \sqrt{x} \arctg \sqrt{x} - \frac{1}{3} x - \frac{1}{3} \ln|1+x| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{(x-1)^x dx}{x^2} &= \int \frac{e^x dx}{x} - \int \frac{e^x dx}{x^2} = \left| \begin{matrix} u = \frac{1}{x} & du = -\frac{dx}{x^2} \\ dv = e^x dx & v = e^x \end{matrix} \right| - \int \frac{e^x dx}{x^2} = \frac{e^x}{x} + \int \frac{e^x dx}{x^2} - \int \frac{e^x dx}{x^2} = \\ &= \frac{e^x}{x} \end{aligned}$$

$$= \frac{e^x}{x} + C$$

$$\textbf{202/} \int (6-2x)^{1/2} dx = \left| \frac{6-2x=t}{dx=-\frac{dt}{2}} \right| = -\frac{1}{2} \int t^{1/2} dt = -\frac{t^{3/2}}{26} + C = -\frac{1}{26} (6-2x)^{3/2} + C$$

$$\textbf{203/} \int x^3 e^x dx = \left| \frac{e^x}{x^2} = t, \quad 2xe^x dx = dt, \quad \ln e^x = \ln t \right| = \int x^2 x e^x dx = \frac{1}{2} \int \ln t dt =$$

$$= \frac{1}{2} \left| \frac{u = \ln t}{dv = dt} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{t} \ln |t| - \frac{1}{2} t + C = \frac{1}{2} e^x \ln e^x - \frac{1}{2} e^x + C = \frac{1}{2} e^x (x^2 - 1) + C \right|$$

$$\textbf{204/} \int x^2 \sqrt{7x^3 + 6} dx = \left| \frac{7x^3 + 6 = t^6, \quad x^2 dx = \frac{6t^5 dt}{21}} \right| = \frac{2}{7} \int t^6 dt = \frac{2t^7}{49} + C = \frac{2}{49} \sqrt{(7x^3 + 6)^7} + C$$

$$\textbf{205/} \int (x^2 + 1) \cos(x^3 + 3x + 5) dx = \left| \frac{x^3 + 3x + 5 = t}{\sin t + C = \sin(x^3 + 3x + 5) + C} \right| = \int 3(x^2 + 1) \cos(x^3 + 3x + 5) dx = \int \cos t dt =$$

$$\textbf{206/} \int \frac{x^3 dx}{x+1} = \int (x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1}) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \ln|x+1| + C$$

$$\textbf{207/} \int \frac{3dx}{3 \sin x + 4 \cos x + 5} = \left| \frac{3dx}{tg \frac{x}{2}} = t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \right| =$$

$$= 3 \int \frac{1+t^2}{6t+4(1-t^2)+5(1+t^2)} dt = 6 \int \frac{dt}{t^2+6t+9} = 6 \int \frac{dt}{(t+3)^2} = -\frac{6}{t+3} + C = -\frac{6}{\frac{x}{tg \frac{x}{2}} + 3} + C$$

$$\textbf{208/} \int \frac{dx}{1 - \sin^4 x} = \left| \frac{1+t^2}{tg x = t, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}} \right| = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{1 - \left( \frac{t^2}{1+t^2} \right)^2} =$$

$$= \int \frac{(1+t^2) dt}{2t^2+1} = \int \frac{1+t^2}{2t^2+1} dt = \int \left( \frac{1}{2} + \frac{\frac{t^2}{2}}{2t^2+1} \right) dt = \frac{1}{2} \int dt + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{2t^2+1} = \frac{1}{2} t + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{2 \left( t^2 + \frac{1}{2} \right)} =$$

$$= \frac{1}{2} tg x + \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} tg x + \frac{\sqrt{2}}{4} \arctg \frac{2t}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{2} tg x + \frac{\sqrt{2}}{4} \arctg \sqrt{2} tg x + C$$

$$\textbf{209/} \int \frac{\sin x \cos x dx}{1 + \sin^4 x} = \left| \frac{tg x = t, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad \sin x \cos x = \frac{t}{(1+t^2)^{3/2}}} \right| = \int \frac{\frac{t}{(1+t^2)^{3/2}}}{1+t^2} dt =$$

$$= \int \frac{t dt}{2t^4 + 2t^2 + 1} = \left| \frac{t^2 = z}{2t dt = dz} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{2z^2 + 2z + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{\left( z + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \arctg \left( 2z + 1 \right) + C = \frac{1}{2} \arctg \left( 2tg^2 x + 1 \right) + C$$

$$\textbf{210/} \int \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x} dx = \left| \frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2} = a + b \right| = \int (\sin x + \cos x) dx =$$

$$= \int \sin x dx + \int \cos x dx = -\cos x + \sin x + C$$

## 10. Częściej używane wzory całek:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{dla } n \neq -1, x > 0.$$

$$\int dx = x + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$\text{dla } x \neq 0.$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\text{dla } a > 0, a \neq 1.$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sinh x = \cosh x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \cosh x = \sinh x + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C \quad \text{dla } -1 < x < 1.$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln|x + \sqrt{1+x^2}| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C$$

$$\int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C$$

$$\int \frac{dx}{(x-k)^2 + b} = \frac{1}{\sqrt{b}} \operatorname{arctg} \frac{x-k}{\sqrt{b}} + C \quad \text{gdzie } b > 0.$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{1}{2n-2} \cdot \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2} \int \frac{dx}{(x^2+1)^{n-1}} \quad \text{dla } n \in \mathbb{N}.$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = 2\sqrt{f(x)} + C \quad \text{gdzie } f(x) > 0.$$

$$\int \sqrt{k^2-x^2} dx = \frac{k^2}{2} \arcsin \frac{x}{k} + \frac{x}{2} \sqrt{k^2-x^2} + C$$

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{k^2-x^2}} = \frac{k^2}{2} \arcsin \frac{x}{k} - \frac{x}{2} \sqrt{k^2-x^2} + C$$

$$\int \sqrt{x^2+k} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+k} + \frac{k}{2} \ln|x + \sqrt{x^2+k}| + C$$

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+k}} = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+k} - \frac{k}{2} \ln|x + \sqrt{x^2+k}| + C$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$$

$$\int \cos^n x dx = \int \sin^n \left( \frac{\pi}{2} + x \right) dx$$

$$\int u g^n x dx = \frac{1}{n-1} g^{n-1} x - \int t g^{n-2} x dx$$

$$\int \log_p x dx = \frac{1}{\ln p} \int \ln x dx$$



## Spis treści

1. Całkowanie bezpośrednie oraz przez rozkład.....	3
2. Całkowanie przez podstawianie.....	7
3. Całkowanie przez części.....	14
4. Całkowanie funkcji wymiernych.....	21
5. Całkowanie funkcji niewymiernych.....	31
6. Całkowanie funkcji trygonometrycznych.....	39
7. Całkowanie funkcji wykładniczych i logarytmicznych..	43
8. Całkowanie funkcji hiperbolicznych.....	45
9. Całki różne.....	47
10. Częściej używane wzory całek.....	60
11. Spis treści.....	62
12. Bibliografia.....	63

## Bibliografia

- [1] M. Gewart, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
- [2] R. Hajlasz, Metodyka rozwiązywania zadań z analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1988.
- [3] W. Krywicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1988.
- [4] M. Lassak, Zadania z analizy matematycznej, Wydawnictwo Supremum, Bydgoszcz 2002.
- [5] W.P. Minorski, Zbiór zadań z matematyki wyższej, WNT, Warszawa 1969.
- [6] K. Szalajko, Matematyka t. II, PWN, Warszawa 1985.
- [7] W. Żakowski, Ćwiczenia problemowe dla politechnik, WNT, Warszawa, 1991.