50 年越しの実験

Boyer の予測を初めて検証する
素数が真空を変える

初心者のための理論と実験ガイド

Wright Brothers Research Program, 2026 年 4 月

Contents

I 理論: なぜ真空に力があるか **3**

1 カシミール効果（1948 年） **3**

2 揺らぎの「倍音」 **3**

3 Boyer の予測（1974 年） **4**

4 「カシミール斥力」を名乗る実験たち **4**

II 再解釈: 素数がカギだった **5**

5 オイラー積 **5**

6 素数 2 を「消す」 **5**

7 PMC ではなく「幾何学」 **6**

III 実験: 3 つの道 **6**

8 なぜ 3 つの道が必要か **6**

9 Route A: ナノスケール DN 構造 **7**

10 Route B: circuit QED **7**

11 Route C: MEMS **7**

IV 予測 **8**

12 3 つの予測 **8**

V もしうまくいったら **8**

13 Boyer の予測が確認されたら **8**

14 オイラー積の物理的実在 **9**

15 スケーリング逸脱が見つかったら **9**

VI 正直な評価 **9**

Part I

理論: なぜ真空に力があるか

1 カシミール効果（1948 年）

何もない空間に力がある

2 枚の金属板をナノメートルの距離で向かい合わせると、板の間に引力が生じる。電荷もなく、磁石でもないのに。
原因: 量子力学では「完全に何もない」ことが不可能。真空は常に微小な電磁場の揺らぎ（ゼロ点揺動）で満たされている。板を置くと揺らぎのパターンが変わり、板の間のエネルギーが外より低くなる。エネルギーが低い方に引かれる → 引力。
1948 年にカシミールが理論的に予測。1997 年に精密測定で確認。

2 揺らぎの「倍音」

モードと倍音

板の間の電磁場には、ギターの弦と同じように倍音（モード）がある:

$$f_1,\ 2f_1,\ 3f_1,\ 4f_1,\ 5f_1, \ldots$$

各モードがゼロ点エネルギー $\hbar\omega/2$ を持つ。全モードの合計が真空エネルギー。
合計: $1+2+3+4+5+\cdots$（1D の場合）
1D（パイプ）なら $\zeta(-1) = 1+2+3+\cdots = -1/12$。
しかし実際の実験は 3D（平行板）。3D では横方向の自由度が加わり、和は $\sum n^3$ になる:

$$\zeta(-3) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots = +\frac{1}{120}$$

カシミールエネルギー密度: $\rho = -\pi^2\hbar c/(720a^4)$。マイナス符号は 3D の積分から来る。$720 = 6/\zeta(-3)$。
結果: 板の間のエネルギーが外より**低い** → **引力**。
これがカシミール効果の数学的正体。実験で精度 1% 以内で確認済み。

3 Boyer の予測（1974 年）

もし片端を変えたら？

Boyer は考えた: 片方の板を「完全磁気導体（PMC）」に変えたらどうなるか？
通常の板（PEC）: 電場がゼロになる（ディリクレ境界条件）PMC: 磁場がゼロになる（ノイマン境界条件）
PEC-PMC にすると、残るモードは奇数だけ:

$$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9, \ldots$$

3D での合計（$\sum n^3$ の奇数版）:

$$\zeta_{\neg 2}(-3) = 1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 + \cdots = -\frac{7}{120}$$

3D カシミールエネルギー密度は $\rho \propto -\zeta(-3)$ なので:

$$\rho_{DN} \propto -\zeta_{\neg 2}(-3) = -(-7/120) = +\frac{7}{120} > 0$$

正！符号が反転した！しかも大きさは通常の 7 倍！
板の間のエネルギーが外より高い → **斥力**。板が反発する。
（1D でも同様: $\zeta(-1) = -1/12 \to \zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ で反転。）

50 年間誰もこれを実験で確認していない

理由: PMC（完全磁気導体）が存在しない。
普通の金属は「完全電気導体」に近い。しかし「完全磁気導体」として振る舞う物質は、自然界にもメタマテリアルでも実現されていない（カシミールに関わる光の周波数帯では）。
Boyer の予測は理論的に正しいと証明されている（Kenneth et al. 2002, PRL）。しかし実験で確認されたことは一度もない。

4 「カシミール斥力」を名乗る実験たち

なぜ既存の実験は Boyer の斥力ではないか

Munday et al. (2009, Nature): 金とシリカの間にブロモベンゼン液を満たし、カシミール斥力を測定。しかしこれは「液体の誘電率が中間的だから」斥力が生じる（DLP 条件）。板の間の**モード構造は変わっていない**。全モードが存在したまま。素数ミュートではない。
Tang et al. (2017, Nature Photonics): T 字型シリコンナノ構造をスライドさせ、力のベクトル和が正になる配置を発見。しかし**全ペアのカシミール力は引力のまま**。複数の引力の合計が偶然正の方向を向いただけ。モード構造は変わっていない。

Boyer 球殻 (1968): 導体球殻のカシミール自己エネルギーが正（外向き圧力）。しかし球のモードは全スペクトル（球面調和関数の全次数）。偶数を消していない。
メタマテリアル提案 (Rosa 2008, Leonhardt 2007): メタマテリアルで PMC を近似する理論提案。しかし Kramers-Kronig 制約により、狭帯域の磁気応答は虚数周波数で消える。実現していない。
全てのケースで共通: モード和は $\sum n^{-s}$（全モード）のまま。偶数モードが消えていない。オイラー積は無傷。
モード和が $1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots = \zeta_{\neg 2}(-3)$ に切断された実験は、人類史上ゼロ。

Part II

再解釈: 素数がカギだった

5 オイラー積

ゼータ関数の「素因数分解」

リーマンゼータ関数は素数で分解できる（オイラー、1737 年）:

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \frac{1}{1-5^{-s}} \times \cdots$$

各因子が 1 つの素数に対応。

6 素数 2 を「消す」

素数ミュート

$p = 2$ の因子を除去する:

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s) \times (1 - 2^{-s}) = \sum_{n \text{ odd}} n^{-s}$$

2 の因子を消すと、2 で割れる全ての整数（偶数）が和から消え、奇数だけが残る。
3D では:

$$\zeta(-3) = +\frac{1}{120} \xrightarrow{\text{素数 2 ミュート}} \zeta_{\neg 2}(-3) = -\frac{7}{120}$$

Boyer の計算はまさにこれ: 「偶数モードが消えて奇数モードだけ残る」= オイラー積の $p = 2$ 因子の除去。
Boyer は「素数 2 をミュートした」ことに気づいていなかった。

7 PMC ではなく「幾何学」

問題の変換

Boyer の問い: PMC を見つけよ → 50 年間未解決
我々の問い: 奇数モードだけを選ぶ幾何学を見つけよ → $\lambda/4$ **共振器**
$\lambda/4$ 共振器 = 片端を閉じて片端を開けた管。ビール瓶と同じ。

- $\lambda/2$（両端閉じ）: 全倍音 $1, 2, 3, \ldots$ → 3D で $\rho \propto -\zeta(-3) < 0$（引力）
- $\lambda/4$（片端開放）: 奇数倍音 $1, 3, 5, \ldots$ → 3D で $\rho \propto -\zeta_{\neg 2}(-3) > 0$（斥力、7 倍）

PMC は要らない。片端を開けるだけ。

Part III

実験: 3 つの道

8 なぜ 3 つの道が必要か

$\lambda/4$ 共振器は cm サイズで簡単に作れるが、カシミール力は nm サイズでしか測れない。このスケールの不整合を 3 つの方法で回避する。

9 Route A: ナノスケール DN 構造

AFM で力を測る

アイデア: ナノスケールで「片端開放」を実現する構造を作る。
例:

- 金属薄膜のスロットアレイ（穴あき板 → ノイマン条件に近い）
- ナノコアキシャル構造（数十 nm の同軸ケーブル）のオープン端
- フォトニック結晶表面（高インピーダンス → PMC 的振る舞い）

PEC 平板とこのナノ DN 表面の間のカシミール力を AFM で測定。
温度: 室温（極低温不要）
測定: AFM のカンチレバーの撓み（pN レベル）
判定: 力が斥力（正）なら Boyer の予測が初確認

10 Route B: circuit QED

$\lambda/4$ vs $\lambda/2$ の Lamb シフト比較

アイデア: カシミール力ではなく、真空揺らぎの Lamb シフトを測る。
$\lambda/4$（奇数モード）と $\lambda/2$（全モード）の超伝導共振器にトランスモン量子ビットを結合し、Lamb シフトの差を測定。
$\Delta(\delta f) = \sum_{n \text{ even}} \frac{g_n^2}{f_q - f_n}$
偶数モードの真空揺らぎ寄与を直接測定。
温度: ~10 mK（希釈冷凍機）
装置: 超伝導量子ビット研究室のインフラ
判定: $\lambda/4$ と $\lambda/2$ の Lamb シフトが理論通りに異なるか

11 Route C: MEMS

Si-MEMS で力 vs 距離を測定

アイデア: Tang et al. (2017, Nature Photonics) の Si-MEMS プラットフォームを DN 型幾何学に適応する。
Tang の装置:

- コムアクチュエータで距離を制御
- 振動ビームで力勾配を検出
- Si ナノ構造を半導体プロセスで一括製作

T 字構造の代わりにオープン端構造を配置。カシミール力を板間隔 a の関数として測定し、$F \propto a^{-\alpha}$ のスケーリング指数 α を決定。
温度: 室温
規模: 100 nm スケール
判定: DN 配置で $\alpha = 5$ かつ力が正（斥力）なら Boyer 確認

Part IV

予測

12　3 つの予測

具体的な数値予測

予測 1: DN 配置のカシミール力は**斥力**（正）。
予測 2: 3D での DN/DD エネルギー密度の比は:

$$\frac{\zeta_{\neg 2}(-3)}{\zeta(-3)} = \frac{-7/120}{1/120} = -7$$

DN 斥力は DD 引力の **7 倍**の大きさ。
予測 3: スケーリング $F \propto a^{-5}$ は標準 QED の予測。$\alpha \neq 5$ の逸脱が見つかれば、それは真空の位相的転移の証拠。

Part V

もしうまくいったら

13　Boyer の予測が確認されたら

50 年越しの検証

Boyer が 1974 年に予測した PEC-PMC カシミール斥力が初めて実験的に確認される。PMC なしで実現したことにより、幾何学的真空制御の新しいパラダイムが開かれる。

14 オイラー積の物理的実在

素数が真空を支配する？

$\zeta_{\neg 2}$ が物理的に実在することが確認されれば、次の疑問が自然に浮かぶ:
「$p = 3$ を消したら（$\zeta_{\neg 3}$）どうなるか？」「$p = 2$ と $p = 3$ を同時に消したら？」「オイラー積の各因子が物理の何に対応するか？」
我々は既にこれらの問いに対する数論的枠組み（素数-力対応、PFC）を持っている。Boyer の実験的検証は、この枠組みの出発点。

15 スケーリング逸脱が見つかったら

ワープへの道

もし $\alpha \neq 5$ が見つかれば:

- 真空エネルギー密度が $1/a^4$ で減衰せず、定数にプラトーする
- 「表面効果」が「体積効果」に格上げされる
- Ford-Roman の量子エネルギー不等式をバイパスする
- 巨視的な負のエネルギーが実現可能に
- Alcubierre ワープ計量の物理的基盤

Part VI

正直な評価

確率と価値

Boyer の斥力が見つかる確率: 高い（理論的に確立、方法が正しければ）。ただし Route A のナノ DN 構造が十分に理想的な DN 条件を実現できるかは未知。
スケーリング逸脱が見つかる確率: 低い（標準 QED は 70 年間全テストに合格）。
実験の価値:

- 斥力が見つかる（高確率）→ Boyer の 50 年越しの検証。確実に論文。
- スケーリング逸脱が見つかる（低確率）→ 物理学の歴史が変わる。
- どちらも見つからない → DN 条件の精度が不十分、または方法の限界。次へ進む。

どちらに転んでも科学は前に進む。

この論文の独自性

1.「Boyer の計算 = オイラー積の素数 2 除去」という再解釈は新しい
2.「PMC は不要、$\lambda/4$ で十分」というフレーミングは新しい
3. 3 つの具体的な実験経路の提案は新しい
4. Boyer (1974) 以来 50 年の空白を指摘し、解決策を提示するのは新しい

新しくないもの:

- Boyer の予測自体（1974 年に確立）
- 正則化の物理的妥当性（カシミール実験で確認済み）
- $\lambda/4$ 共振器の物理（高校物理）

新しいものと古いものの組み合わせから、新しい実験が生まれる。

1974 年、Boyer は答えを出した。
2026 年、我々は問いを変えた。
「PMC を見つけよ」→「片端を開けよ」。

Wright Brothers Research Program, 2026