ANNEE ACADEMIQUE 2026-2027

Contrôle Continu

SPECIALITE : SI/SF/TL

NIVEAU 3

MATIERE : Surveillance thérapeutique

ENSEIGNANT : TSAFACK HERVE

PARTIE I — CONNAISSANCES PHARMACOLOGIQUES

10 points

Question 1 — Tableau de médicaments

Complétez le tableau suivant.

Médicamen	Famille / classe	Indication principale	2 effets indésirables	Surveillance infirmière
Paracétamol	…	…	…	…
Amoxicilline	…	…	…	…
Furosémide	…	…	…	…
Insuline rapide	…	…	…	…
Héparine	…	…	…	…
Morphine	…	…	…	…
Amlodipine	…	…	…	…
Metformine	…	…	…	…
Oméprazole	…	…	…	…
Diazépam	…	…	…	…

PARTIE II — FAMILLES, INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

8 points

Question 2

Associez chaque médicament à la proposition correspondante.

Médicaments

A. Furosémide
B. Héparine
C. Morphine
D. Insuline
E. Amoxicilline
F. Amlodipine
G. Diazépam
H. Metformine

Propositions

1. Anticoagulant
2. Antalgique opioïde
3. Antidiabétique
4. Antibiotique β-lactamine
5. Benzodiazépine
6. Diurétique de l'anse
7. Inhibiteur calcique

8. Antidiabétique oral

Question 3

Pour chacun des médicaments suivants, donnez **une contre-indication ou une situation nécessitant une vigilance particulière** :

1. Insuline
2. Héparine
3. Morphine
4. Furosémide
5. Amoxicilline
6. Metformine
7. Diazépam
8. Paracétamol

PARTIE III — SURVEILLANCE DES EFFETS INDÉSIRABLES
8 points

Question 4

Un patient reçoit de la morphine par voie injectable.
Quelques heures après l'administration, vous observez :

- FR = 8 cycles/min ;
- SpO_2 = 88 % ;
- somnolence importante ;
- pupilles serrées.

Questions

1. Quel effet indésirable suspectez-vous ? **(1 pt)**
2. Quels paramètres devez-vous surveiller immédiatement ? **(2 pts)**
3. Quelle mesure infirmière immédiate devez-vous prendre ? **(1 pt)**
4. Quel antidote peut être utilisé dans cette situation ? **(1 pt)**

Question 5

Une patiente sous furosémide présente :

- fatigue importante ;
- faiblesse musculaire ;
- crampes ;
- troubles du rythme cardiaque.

1. Quel trouble hydro-électrolytique suspectez-vous ? **(1 pt)**
2. Quel ion devez-vous surveiller en priorité ? **(1 pt)**
3. Quels autres paramètres surveillez-vous chez cette patiente ? **(1 pt)**

PARTIE IV — ÉTUDE DE 62 ans, est hospitalisé pour une hypertension CAS CLINIQUE 8 points

Monsieur K., 62 ans, est hospitalisé pour une hypertension artérielle compliquée d'une insuffisance cardiaque. La prescription médicale comprend :

- Furosémide 40 mg le matin ;
- Amlodipine 10 mg/jour ;
- Héparine selon prescription ;
- Paracétamol si douleur ;
- Insuline selon glycémie capillaire.

À l'entrée dans le service :

- TA : 95/60 mmHg ;
- FC : 102 bpm ;
- FR : 20/min ;
- SpO_2 : 94 % ;
- glycémie capillaire : 2,40 g/L ;
- kaliémie : 3,1 mmol/L.

Questions

1. Quels paramètres doivent être surveillés avant et après l'administration du **furosémide** ?**(2points)**

2. La kaliémie est à 3,1 mmol/L. Pourquoi cette donnée est-elle importante chez un patient rece 95/60 mmHg. Quelle précaution prenez-vous avant l'administration devant du furosémide ? **(1 point)**

3. La TA est de 95/60 mmHg. Quelle précaution prenez-vous avant l'administration de l'amlodipine ?**(1 point)**

4. Quels paramètres surveillez-vous chez un patient recevant de l'héparine ?**(2 points)**

5. La glycémie est à 2,40 g/L. Quel élément devez-vous vérifier avant d'administrer l'insuline ? **(1 point)**

6.Citez deux signes d'hypoglycémie à rechercher après administration d'insuline.**(1 point)**

PARTIE V — VRAI / FAUX

6 points

Indiquez **Vrai (V)** ou **Faux (F)**.

1. La morphine peut provoquer une dépression respiratoire.
2. Le furosémide peut provoquer une hypokaliémie.
3. L'insuline peut provoquer une hypoglycémie.
4. L'héparine augmente le risque hémorragique.
5. Une allergie connue à la pénicilline ne nécessite aucune précaution lors de l'administration d'amoxicilline.
6. La surveillance d'un médicament se limite à vérifier la tension artérielle