

小儿腹泻病诊疗指南

一、疾病定义与病因

1.1 疾病定义

小儿腹泻病（婴幼儿腹泻）是由多病原、多因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特征的消化道综合征。它是我国婴幼儿最常见的疾病之一，仅次于呼吸道感染。6个月至 2 岁婴幼儿发病率最高，是造成儿童营养不良、生长发育障碍及死亡的重要原因。

1.2 主要病因

小儿腹泻的病因分为感染性和非感染性两大类。

分类	常见原因	特点与常见病原
感染性腹泻	病毒、细菌、真菌、寄生虫	病毒性最常见，占 80% 以上
——病毒性	轮状病毒、诺如病毒、肠道腺病毒、星状病毒	秋冬季高发，轮状病毒是婴幼儿秋、冬、春季首位病因
——细菌性	致泻性大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌	夏季高发，多伴发热、黏液脓血便
——真菌性	白色念珠菌	多见于长期使用抗生素、营养不良
非感染性腹泻	饮食因素、气候因素、过敏	
——饮食因素	喂养不当、食物量过多或成分不适宜、突然改变饮食	人工喂养儿多于母乳喂养儿
——过敏性腹泻	牛奶蛋白过敏、大豆蛋白过敏	多在添加配方奶后出现
——气候因素	天气过热致消化液分泌减少，腹部受凉致肠蠕动增加	

二、典型症状与体征

2.1 主要症状

- 大便次数增多**：轻症每日 3-10 次，重症可达 10 次以上。
- 大便性状改变**：稀水便、蛋花汤样便、黏液便或脓血便。轮状病毒腹泻典型表现为**蛋花汤样、无腥臭味水样便**。
- 呕吐**：多见于腹泻早期，严重者呈喷射状。
- 发热**：病毒性腹泻常伴中度发热，细菌性腹泻可呈高热。
- 脱水表现**（需重点观察）：
 - 轻度脱水：精神稍差，口唇稍干，尿量稍减，前囟眼窝稍凹陷。
 - 中度脱水：精神萎靡，口唇干燥，皮肤弹性差，尿量明显减少，前囟眼窝明显凹陷。
 - 重度脱水：休克状态，意识模糊，无尿，四肢厥冷，脉搏细速。

2.2 体格检查

- 腹部听诊肠鸣音活跃或亢进。
- 细菌性肠炎可有腹部压痛。

三、诊断标准与检查方法

3.1 诊断标准

根据发病季节、喂养史、大便性状及次数改变，结合全身中毒症状及脱水程度，即可作出临床诊断。病原学诊断依赖实验室检查。

3.2 辅助检查

检查项目	目的与临床意义
大便常规	有无白细胞、红细胞、吞噬细胞，初步鉴别细菌性或病毒性。细菌感染可见较多白细胞。
大便病原学检查	大便培养（细菌）、轮状病毒抗原检测（胶体金法）、诺如病毒核酸检测。
血常规	细菌感染时白细胞总数和中性粒细胞升高。

检查项目	目的与临床意义
------	---------

血气分析及电解质	评估脱水程度、有无酸中毒及电解质紊乱（低钠、低钾）。
----------	----------------------------

四、治疗方案（包括常用药物）

4.1 治疗原则

调整饮食、预防和纠正脱水、合理用药、加强护理、预防并发症。

4.2 液体疗法（核心治疗）

脱水程度	补液方案
无脱水/轻度脱水	口服补液盐 III (ORS III)，按 50ml/kg 计算总量，4 小时内少量多次喂服。
中度脱水	继续口服补液，若呕吐频繁、口服困难，则静脉补液。
重度脱水	立即静脉补液，第一阶段快速输注等张含钠液（20ml/kg），1 小时内完成。

4.3 药物治疗

药物类型	常用药物	适应症与用法
肠黏膜保护剂	蒙脱石散	吸附病原体和毒素，覆盖肠黏膜。两餐之间服用，与其他药物间隔 2 小时。
微生态制剂	布拉氏酵母菌、双歧杆菌三联活菌	恢复肠道菌群平衡。与抗生素间隔 2 小时以上服用。
补锌治疗	葡萄糖酸锌口服液	缩短病程、减轻严重程度。6 月龄以下 10mg/日，6 月龄以上 20mg/日，连用 10-14 天。
抗生素	头孢克肟、阿莫西林	仅用于细菌性肠炎。病毒性腹泻禁用抗生素。

药物类型	常用药物	适应症与用法
抗分泌药	消旋卡多曲	减少肠道水和电解质分泌，用于水样便腹泻。

特别注意：严禁使用洛哌丁胺等成人止泻药，可致肠麻痹甚至死亡。

4.4 饮食调整

- 母乳喂养儿继续哺乳，增加喂养次数。
- 配方奶喂养儿可暂时换用**无乳糖配方奶**（腹泻易继发乳糖不耐受），疗程 1-2 周。
- 已添加辅食者暂停高糖、高脂食物，给予粥、烂面条等易消化食物。

五、家庭护理与预防建议

5.1 家庭护理要点

1. **臀部护理：**每次便后用温水清洗，吸干后涂抹护臀霜，防止“红臀”和尿布皮炎。
2. **消毒隔离：**患儿餐具、奶瓶煮沸消毒，粪便及时处理，护理者勤洗手。
3. **病情观察：**记录大便次数、性状、尿量。若出现**眼窝凹陷、无泪、口唇极干、精神萎靡**，立即就医。
4. **口服补液：**耐心用小勺少量多次喂服 ORS，即使呕吐也应继续补充。

5.2 预防措施

1. **疫苗接种：**轮状病毒疫苗（RV）已纳入我国儿童免疫规划，可显著降低重症轮状病毒腹泻发生率。
2. **合理喂养：**提倡母乳喂养，科学添加辅食，避免突然改变饮食。
3. **饮食卫生：**食物新鲜清洁，食具定期消毒，培养饭前便后洗手习惯。
4. **增强体质：**适当户外活动，补充维生素 AD。