

Frações no Dia a Dia - Atividade de Matemática (6º Ano)

Matemática · 6º ano do Ensino Fundamental · Frações

Competências BNCC trabalhadas:

- EF06MA07 - Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado de divisão e razão, com e sem uso da reta numérica
- EF06MA08 - Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações e localizá-los na reta numérica
- EF06MA09 - Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo referente (fração) não é conhecido

1. No aniversário de Rafael, a pizza foi dividida em 8 pedaços iguais. Ele comeu 3 pedaços e sua irmã comeu 2. Que fração da pizza os dois comeram juntos?

- $\frac{3}{8}$
- **$\frac{5}{8}$**
- $\frac{2}{8}$
- $\frac{6}{8}$

Pra somar frações com o mesmo denominador, é só somar os numeradores e manter o denominador: $3 + 2 = 5$, então $\frac{5}{8}$. Repara que o 8 (total de pedaços) não muda, porque a pizza continua dividida do mesmo jeito!

2. Dona Marta tem um pote com 24 balas e quer dar $\frac{1}{4}$ delas para o Pedro. Quantas balas o Pedro vai ganhar?

- 4 balas
- **6 balas**
- 8 balas
- 12 balas

Calcular $\frac{1}{4}$ de 24 é dividir 24 por 4, que dá 6. Pense assim: se a Dona Marta separasse as balas em 4 grupinhos iguais, cada grupo teria 6 balas, e o Pedro leva um desses grupos.

3. Em uma corrida de revezamento, cada equipe percorre partes iguais da pista. Se a pista tem 400 metros e foi dividida em 5 partes iguais, qual fração representa a distância que UM corredor percorre?

- $\frac{1}{4}$
- **$\frac{1}{5}$**
- $\frac{5}{1}$
- $\frac{4}{5}$

Como a pista inteira foi repartida em 5 partes iguais, cada corredor faz 1 dessas 5 partes, ou seja, $\frac{1}{5}$ da pista. O denominador sempre mostra em quantas partes o todo foi dividido.

4. Comparando $\frac{2}{3}$ e $\frac{3}{4}$, qual fração representa a maior quantidade de um bolo, supondo que os dois bolos são do mesmo tamanho?

- $\frac{2}{3}$ é maior
- **$\frac{3}{4}$ é maior**

- As duas são iguais
- Não dá pra comparar

Uma forma fácil de comparar é transformar em frações equivalentes com o mesmo denominador: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ e $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Como 9 é maior que 8, $\frac{3}{4}$ representa uma fatia maior do bolo.

5. João fez uma prova com 10 questões e acertou 7. Qual fração representa a parte da prova que ele ACERTOU?

- $\frac{3}{10}$
- $\frac{7}{3}$
- **$\frac{7}{10}$**
- $\frac{10}{7}$

O denominador é sempre o total de questões (10) e o numerador é a parte que queremos representar, no caso os acertos (7). Por isso a fração fica $\frac{7}{10}$, mostrando que ele acertou 7 em cada 10 questões.

6. Uma receita de suco pede $\frac{3}{4}$ de litro de água. Se Camila quer fazer o DOBRO da receita, quantos litros de água ela vai precisar?

- $\frac{3}{8}$ de litro
- **$\frac{6}{4}$ de litro (1 e $\frac{1}{2}$)**
- $\frac{3}{4}$ de litro
- $\frac{6}{8}$ de litro

Dobrar uma fração é multiplicar por 2: $\frac{3}{4} \times 2 = \frac{6}{4}$, que também pode ser escrito como 1 inteiro e mais $\frac{2}{4}$, ou seja, 1 litro e meio. Vale lembrar que multiplicar por 2 só o numerador muda quando o denominador permanece o mesmo.

7. Em uma turma de 30 alunos, $\frac{2}{5}$ foram ao museu na excursão. Quantos alunos foram ao museu?

- 6 alunos
- 10 alunos
- **12 alunos**
- 15 alunos

Primeiro dividimos 30 por 5, que dá 6 (isso é $\frac{1}{5}$ da turma). Depois multiplicamos por 2, já que queremos $\frac{2}{5}$, resultando em 12 alunos. Essa estratégia de dividir e depois multiplicar funciona pra qualquer fração!

8. Marcos comeu $\frac{5}{6}$ de uma barra de chocolate e guardou o restante para o irmão. Que fração da barra sobrou para o irmão?

- **$\frac{1}{6}$**
- $\frac{5}{6}$
- $\frac{1}{5}$
- $\frac{6}{5}$

Se a barra inteira representa $\frac{6}{6}$ e Marcos comeu $\frac{5}{6}$, basta subtrair: $\frac{6}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$. É sempre bom lembrar que o inteiro pode ser escrito como uma fração onde numerador e denominador são iguais.