

מטלת מנחה 11 - אלגברה לינארית 2

328197462

31/03/2023

שאלה 1

סעיף א

נוכיח ישירות לפי הגדרה כי לכל $A, B \in M_{n \times n}^{\mathbb{C}}$ מתקיים $(T_P A, B) = (A, T_{P^*} B)$.
אכן, יהיו A, B מטריצות ונקבל:

$$\begin{aligned} (T_P A, B) &\stackrel{\text{הגדרה}}{=} \text{tr}(B^* P^{-1} A P) \\ (A, T_{P^*} B) &\stackrel{\text{הגדרה}}{=} \text{tr}(((P^*)^{-1} B P^*)^* A) \stackrel{2.1.4}{=} \text{tr}(P B^* P^{-1} A) \stackrel{*}{=} \text{tr}(B^* P^{-1} A P) = (T_P A, B) \end{aligned}$$

נימוק ל(*): לפי לינאריות, $\text{tr}(CD) = \text{tr}(DC)$.

סעיף ב

איברי הבסיס הסטנדרטי הם $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
כידוע מסעיף א, $(T_P)^* = T_{P^*}$. המטריצה $P^* = \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$
נחשב את המטריצה ההופכית $(P^*)^{-1}$:

$$\begin{aligned} (P^* | I) &= \left(\begin{array}{cc|cc} -i & -1 & 1 & 0 \\ 1 & i & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow iR_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -i & i & 0 \\ 1 & i & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -i & i & 0 \\ 0 & 2i & -i & 1 \end{array} \right) \\ &\dots \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2}iR_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -i & i & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + iR_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2}i & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \end{array} \right) = (I | (P^*)^{-1}) \end{aligned}$$

נחשב את תמונות ההעתקה T_{P^*} עבור איברי הבסיס הסטנדרטי.

$$\begin{aligned} (T_{P^*})E_{11} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}i & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}i & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \\ \frac{1}{2}i & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ (T_{P^*})E_{12} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}i & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}i \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}i & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \end{pmatrix} \\ (T_{P^*})E_{21} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}i & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}i & 0 \\ -\frac{1}{2}i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}i & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}i \end{pmatrix} \\ (T_{P^*})E_{22} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}i & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}i \\ 0 & -\frac{1}{2}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2}i \\ -\frac{1}{2}i & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן נקבל:

$$[T_{P^*}]_E = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i & -i & 1 \\ -i & -1 & -1 & i \\ i & -1 & -1 & -i \\ 1 & -i & i & 1 \end{pmatrix}$$

שאלה 2

נשים לב כי:

$$U^* = (P + iQ)^* \stackrel{2.1.4}{=} P^t - iQ^t \qquad D^t = \begin{pmatrix} P^t & Q^t \\ -Q^t & P^t \end{pmatrix}$$

סעיף א

נניח כי $U = U^*$, כלומר $P + iQ = P^t - iQ^t$.
נשווה חלק ממשי וחלק מדומה. מקבלים $P = P^t$, $Q = -Q^t$, ולכן:

$$D^t = \begin{pmatrix} P^t & Q^t \\ -Q^t & P^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & -Q \\ Q & P \end{pmatrix} = D$$

ובכך השלמנו את ההוכחה.

סעיף ב

נניח כי U אוניטרית. כלומר:

$$I = U \cdot U^* = (P + iQ)(P^t - iQ^t) \stackrel{\text{פילג}}{=} PP^t - iPQ^t + iQP^t + QQ^t = (PP^t + QQ^t) + i(QP^t - PQ^t)$$

נשווה חלק ממשי וחלק מדומה ונקבל $PP^t + QQ^t = I$, $QP^t - PQ^t = 0$. לכן:

$$D \cdot D^t = \begin{pmatrix} P & -Q \\ Q & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^t & Q^t \\ -Q^t & P^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PP^t + QQ^t & PQ^t - QP^t \\ QP^t - PQ^t & QQ^t + PP^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n \times n} & O_{n \times n} \\ O_{n \times n} & I_{n \times n} \end{pmatrix} = I_{2n \times 2n}$$

ולכן D אורתוגונלית.

שאלה 4

ראשית:

$$H^* = (I - 2ww^*)^* \stackrel{2.1.4}{=} I - 2(w^*)^* w^* = I - 2ww^* = H$$

$$HH^* = (I - 2ww^*)(I - 2ww^*) = I - 4ww^* + 4(ww^*)^2$$

נדרוש $I = HH^*$. נקבל $0 = 4(ww^*)^2 - 4ww^* = 0$ ולכן $ww^* = (ww^*)^2$. נשים לב כי:

$$(ww^*)^2 = (ww^*)(ww^*) = w(w^*w)w^* = w||w||^2w^* = ||w||^2ww^*$$

נציב את שתי המסקנות האחרונות שלנו ביחד, ונקבל $ww^* = ||w||^2ww^*$, כלומר $||w||^2 = 1$ ולכן $||w|| = 1$ מתכונת החיוביות.

מצאנו תנאי הכרחי עבור w : אם H אוניטרית, אז $||w|| = 1$. נוכיח כי זהו תנאי מספיק. עבור $||w|| = 1$,

$$HH^* = I - 4ww^* + 4(ww^*)^2 = I - 4ww^* + 4||w||^2ww^* \stackrel{||w||=1}{=} I$$

נוכיח את תכונת השיקוף.

$$Hw = (I - 2ww^*)w = Iw - 2ww^*w = w - 2||w||^2w = -w$$

יהא $v \in w^\perp$. אז $0 = w^*v = \langle v, w \rangle$, ומקבלים:

$$Hv = (I - 2ww^*)v = Iv - 2ww^*v = v - 2w \cdot 0 = v$$