

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

CINNABSIN

Cinnabaris D3 25 mg, Echinacea D1 25 mg, Hydrastis D3 25 mg, Kalium bichromaticum D3 25 mg

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cinnabsin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cinnabsin
3. Cum să utilizați Cinnabsin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cinnabsin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE CINNABSIN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cinnabsin este un medicament homeopat.

Se utilizează pentru tratamentul inflamațiilor acute și cronice ale sinusurilor paranazale (sinuzite).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI CINNABSIN

Nu utilizați Cinnabsin

- dacă sunteți sensibili la crom, Echinacea, alți reprezentanți ai familiei compozitelor sau la oricare din componentele preparatului. Din motive fundamentale,
- Cinnabsin trebuie evitată în boli progresive sistemice (cum ar fi tuberculoză, sarcoidoză), maladii sistemice ale sistemului de celule sanguine albe (de exemplu, leucemie și leucoze), maladii autoimune (de exemplu, boli inflamatorii ale țesutului collagen (collagenous), scleroză multiplă), imunodeficit (SIDA, infecțiile cu HIV), imunosupresie (de exemplu, după transplantul de măduvă osoasă sau organi, chimioterapie), boli cronice virale.
- la copii cu vârsta sub 2 ani.
- în timpul sarcinii.

Aveți grijă deosebită când utilizați Cinnabsin

Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază sau sindrom Lapp de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Conține amidon de grâu poate conține gluten, dar numai în cantități foarte mici și de aceea se recomandă administrarea cu precauție la persoane cu boala celiacă.



Pacienții cu alergie la grâu (diferită de boala celiacă) nu trebuie să utilizeze acest medicament.

O reevaluare terapiei este necesară

- În cazul în care pacientul prezintă edem facial, febră sau cefalee severă,
- În cazul în care starea acută nu se ameliorează sau se agravează în termen de primele 2 zile de tratament,
- În cazul în care apar plângeri suplimentare.

Simptomele pentru care se administrează un medicament homeopat se pot înrăutăți temporar (agravare inițială). În astfel de cazuri reduceți dozele sau întrerupeți tratamentul. Adresați-vă medicului dacă tulburările sunt persistente sau dacă apar simptome noi.

În lipsa ameliorării clinice după 4 săptămâni sau la apariția simptomelor noi se recomandă reevaluarea tratamentului.

Utilizarea Cinnabsin împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc influențe ale Cinnabsin asupra altor medicamente și nici ale altor medicamente asupra Cinnabsin.

Utilizarea Cinnabsin împreună cu alimente și băuturi

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

Sarcina și alăptarea

Contraindicată în timpul sarcinii. În perioada de alăptare trebuie de administrat numai după evaluarea raportului beneficiu-risc.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează asupra capacității de conducere a autovehiculelor sau de manevrare a utilajelor potențial periculoase.

Informații importante privind unele componente ale Cinnabsin

Acest medicament conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI CINNABSIN

Utilizați întotdeauna Cinnabsin exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dacă nu se indica altfel, Cinnabsin trebuie de administrat după cum urmează:

Copiiilor cu vârsta 2-5 ani: în afecțiuni acute se administrează câte 1 comprimat de 3 ori pe zi până la ameliorarea stării; ulterior, de asemenea și în stări cronice – câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Copiiilor cu vârsta 6-11 ani: în afecțiuni acute se administrează câte 1 comprimat peste fiecare 2 ore (însă nu mai mult de 6 comprimate pe zi) până la ameliorarea stării; ulterior, de asemenea și în stări cronice – câte 1comprimat de 3 ori pe zi.

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: în afecțiuni acute se administrează câte 1 comprimat peste fiecare oră (însă nu mai mult de 12 comprimate pe zi) până la ameliorarea stării; ulterior, de asemenea și în stări cronice – câte 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

În stări cronice: adulți și copii - câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Durata tratamentului- 4-6 săptămâni.

Durata maximă a curei de tratament – 4 săptămâni.

Preparatul se administrează de preferință cu 30 min înainte de masă sau peste 30 min după masă. Comprimatele se vor dizolva lent în cavitate bucală. Pentru administrare la sugari comprimatele pot fi dizolvate într-o cantitate mică de apă.

Trebuie să vă adresați medicului dacă simptomele se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc timp de 4 săptămâni.

Nu luați Cinnabsin timp îndelungat, fără recomandarea medicului.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Cinnabsin

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Cinnabsin

Dacă ați uitat să luați o doză, luați alta, imediat ce v-ați amintit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Cinnabsin

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.


4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

În cazuri unice, pot apărea manifestări de hipersensibilitate, cum ar fi reacții cutanate sau tulburări gastrointestinale.

La pacienții care administrează concomitent alte preparate ce conțin Echinacea pot apărea erupții cutanate, prurit, și, în cazuri rare, edem facial, dispnee, amețeli, și o scădere a tensiunii arteriale.

Echinacea poate declanșa reacții alergice la pacienții atipici (de exemplu, pacienții cu febră de fân, neurodermatita, astm alergic). În cazul apariției reacțiilor adverse este necesară sistarea administrării preparatului și luarea măsurilor adecvate. În caz de intensificare a secreției salivare după administrarea de Cinnabsin se recomandă de a reduce doza sau de a sista administrarea preparatului. Reclamațiile existente pot deveni temporar mai rău, atunci când medicamentele. Simptomele pentru care se administrează un medicament homeopat se pot înrăutăți temporar (agravare inițială). În astfel de cazuri, pacienții sunt sfătuiți să întrerupă tratamentul și să consulte un medic.

În caz de apariție a reacțiilor adverse se recomandă efectuarea măsurilor corespunzătoare.



Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CINNABSIN

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor

Nu utilizați Cinnabsin după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu necesită condiții speciale de păstrare

A se păstra în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei <sau a reziduurilor> menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Cinnabsin

Substanțele active sunt: Cinnabaris, Echinacea, Hydrastis, Kalium bichromaticum

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de grâu, stearat de magneziu

Cum arată Cinnabsin și conținutul ambalajului

Cinnabsin se prezintă sub formă de comprimate plate, de culoare de la alb sau aproape albe, uneori cu incluziuni ușor vizibile, cu margini teșite. Este disponibil câte 5 blistere în cutie din carton. Câte 20 comprimate în blister.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Deutsche Homöopathie – Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe,
Germania.

Fabricantul

Deutsche Homöopathie – Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe,
Germania.

Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2016.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>