

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению  
лекарственного средства  
(информация для специалиста)

**ТОНЗИЛОТРЕН**

**Основные физико-химические свойства**

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления. Возможен лёгкий сероводородный запах.

**Международное непатентованное название**

Отсутствует

**Состав лекарственного средства**

В 1 таблетке (250,0 мг) содержится:

*действующие вещества:* Atropinum sulfuricum (атропина сульфат) trit. D5 12,5 мг, Hepar sulfuris (гепар сульфур) trit. D3 10,0 мг, Kalium bichromicum (калия бихромат) trit. D4 50,0 мг, Silicea (кремнезем) trit. D2 5,0 мг, Mercurius bijodatus (ртути (II) йодид) trit. D8 25, 0 мг;  
*вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, сахароза, магния стеарат.

**Лекарственная форма**

Таблетки.

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое лекарственное средство.

Код АТС: V03AX. Прочие лекарственные средства

**Фармакологические свойства**

Гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины.

Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Тонзилотрен является комбинированным гомеопатическим средством. Он применяется в комплексном лечении воспалительных заболеваний глотки (острый и хронический тонзиллит).

**Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утверждённых терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии острого и хронического тонзиллита

**Способ применения и дозы**

При отсутствии других указаний врача Тонзилотрен применяют следующим образом:

*при остром течении заболевания* – взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке каждый час (но не более 6 таблеток в сутки). Увеличение длительности лечения более одной недели в указанном режиме или увеличение суточной дозы возможно только после консультации с врачом.

Детям от 6 до 12 лет в течение суток назначают две трети дозы для взрослых (не более 4 таблеток в сутки).

При улучшении состояния частота приёма должна быть снижена.

*При хронической форме заболевания:* взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 1-3 раза в день.

Таблетки следует принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом. 2879 - 2018

**Побочные действия**

Возможно развитие аллергических реакций (например, зуд, кожная сыпь). Возможно повышенное слюноотделение.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к хрому или к какому-либо другому веществу, входящему в состав лекарственного средства.

**Передозировка**

Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки рекомендовано обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Меры предосторожности**

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультироваться с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Пациентам с заболеваниями щитовидной железы перед применением необходима консультация лечащего врача. При заболеваниях щитовидной железы (гипертиреоз) гомеопатическое средство принимать только по назначению лечащего врача.

Таблетки Тонзилотрен содержат лактозу. В связи с содержанием лактозы гомеопатическое средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.

Таблетки Тонзилотрен содержат сахарозу, что следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. В связи с содержанием сахарозы гомеопатическое средство не следует принимать пациентам с непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (тяжелое течение воспаления, наличие гнойной инфекции, повышение температуры тела в течение трех дней или подъем температуры тела выше 39 °C и др.), необходимо прекратить прием гомеопатического средства и обратиться к врачу.

**Применение у детей**

Гомеопатическое средство не следует назначать детям до 6 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

**Беременность и кормление грудью.**

В связи с отсутствием достаточных данных прием лекарственного средства во время беременности и лактации возможен только после консультации врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

**Влияние на способность вождения автотранспорта и работу с механизмами**

Не влияет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

До настоящего времени не известны. Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

НД РБ

2879 - 2018

**Условия хранения и срок годности**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 до 25 °С в недоступном для детей месте.  
Срок годности данного гомеопатического лекарственного средства при условии его должного хранения в закрытой упаковке составляет 5 лет.

**Условия отпуска**

Отпускается без рецепта.

**Форма выпуска и упаковка**

Блистеры по 20 таблеток. 3 блистера пакуют в картонную коробку с листком-вкладышем для пациентов.


**Производитель**

Дойче Хомеопати-Унион  
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ,  
Оттоштрассе 24  
Тел.: + 49 (721) 4093 236

Deutsche Homöopathie - Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Germany, Karlsruhe 76227  
Ottostrasse 24  
tel. + 49 (721) 4093 236

**Произведено:**

Доктор Вильмар Швабе Гмбе & Ко КГ,  
Германия



Тонзилотрен  
таблетки

НД РБ  
2879 - 2018

### Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз.  
Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта.  
Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

#### Основные физико-химические свойства

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления. Возможен лёгкий сероводородный запах.

#### Состав лекарственного средства

В 1 таблетке (250,0 мг) содержится:

*действующие вещества:* Atropinum sulfuricum (атропина сульфат) Trit. D5 12,5 мг, Hepar sulfuris (гепар сульфур) Trit. D3 10,0 мг, Kalium bichromicum (калия бихромат) Trit. D4 50,0 мг, Silicea (кремнезем) Trit. D2 5,0 мг, Mercurius bijodatus (ртути (II) йодид) Trit D8 25, 0 мг;  
*вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, сахароза, магния стеарат.

#### Форма выпуска

Таблетки.

#### Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

#### Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утверждённых терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии острого и хронического тонзиллита.

#### Противопоказания.

Повышенная чувствительность к хрому или к какому-либо другому веществу, входящему в состав лекарственного средства.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

До настоящего времени не известны. Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

#### Меры предосторожности

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультироваться с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Пациентам с заболеваниями щитовидной железы перед применением необходима консультация лечащего врача. При заболеваниях щитовидной железы (гипертиреоз) гомеопатическое средство принимать только по назначению лечащего врача.

Таблетки Тонзилотрен содержат лактозу. В связи с содержанием лактозы гомеопатическое средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.

Таблетки Тонзилотрен содержат сахарозу, что следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. В связи с содержанием сахарозы гомеопатическое средство не следует принимать пациентам с непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (тяжелое течение воспаления, наличие гнойной инфекции, повышение температуры тела в течение трех дней или подъем температуры тела выше 39 °C и др.), необходимо прекратить прием гомеопатического средства и обратиться к врачу.

#### *Применение у детей*

Гомеопатическое средство не следует назначать детям до 6 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

#### *Беременность и кормление грудью.*

В связи с отсутствием достаточных данных прием лекарственного средства во время беременности и лактации возможен только после консультации врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

#### *Влияние на способность вождения автотранспорта и работу с механизмами*

Не влияет.

#### *Способ применения и дозы*

При отсутствии других указаний врача Тонзилотрен применяют следующим образом:

*при остром течении заболевания* – взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке каждый час (но не более 6 таблеток в сутки). Увеличение длительности лечения более одной недели в указанном режиме или увеличение суточной дозы возможно только после консультации с врачом.

Детям от 6 до 12 лет в течение суток назначают две трети дозы для взрослых (не более 4 таблеток в сутки).

При улучшении состояния частота приема должна быть снижена.

*При хронической форме заболевания:* взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 1-3 раза в день.

Таблетки следует принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

#### *Передозировка*

Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки рекомендовано обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

#### *Побочные действия*

Возможно развитие аллергических реакций (например, зуд, кожная сыпь). Возможно повышенное слюноотделение.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.


При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

#### *Срок годности*

5 лет.

Дата истечения срока годности указана на упаковке и этикетке. Не применяйте препарат после этой даты.

#### *Хранение*



2879 - 2018

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 до 25 °C в недоступном для детей месте.

**Упаковка и содержимое**

Блистеры по 20 таблеток. 3 блистера пакуют в картонную коробку с листком вкладышем для пациентов.

**Условия отпуска**

Отпускается без рецепта.

**Производитель**

Дойче Хомеопати-Унион  
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ,  
Оттоштрассе 24  
Тел.: + 49 (721) 4093 236

Deutsche Homöopathie - Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Germany, Karlsruhe 76227  
Ottostrasse 24  
tel. + 49 (721) 4093 236

**Произведено:**

Доктор Вильмар Швабе Гмбе & Ко КГ,  
Германия

ОБЪЕДИНЕННАЯ  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Пресс-Универсал-Сервис-Технологии  
Реклама и Визуализация