

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

### ИНФЛЮЦИД / INFLUCID®

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Инфлюцид / Influcid®

**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь

**Состав (на 100 г или 107,0 мл):**

*активные компоненты:* Aconitum napellus (Аконитум напеллус) D3 - 10 г, Gelsemium sempervirens (Гельземиум семпервиренс) D3 - 10 г, Cephaelis ipecacuanha (Цефалис ипекакуана) D3 - 10 г, Phosphorus (Фосфорус) D5 - 10 г, Bryonia (Бриония) D2 - 10 г, Eupatorium perfoliatum (Эупаториум перфолиатум) D1 - 10 г.

*вспомогательные компоненты:* 96%-ый этанол, очищенная вода.

Содержание этанола: 45 об. %.

#### Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого цвета до светло-желтого с зеленоватым оттенком, с запахом этанола.

#### Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

#### Показания к применению

Применяется для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

#### Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Вследствие содержания алкоголя не применять препарат детям до 12 лет.

В таких случаях рекомендуется приём препарата в таблеточной форме.

#### Применение во время беременности и в период кормления грудью

Во время беременности и в период кормления грудью принимать препарат только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

761

*Handwritten signature*

**Способ применения и дозы**

При остром заболевании детям от 12 лет и взрослым принимать по 10 капель каждый час (не более 12 раз в день) до наступления улучшения, при последующем лечении по 10-20 капель 3 раза в день до полного выздоровления.

В случае отсутствия улучшения, а также при ухудшении состояния по истечении 2 дней лечения Инфлюцидом, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Для профилактики респираторно-вирусной инфекции рекомендуется принимать по 10-20 капель 3 раза в день. Профилактическое применение проводят в течение всего времени, пока в окружении находятся люди с симптомами респираторно-вирусной инфекции.

Капли принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, подержав их перед проглатыванием некоторое время во рту.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не выявлены.

Приём гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания**

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Разовая доза препарата (10 капель) содержит 0,30 мл этанола.

**Форма выпуска**

Капли для приема внутрь. По 30 мл в стеклянные флаконы из коричневого стекла (гидролитический класс III) с капельницей и завинчивающейся крышкой.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения**

При температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Предприятие-производитель**

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-  
Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ,  
Оттоштрассе, 24

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Germany, Karlsruhe 76227  
Ottostrasse, 24

Произведено: Доктор Вильмар Швабе  
ГмбХ & Ко. КГ, Германия

**Представительство в России /**

**Организация, принимающая претензии потребителя**

119526 Москва, проспект Вернадского, д.105, стр.2  
тел.: (495) 438-21-16

Начальник отдела регистрации ЛС  
«Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-  
Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ»



Е.В.Назарова

И.о. директора Института доклинической  
и клинической экспертизы  
лекарственных средств

А.Н. Васильев