

INFLUCID comprimate**Compoziție:**

Un comprimat conține *Aconitum* D₃-25 mg, *Gelsemium* D₃-25mg, *Ipecacuanha* D₃,-25 mg, *Phosphorus* D₅-25 mg, *Bryonia* D₂-25 mg, *Eupatorium perfoliatum* D₁-25 mg și excipienți: lactoză monohidrat, stearat de magneziu, amidon de grâu.

Grupa farmacoterapeutică: Produse homeopate.

Indicații terapeutice

Util în răceli însoțite de febra, ca de exemplu, gripa.

Contraindicații

Hipersensibilitate la oricare dintre componentii produsului.

Precauții

Nu sunt necesare precauții speciale dacă *Influcid* este utilizat conform recomandărilor.

Interacțiuni

Nu sunt cunoscute.

Indicație generală: efectul unui medicament homeopat poate fi influențat nefavorabil de factori generali ce țin de stilul de viață, consumul de stimulante, alcool, cafea, dietă bogată.

Atenționări speciale

Pentru administrarea *Influcid* la sugari nu există suficientă experiență. De aceea nu se va folosi *Influcid* pentru sugari până la un an.

Sarcina și alăptarea:

Ca orice medicament *Influcid* se va utiliza în perioada respectivă doar cu avizul prealabil al medicului homeopat.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Produsul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare

În cazul în care medicul nu recomandă alte doze, în afecțiuni acute doza recomandată este de 1 comprimat la fiecare oră (cel mult 12 comprimate pe zi) până la apariția unei ameliorări; apoi doza recomandată este de 1 comprimat de 3 ori pe zi.

La copii cu vârste cuprinse între 1-6 ani doza recomandată este 1/2 din doza prescrisă adulților (comprimatele se administrează din oră în oră, fără a depăși 6 comprimate/zi), iar la copii cu vârste între 6-12 ani 2/3 din doza prescrisă adulților (comprimatele se administrează din oră în oră, fără a depăși 8 comprimate/zi).

Tabletele se iau cu o jumătate de oră înainte sau după masă și este de preferat să se lase să se dizolve încet în cavitatea bucală.

Pentru copii mici comprimatele pot fi dizolvate într-o cantitate mică de apă.

Preparatele homeopatice nu se iau pe perioade îndelungate fără ca pacientul să ceară sfatul medicului homeopat.

Reacții adverse

Administrarea unui medicament homeopat poate determina agravarea temporară a simptomatologiei (agravarea inițială).

În această situație medicul homeopat poate decide, dacă este necesar, întreruperea tratamentului.

Supradozaj

Ingestia în cantități mari (conținutul unei cutii) poate provoca la persoanele cu intoleranță la lactoza afecțiuni ale tubului digestiv sau poate avea efect purgativ. În astfel de situații pacientul trebuie să se adreseze medicului.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 3 blistere a câte 20 comprimate.

Fabricant

Deutsche-Homöopathie-Union
DHU -Arzneimittel GmbH&Co.KG, Germania

Detinătorul Autorizației de punere de piață

ALPEN PHARMA GmbH
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germania

Data ultimei verificări a prospectului

Februarie 2020