

“10” may 2018-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

SİNNABSİN tabletlər
CINNABSİN®

Tərkibi

Təsiredici maddələr: 1 tabletin (250 mq) tərkibində 25 mq Cinnabaris (Zəncəfrə) trit. D3, 25 mq

Echinacea (Exinaseya) trit. D1, 25 mq Hydrastis (Gidrastis) trit D3, 25 mq kalium

bichromicum (kalium-bixromat) trit. D3 vardır.

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, maqnezium stearat, buğda nişastası.

Təsviri: ağ və ya ağa bənzər rəngli, bəzən ayrı-ayrı qara nöqtələrlə, bükülü kənarı olan iki düzlüklü tabletlər

Farmakoterapevtik qrupu

Homeopatik dərman vasitəsi.

ATC kodu: R01B.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Homeopatik terapiya, xəstəlik anlayışında və dərman substansiyalarının istifadəsinə münasibətdə ənənəvi tibbi terapiyadan seçilir. Homeopatik vasitələr orqanizmin müdafiə gücünü stimullaşdırır və beləliklə özünümüalicə potensialını aktivləşdirir. Homeopatik vasitələrə qarşı orqanizmin cavabı qəti şəkildə fərvidir. Bu səbəbə görə dozaspesifik farmakoloji effektlər, farmakodinamik və ya farmakokinetik məlumatlar müəyyən edilə bilməz.

İstifadəsinə göstərişlər

Sinusların kəskin və xroniki iltihabı (sinusutlər).

Əks göstərişlər

Preparatı xroma, Exinaseyeyə və digər mürəkkəbçəkçəkliyə və ya preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq zamanı istifadə etmək olmaz. Sinnabsini aşağıdakı progressivləşən sistem xəstəliklər zamanı istifadə etmək olmaz: vərəm, sarkoidoz; ağ qan hissəciklərinin sistem xəstəlikləri (leykemiya və leykoz), autoimmun xəstəliklər (məsələn, kollagen toxumasının iltihabi xəstəlikləri (kollagenoz), dağınıq skleroz), immunnodefisit zamanı (QİÇS, İİV infeksiyası), immunitetin zəifləmiş vəziyyəti (məsələn, orqan və ya sü-mük iliyinin transplantasiyası, kimyaterapiya) və ya xroniki virus xəstəlikləri.

Preparat 2 yaşa qədər uşaqlarda və hamiləlik dövründə əks göstərişdir.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Preparatın tərkibində laktoza və buğda nişastası vardır. Bu səbəbə görə qalaktozaya qarşı dözümsüzlük, laktaza çatışmazlığı və ya qlükoza-qalaktoza malabsorbsiyası sindromu kimi nadir irsi xəstəliyi olan pasiyentlər preparatdan istifadə etməməlidirlər. Buğda

nişastasının tərkibində qlüten ola bilər (ancaq izi görünə biləcək qədər), bu səbəbə görə seliakialı pasiyentlərdə təhlükəli deyil. Buğdaya qarşı allergiyası olan pasiyentlər (seliakiyadan fərqlənir) preparatdan istifadə etməməlidirlər.

Aşağıdakı hallar baş verdikdə həkimə müraciət etmək lazımdır: sifətin ödemi, qızdırma və ya bərk baş ağrısı, müalicənin ilk 2 günü ərzində kəskin vəziyyətin dəyişməməsi və ya pisləşməsi, eləcə də əlavə şikayətlərin meydana gəlməsi.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri məlum deyil. Eyni vaxtda digər dərman vasitələrinin qəbuluna ehtiyac olduqda, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Sinnabsinin tərkibində Echinacea olduğu üçün hamiləlik dövründə preparatın istifadəsi əks göstərişdir. Laktasiya dövründə preparatın istifadəsi, yalnız həkim məsləhətindən sonra mümkündür.

Pediatrilyada istifadə

Preparat 2 yaşa qədər uşaqlarda əks göstərişdir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparat nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə mənfi təsir etmir.

İstifadə qaydası və dozası

Dozalanma rejimi

Böyükklər

Kəskin vəziyyətdə, simptomların yaxşılaşmasına qədər hər 1 saatdan bir 1 tablet qəbul edilir. Gün ərzində maksimum 12 tablet istifadə etmək olar. Sonrakı müalicədə gündə 3 dəfə 1-2 tablet təyin edilir.

İnfeksiyaların profilaktikası məqsədilə gündə 3 dəfə 1-2 tablet istifadə edilir.

Pediatrik qrup

2-5 yaşlı uşaqlar

Kəskin hallarda, pasiyentin vəziyyəti yaxşılaşana qədər gündə 3 dəfə 1 tablet təyin edilir. Sonrakı müalicədə gündə 3 dəfə 1 tablet rejimi ilə davam etdirilir.

6-11 yaşlı uşaqlar

Kəskin hallarda, pasiyentin vəziyyəti yaxşılaşana qədər hər 2 saatdan bir 1 tablet təyin edilir (6 tabletdən artıq qəbul etmək olmaz). Sonrakı müalicədə gündə 3 dəfə 1 tablet rejimi ilə davam etdirilir.

12 yaşdan yuxarı uşaqlar

Kəskin hallarda, simptomların yaxşılaşmasına qədər hər 1 saatdan bir 1 tablet qəbul edilir (gün ərzində 12 tabletdən artıq istifadə etmək olmaz). Sonrakı müalicədə gündə 3 dəfə 1-2 tablet təyin edilir.

Xəstəliyin xroniki hallarında uşaqlara və böyükklərə gündə 3 dəfə 1 tablet təyin edilir.

Məsləhət görülən müalicə müddəti 4-6 həftədir.

Həkim məsləhəti olmadan Sinnabsini 4 həftədən artıq qəbul etmək olmaz.

İstifadə qaydası

Preparatı yeməkdən ya 30 dəqiqə əvvəl, ya da 30 dəqiqə sonra qəbul etmək lazımdır. Tabletlər asta-asta ağız boşluğunda əriyir. Azyaşlı uşaqlara tabletləri xırdalayıb və bir qədər suda (məsələn, çay qaşığında) həll edərək vermək olar.

Əlavə təsirləri

Nadir hallarda dəri səpgisi və mədə-bağırsaq pozulmaları daxil olmaqla yüksək həssaslıq reaksiyaları mümkündür. Tərkibində exinaseya olan digər preparatları qəbul edən pasiyentlərdə allergik reaksiyalar müşahidə edilmişdir (dəridə səpgi, qaşınma, nadir hallarda – sifətin ödəmi, dispnoe, başgicəllənmə və arterial təzyiqin enməsi). Exinaseya atopik pasiyentlər arasında allergik reaksiyalara səbəb ola bilər (məsələn, pollinoz, neyrodermit, allergik astması olan pasiyentlər). Bu cür arzuolunmaz hallar inkişaf etdikdə preparatın qəbulunu dayandırmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır.

Sinnabsin preparatının qəbulundan sonra ağızsuğu ifrazı güclənərsə, dozanı azaltmaq və ya preparatın qəbulunu dayandırmaq lazımdır.

Hər hansı əlavə təsir yaranıqda, preparatın qəbulunu dayandırmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır.

Qeyd

Homeopatik dərman vasitələrinin istifadəsi zamanı müvəqqəti olaraq ilkin pisləşmə mümkündür. Bu zaman sinnabsinin istifadəsini dayandırmaq və həkimlə məsləhətləşmə lazımdır.

Doza həddinin aşılması

Doza həddinin aşılması müəyyən edilməmişdir.

Buraxılış forması

Tabletlər. 100 tablet qutuda (blisterlər 20 tabletdən) içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

15°C - 25°C temperaturda orijinal qablaşdırmada, uşaqlardan qorunan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

5 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı

Doyçe Homeopati-Yunion, DHU- Arzneimittel QmbH&Ko.KQ
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Almaniya.

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
Germany, Karlsruhe 76227, Ottostrasse 24
Tel. +49 (721) 40 93 236

Doktor Vilmar Şvabe QmbH&Ko.KQ, Almaniya.
Karlsruhe 76227, Vilmar Şvabe Ştrasse 4.
Tel.: 49 (0) 721 40 050; +49 (0) 721 40005 165

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG
Germany, 76227 Karlsruhe, Willmar-Schwabe-Str. 4
Tel. +49 (0) 721 4005 0, + 49 (0) 721 40005 165