

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СИНОСАН

Торговое название препарата: Синосан

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

1 таблетка (250 мг) содержит:

действующие вещества: Cinnabaris (киноварь) trit. D3 25 мг, Echinacea (эхинацея) trit. D1 25 мг, Hydrastis (желтокорень канадский) trit. D3 25 мг, Kalium bichromicum (калия бихромат) trit. D3 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Описание: белые или почти белые, двухплоскостные таблетки со скошенной кромкой, иногда с отдельными темными точками.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатическое лекарственное средство.

Код АТХ: R01B

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия явно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных субстанций. Гомеопатические средства стимулируют защитные силы самого организма и активируют таким образом его потенциал самоизлечения. Ответ организма на гомеопатическое средство строго индивидуален. По этой причине дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания к применению

Острый и хронический риносинусит.

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Взрослые: при *острых состояниях* принимать по 1 таблетке каждый час, максимум 12 таблеток в день, до наступления улучшения. При *дальнейшем лечении* принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Педиатрическая группа

Дети от 2 до 5 лет: при *острых состояниях* – по 1 таблетке 3 раза в день до наступления улучшения. При *дальнейшем лечении* продолжать принимать по 1 таблетке 3 раза в день;

Дети от 6 до 11 лет: при *острых состояниях* – по 1 таблетке через каждые 2 часа (но не более 6 таблеток в день) до наступления улучшения. При *дальнейшем лечении* принимать по 1 таблетке 3 раза в день;

Дети от 12 лет и старше: при *острых состояниях* – по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 таблеток в день) до наступления улучшения. При *дальнейшем лечении* принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

При *хронических состояниях* детям и взрослым принимать по 1 таблетке 3 раза в день, рекомендуемая длительность лечения – 4-6 недель.

Синосан не рекомендуется принимать свыше 4 недель, не проконсультировавшись с врачом.

Способ применения

Таблетки следует принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Маленьким детям рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Побочные действия

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая высыпания на коже и желудочно-кишечные расстройства. У больных, которые применяли другие препараты, содержащие эхинацею, наблюдались аллергические реакции (высыпания на коже, зуд, в редких случаях – отек лица, диспноэ, головокружение и снижение артериального давления).

Эхинацея может стать причиной возникновения аллергических реакций у атопических пациентов (например, у пациентов с сенной лихорадкой, нейродерматитом, аллергической астмой).

При возникновении таких нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

При усилении слюноотделения после приема препарата Синосан рекомендуется снизить дозу или прекратить прием препарата.

Примечание: При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата Синосан и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Препарат не следует применять при известной гиперчувствительности к хрому, Echinacea и другим сложноцветным или к какому-либо из компонентов препарата.

Препарат не следует применять при прогрессирующих системных заболеваниях (таких как туберкулез, саркоидоз), системных заболеваниях системы белых кровяных телец (лейкемии и лейкозе), аутоиммунных заболеваниях (например, воспалительных заболеваниях коллагеновой ткани (коллагенозах), рассеянном склерозе), при иммунодефицитах (СПИД, ВИЧ-инфекция), при угнетенном состоянии иммунитета (например после трансплантации органов или трансплантации костного мозга, химиотерапии) или при хронических вирусных заболеваниях.

Препарат противопоказан детям до 2 лет и в период беременности.

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны. В случае, если пациент недавно принимал, принимает либо планирует принимать другие лекарственные препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые предостережения и меры предосторожности

Существует риск возможных анафилактических реакций у атопических пациентов. Перед применением данного лекарственного средства атопическим пациентам следует проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу и пшеничный крахмал, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать препарат. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, поэтому он безопасен для людей с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличается от целиакии) не следует принимать препарат.

Проконсультируйтесь с врачом, если возникают следующие симптомы: отек лица, лихорадка или сильная головная боль, сохранение либо ухудшение острого состояния в течение первых 2-х дней лечения, а также появление дополнительных жалоб.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не следует применять препарат в период беременности из-за содержания эхинацеи. Если Вы кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом перед применением данного лекарственного средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Синосан не влияет на способность управлять автотранспортом или другими механизмами.

Передозировка.

В случае передозировки не наблюдалось никаких негативных последствий.

Форма выпуска.

По 20 таблеток в блистере из пленки ПВХ и фольги; по 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности.

5 лет.

Условия отпуска из аптек.

Без рецепта.

Производитель.

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Вильмар-Швабе Штрассе 4
Тел. +49 721 4005 0, +49 721 40005 165

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ул. Навнихол 86
М. Улугбекский район
100041, Узбекистан, г. Ташкент,
Тел.: +99871 230 91 93
E-mail: infopharmaff@gmail.com