



## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу

### ТОНЗИЛОТРЕН (TONSILOTREN®)

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить Atropinum sulfuricum D5 12,5 мг; Hepar sulfuris D3 10 мг; Kalium bichromicum D4 50 мг; Silicea D2 5 мг; Mercurius bijodatus D8 25 мг;  
*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, сахароза, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білого або майже білого кольору, іноді з окремими темними крапками, двоплощинні таблетки зі скошеною кромкою, без запаху або з легким запахом сірки.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

Комбінація з п'яти гомеопатичних монокомпонентів стимулює власні захисні механізми організму при вірусних і бактеріальних інфекціях глотки на різних стадіях запалення.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Гострий тонзиліт (катаральна та лакунарна ангіна), хронічний або рецидивний гострий тонзиліт, збільшення (гіперплазія) мигдаликів, а також симптоматичне лікування після оперативного видалення мигдаликів у дітей і дорослих.

**Протипоказання.**

Не застосовувати при гіперчутливості до хрому або до будь-яких інших компонентів лікарського засобу. При захворюваннях щитовидної залози (гіпертиреоз) препарат приймати тільки за призначенням лікаря.  
Препарат протипоказаний дітям до 2 років.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

*Примітка:* шкідливі звички, такі як вживання стимуляторів, алкоголю, тютюнопаління, можуть негативно впливати на дію гомеопатичних лікарських засобів.

**Особливості застосування.**

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку пацієнту потрібно припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат містить сахарозу, що слід враховувати пацієнтам, хворим на цукровий діабет.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

Якщо гострий стан не покращується або погіршується протягом перших 2 днів лікування, якщо з'являються додаткові скарги, наприклад температура тіла понад 39 °С, слід проконсультуватися з лікарем.

Оскільки лікарський засіб містить сахарозу, його не слід застосовувати пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Тонзилотрен у період вагітності або годування груддю призначає лікар лише після ретельної оцінки співвідношення користі для матері/ризiku для плода (дитини).

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Дорослі та діти віком від 12 років:

*при гострих станах:* приймати по 1 таблетці кожну годину, максимум 12 таблеток на добу до покращення;

*при подальшому лікуванні або при хронічних станах:* по 1–2 таблетки 3 рази на добу до повного одужання.

Дітям віком від 6 до 12 років:

*при гострих станах:* приймати по 1 таблетці через кожні 2 години, максимум 6 таблеток на добу до покращення;

*при подальшому лікуванні або при хронічних станах:* по 1 таблетці 3 рази на добу до повного одужання.

Дітям віком від 2 до 6 років:

*при гострих станах і при подальшому лікуванні або при хронічних станах:* приймати по 1 таблетці 3 рази на добу.

*Дорослим і дітям при збільшенні піднебінних мигдаликів:* приймати по 1 таблетці 3 рази на добу.

Якщо після завершення 8 днів лікування не спостерігається покращення, то слід проконсультуватися з лікарем.

Таблетки слід приймати за 30 хвилин до або через 30 хвилин після їди, повільно розсмоктуючи їх у ротовій порожнині.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

*Діти.* Препарат призначати дітям віком від 2 років.

***Передозування.*** Не встановлено.

***Побічні реакції.*** Після застосування можливе підвищене слиновиділення. У цьому випадку дозу потрібно зменшити або припинити прийом препарату. При виникненні алергічних реакцій з боку шкіри, таких як почервоніння шкіри, висипання на шкірі, слід припинити прийом препарату. У поодиноких випадках можливе виникнення болю в епігастрії та нудоти.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

***Термін придатності.*** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

***Умови зберігання.*** Зберігати при температурі не вище 25 °C у сухому, недоступному для дітей місці.

***Упаковка.*** По 20 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.*** Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/ Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.