01.12.2018 ЕСЭДО ГО (версия 7.13.2)

УТВЕРЖДЕНА

Приказом предсе	едателя
Комитета фармал	ции
Министерства зд	равоохранения
Республики Каза	хстан
«»	201_ г.
No	

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Тонзилотрен Tonsilotren®

Торговое название

Тонзилотрен Tonsilotren®

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

Одна таблетка (250 мг) содержит

активные вещества: Atropinum sulfuricum trit. D5 12,5 мг,

Hepar sulfuris trit. D3 10,0 мг, Kalium bichromicum trit. D4 50,0 мг, Mercurius bijodatus trit. D8 25,0 мг, Silicea trit. D2 5,0 мг,

вспомогательные вещества: сахароза, лактозы моногидрат, магния стеарат.

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, возможны отдельные темносерые вкрапления, плоскоциллиндрической формы с фаской, без запаха или с легким сернистым запахом

Фармакотерапевтическая группа

Респираторная система. Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики. Прочие препараты. Код ATX R02AA 20

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

В связи с содержанием сверхмалых доз активных ингредиентов в препарате, провести фармакокинетические исследования не представляется возможным.

Фармакодинамика

Тонзилотрен это комплексный гомеопатический препарат; в состав Тонзилотрена входит пять компонентов, которые дополняют друг друга для поддержания организма в процессе самовосстановления и для облегчения симптомов, таких как боль, покраснение и затруднения при глотании.

Аtropinum sulfuricum развивает свой эффект полностью в начальной фазе лихорадки, его применяют при состояниях, характеризующихся наличием яркого покраснения слизистой оболочки горла с присутствием чувства жара в ней, а также при наличии затруднений при глотании с отмечающимся постоянным ухудшением глотания. Mercurius bijodatus особенно подходит для уменьшения гипертрофированных носоглоточных миндалин, а также для снижения инфильтрации узлов шеи. Hepar sulfuris оказывает положительное влияние при постоянных и рецидивирующих воспалениях, а также при резкой и колющей боли, распространяющейся на область ушей. Постоянные затруднения при глотании и увеличенные миндалины и полипы чувствительны к Kalium bichromicum. Silicea ускоряет процесс снятие воспаления и уменьшает восприимчивость пациента к инфекциям путем иммуностимулирующего действия. В целом, Тонзилотрен эффективен при лечении всех фаз воспаления от первых жалоб до излечения хронически рецидивирующих процессов.

Показания к применению

- острый, хронический тонзиллит
- после хирургического удаления миндалин (тонзиллэктомии).

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Тонзилотрен применяют следующим образом:

При остром тонзиллите: дети от 6 до 12 лет - по 1 таблетке через каждые два часа (но не более 6 таблеток в день) в течение первых 1-2 дней до наступления улучшения; потом - по 1 таблетке 3 раза в день.

Взрослые и дети с 12 лет получают по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 таблеток в день) в течение первых 1-2 дней до наступления улучшения; потом - по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Курс лечения рекомендуется не более 10 дней.

В случае отсутствия улучшения после первых 2 дней лечения или появления новых симптомов заболевания (например, лихорадка выше 38°С), пациент обязательно должен проконсультироваться с врачом.

При хроническом тонзиллите: дети от 6 до 12 лет получают по 1 таблетке 3 раза в день, а взрослые и дети старше 12 лет — по 1-2 таблетки 3 раза в день. Лечение рекомендуется продолжать в течение 6-8 недель.

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту.

Побочные действия

- усиленное слюноотделение. В таких случаях рекомендуется снизить дозу или прекратить прием препарата.
- возможны реакции повышенной чувствительности (например, кожная сыпь).

Противопоказания

- гиперчувствительность к активным и вспомогательным компонентам препарата (например, хрому, ртути и пр.)
- гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз)
- детский возраст до 6 лет

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействие с лекарственными препаратами не выявлено. Прием этого гомеопатического препарата не исключает лечение другими лекарственными препаратами.

В случае приема других препаратов, включая безрецептурные препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Пациенты с редкими наследственными заболеваниями (непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы или сахаразоизомальтазная недостаточность) не должны принимать препарат.

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Беременность и период лактации

Применение Тонзилотрена во время беременности и кормления грудью возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами Тонзилотрен не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Форма выпуска и упаковка

01.12.2018 ЕСЭДО ГО (версия 7.13.2)

По 20 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлорида и фольги алюминиевой. По 3 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель и держатель регистрационного удостоверения

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

Предприятие-упаковщик

Др. Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ, Германия

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средства

ТОО «Альпен Фарма», Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский сельский округ, с. Кокузек, строение 1044 Тел./факс + 7 727 232-34-73,

+ 7 727 232-34-74

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «Альпен Фарма», Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский сельский округ, с. Кокузек, строение 1044 Моб. +7 701 035 70 69.

E-mail: pv.kz@alpenpharma.com