

Problema M. Sé Eficiente

Tiempo límite de ejecución en juez: 1 segundo

Límite de memoria: 256 MB

Se te da un arreglo con **N enteros**, y otro entero **M**. Debes encontrar el **número de subsecuencias consecutivas** (subarreglos) cuya **suma sea divisible por M**.

Por ejemplo:

- $N = 4$
- Arreglo: {2, 1, 4, 3}
- $M = 4$

Las subsecuencias consecutivas son:

{2}, {2 1}, {2 1 4}, {2 1 4 3},
{1}, {1 4}, {1 4 3},
{4}, {4 3},
{3}

De estas 10 subsecuencias consecutivas, **solo dos** tienen suma múltiplo de 4:

- {1 4 3}
- {4}

Entrada

La entrada comienza con un entero **T** (≤ 10), que indica el número de casos de prueba.

Cada caso contiene dos enteros:

- **N** ($1 \leq N \leq 10^5$)
- **M** ($1 \leq M \leq 10^5$)

La siguiente línea contiene **N enteros separados por espacios** que forman el arreglo.

Cada entero está en el rango **[1, 10^5]**.

Salida

Para cada caso, imprime:

- el número del caso,
- y el **número total de subsecuencias consecutivas** cuya suma sea divisible por **M**.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
2 4 4 2 1 4 3 6 3 1 2 3 4 5 6	Case 1: 2 Case 2: 11

Nota: El conjunto de datos es muy grande. Usa métodos de entrada/salida más rápidos.