

Guide pratique menant à la caractérisation de la douleur






1

- Réalisez l'examen clinique du patient


2

- Indiquez avec une flèche (nom entre parenthèses, si nécessaire) la source primaire de la douleur suspectée du patient



3

Hyperalgésie/allodynie primaire mécanique



- Dans l'image ci-dessus, indiquez par un cercle l'endroit où les tests d'hyperalgésie¹/allodynie² primaire mécanique seront effectués. Si le site principal de la douleur est profond, s'il vous plaît sélectionnez un emplacement aussi proche que possible, ou encore indiquez N/D (non disponible) dans un cercle.

¹Réfère à une sensation de douleur exagérée en réponse à un stimulus normalement douloureux

²Sensation de douleur en réponse à un stimulus normalement inoffensif.

4

Tests d'hyperalgésie/allodynie primaire mécanique

- Commencez par toucher la zone

- ☐ Température normale de la peau ☐ Température élevée de la peau (*calor*)
☐ Non-applicable

- Est-ce que le toucher est douloureux (*dolor*) ? O/N

- Est-ce que la région présente des rougeurs (*rubor*) ? O/N

- Est-ce que la région est gonflée (*tumor*) ? O/N

5

Tests d'hyperalgésie/allodynie primaire mécanique

A) Évaluation tactile pointue utilisant le senseur von Frey

Répétez le test 3 fois aux 10 secondes

Mesure 1 _____

Mesure 2 _____

Mesure 3 _____

Attendez 1 minute

B) Seuil de pression en utilisant le senseur mécanique

Wagner

Répétez le test 3 fois aux 10 secondes

Mesure 1 _____

Mesure 2 _____

Mesure 3 _____

Attendez 1 minute

C) Évaluation tactile dynamique de réponse évoquée par brossage

La réponse de retrait apparaît après :

- ☐ Un passage
☐ Deux passages
☐ Trois passages
☐ Pas de réponse

6

Tests d'hyperalgésie/allodynie secondaire

- Seuil de pression en utilisant le senseur mécanique Wagner

Répétez le test 3 fois

Mesure 1

Premier site _____
Deuxième _____
Troisième _____
Quatrième _____

Attendez 1 minute

Mesure 2


Premier site _____
Deuxième _____
Troisième _____
Quatrième _____

Attendez 1 minute

Mesure 3

Premier site _____
Deuxième _____
Troisième _____
Quatrième _____

**Veuillez
choisir
les sites
au hasard**



Sur la marge latérale du
muscle *longissimus*, latéral
à la 11^{ème} vertèbre

Sur la marge latérale du
muscle *longissimus*,
immédiatement caudal à la 13^{ème} vertèbre

7

Test de contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs

- Levez délicatement la patte du chien et massez du pied vers le coude (ou le genou)
- Mettez en place le brassard à la mi-radius (ou mi-tibia) et gonflez jusqu'à 200 mmHg
- **Encouragez le chien à marcher dans la pièce durant 2 minutes**
- Répétez le test du senseur mécanique Wagner au site de douleur primaire (#5.B)

Mesure 1 (brassard gonflé) _____

Mesure 2 (brassard gonflé) _____

Mesure 3 (brassard dégonflé) _____

Mesure 4 (brassard dégonflé) _____

Laissez 10 secondes entre les mesures.

Les 2 premières mesures sont prises avec le brassard gonflé.

Les 2 dernières mesures sont prises immédiatement après dégonflement.

8

- Déterminez la source anatomique de la douleur cancéreuse (choix multiples possibles)

- | | |
|--|------------------------------------|
| ☐ Somatique superficielle | ☐ Viscérale |
| ☐ Somatique profonde | |
| ☐ Somatique osseuse | |

9

- Déterminez le mécanisme de la douleur associée au cancer en fonction de vos évaluations précédentes

- ☐ Inflammatoire (réponse positive à *calor, dolor, rubor* et/ou *tumor*)
- ☐ Neuropathique (présence de sensibilité mécanique, soit pointue, soit dynamique)
- ☐ Squelettique (avec la source anatomique)
- ☐ Articulaire
- ☐ Combinaison de différents mécanismes. Veuillez décrire
- ☐ Autre. Veuillez décrire

10

Durée de la douleur cancéreuse

- Caractérisez la durée de la douleur associée au cancer

- ☐ Aiguë (moins de 48 heures)
- ☐ Sous-aiguë (2-7 jours)
- ☐ Chronique (plus de 1 semaine)

11

Conditions douloureuses simultanées

- Décrire la présence d'un historique ou un diagnostic de maladies chroniques douloureuses (autres que la douleur du cancer) tel que : arthrose, dégénérescence du disque intervertébral, otite, maladie dentaire, etc.

Si possible, décrivez la gravité et la durée approximative des signes cliniques.

12

Type de douleur non cancéreuse

- Selon l'état douloureux et les évaluations ci-dessus, classez la douleur non cancéreuse (choix multiples possibles)

- | | |
|--|--|
| ☐ Neuropathique | ☐ Somatique superficielle |
| ☐ Orthopédique | ☐ Somatique profonde |
| ☐ Inflammatoire | ☐ Somatique osseuse |
| ☐ Viscérale | |

13

Durée de la douleur non cancéreuse

- Caractérisation de la douleur non cancéreuse

- | |
|--|
| ☐ Aiguë (moins de 48 heures) |
| ☐ Sous-aiguë (2-7 jours) |
| ☐ Chronique (plus de 1 semaine) |

14

Signature

Évaluateur : _____ Signature : _____

Date : _____



Université 
de Montréal