

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 1 von 38		



BERUFSFEUERWEHR
STETTBECK

Berufsfeuerwehr Stettbeck
Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst

Stand: 15.03.2023

Erläuterung – Ampelsystem

Das Ampelsystem erläutert den Erwartungshorizont hinsichtlich für Notfallsanitäter freigegebene Maßnahmen. Hierbei sind die Bedeutungen wie folgt:

Grün	Die Maßnahme darf in jedem Fall selbständig unter Eigenverantwortung durch den Notfallsanitäter durchgeführt werden.
Gelb	Die Maßnahme sollte durch einen Notfallsanitäter durchgeführt werden können, dies wird aber nicht in jedem Fall erwartet.
Rot	Die Maßnahme sollte dem Notfallsanitäter bekannt sein, sie wird aber nicht von ihm erwartet. Dies stellt meist reine Notarzt-Freigaben dar.

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 3 von 38		

Inhalt

Acetylsalicylsäure	5
Amiodaron	6
Atropin	7
Butylscopolamin	8
Cafedrin-Theodrenalin	9
Dimenhydrinat	10
Dimentinden	11
Epinephrin	12
Esketamin	13
Fentanyl (BTM)	14
Flumazenil	15
Furosemid	16
Glukose	17
Heparin	18
Ipratropiumbromid	19
Lorazepam	20
Metamizol	21
Metoprolol	22
Midazolam	23
Morphin (BTM)	24
Naloxon	25

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 4 von 38		

Nitroglycerin	26
Ondansetron.....	27
Piritramid (BTM)	28
Paracetamol.....	29
Prednisolon.....	30
Propofol	31
Reproterol.....	32
Rocuroniumbromid	33
Salbutamol.....	34
Suxamethoniumchlorid	35
Tranexamsäure	36
Urapidil	37
Vollelektrolytlösung.....	38

Acetylsalicylsäure

ASS[®], Aspirin[®]

	Indikation	Akutes Koronarsyndrom (ACS / AKS)		
	Kontraindikation	Erhöhte Blutungsneigung, Leber- und Nierenversagen, Überempfindlichkeit/Allergisches Asthma		
	Nebenwirkungen	Gastrointestinale Beschwerden, Lokale Gewebereaktionen, Blutungen, Anaphylaktische Reaktion		
	Bemerkungen/Hinweise	Bei Schwangerschaft/Stillzeit ab drittem Trimester kontraindiziert.		
	Dosierung (max.)	250mg (500mg) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Amiodaron

	Indikation	Reanimation , Lebensbedrohliche Tachykardie		
	Kontraindikation	Bei Reanimation: Keine , Hypotonie, QT-Verlängerung, Hypokaliämie, Jodallergie, Schilddrüsenerkrankungen, Überempfindlichkeit, bekannte Vormedikation		
	Nebenwirkungen	Sinusbradykardie, EKG-Veränderungen, Hypotonie, Übelkeit, Erbrechen, Flush (Hautrötung)		
	Bemerkungen/Hinweise	Kurzinfusion über 20 Minuten laufen lassen.		
	Dosierung (<i>max.</i>)	Nach dritter Defibrillation 300mg i.v. und ab 5. Defibrillation erneut 150mg. Bei Tachykardie als KI mit Glucose 5%.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Atropin

	Indikation	Bradykardie		
	Kontraindikation	Im Notfall: Keine , Tachykardie, Engwinkelglaukom, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Tachykardie, Mydriasis, Störung der Nah- und Fernwahrnehmung, Mundtrockenheit		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Alles < 0,5mg führt häufig zu paradoxen Reaktionen.		
	Dosierung (max.)	0,5mg (3mg) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Butylscopolamin

Buscopan®

	Indikation	Koliken		
	Kontraindikation	Ileus, Tachykardie/Tachyarrhythmie, Engwinkelglaukom, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Tachykardie, Hypotonie, Störung der Nah- und Fernwahrnehmung, Schwindel, Mundtrockenheit		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Sollte in Verbindung mit einem Analgetikum verabreicht werden.		
	Dosierung (max.)	20 - 40mg (100mg) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Cafedrin-Theodrenalin

Akrinor®

	Indikation	Hypotonie		
	Kontraindikation	Hypertonie, AP-Beschwerden, Herzrhythmusstörungen, Engwinkelglaukom, Mitralstenose, Schilddrüsenfunktionsstörung		
	Nebenwirkungen	AP-Beschwerden, Herzklopfen		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Erhöhte Vorsicht bei Patienten mit Asthma bronchiale.		
	Dosierung (max.)	½ - 1 Ampulle i.v.		
	Freigabe	Notarzt	Ampel	

Dimenhydrinat

Vomex A®

	Indikation	Übelkeit, Erbrechen		
	Kontraindikation	Akuter Asthmaanfall, Engwinkelglaukom, Krampfanfälle/bekannte Krampfleiden, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Vigilanzminderung, Schwindel, Tachykardie, Mundtrockenheit, Mydriasis, Sehstörungen, Hautausschläge		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Verlängerte QT-Dauer im EKG-Monitoring; Zu beachten bei Patienten mit Long-QT-Syndrom.		
	Dosierung (max.)	62mg i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Dimentinden

Fenistil®

	Indikation	Anaphylaxie		
	Kontraindikation	Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Somnolenz, Wärmegefühl, Mundtrockenheit, Übelkeit		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	4mg i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 12 von 38		

Epinephrin

Adrenalin®

	Indikation	Reanimation , Anaphylaxie, Bradykardie		
	Kontraindikation	Bei Reanimation: Keine , Tachykardie Herzhirhythmusstörungen		
	Nebenwirkungen	Rhythmusstörungen, Tachykardie, Muskeltremor, BZ-Anstieg, Mydriasis		
	Bemerkungen/Hinweise	Bei Reanimation alle 4 Minuten repetieren (erneut verabreichen). Bei Bradykardie ist insofern verfügbar ein Notarzt zur Einsatzstelle hinzuzuziehen.		
	Dosierung (max.)	Bei Reanimation 1mg i.v. Bei Anaphylaxie 0,5mg i.m. oder 2 – 4mg vernebelt. Bei Bradykardie 2 - 10µg i.v.		
	Freigabe	Rettungssanitäter	Ampel	

Esketamin

Ketanest S®

	Indikation	Analgesie, Narkoseeinleitung		
	Kontraindikation	Hypertensive Entgleisung, Apoplex, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Halluzinationen, Alpträume, Aufwachreaktionen, Tonisch-klonische Kontraindikation, Sehstörungen, Hypertonie, Tachykardie, Übelkeit, Erbrechen, Hirndrucksteigerung mit mangelhafter Oxygenierung, Hyperakusis, Atemdepression		
	Bemerkungen/Hinweise	Zur Narkoseeinleitung ist ein Notarzt zwingend erforderlich.		
	Dosierung (max.)	Zur Analgesie 0,125 – 0,25mg/kg KG i.v. oder 0,25-0,5mg/kg KG i.m. oder 1,5 – 2,5mg/kg KG i.n. Zur Narkoseeinleitung 0,5 – 1mg/kg KG (2,5mg/kg KG) i.v. oder 4 – 8mg/kg KG i.m.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Fentanyl (BTM)

	Indikation	Analgesie, Narkose		
	Kontraindikation	Erkrankungen, welche das Atemzentrum betreffen, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Atemdepression, Sedierung, Bradykardie, Hypotonie, Miosis, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen		
	Bemerkungen/Hinweise	100-fach potenter als Morphin. Zur Narkose ist ein Notarzt zwingend erforderlich.		
	Dosierung (max.)	Zur Analgesie 50µg i.v. Zur Narkose 1 - 5µg/kg KG i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Flumazenil

Anexate®

	Indikation	Benzodiazepin-Intoxikation		
	Kontraindikation	Im Notfall: Keine, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Übelkeit, Erbrechen, ZNS-Störungen, Kopfschmerz, Schwindel, Hypotonie, Allergische Reaktionen, Entzugssymptomatik		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Halbwertszeit ist kürzer als die der Benzodiazepine. Achtung! Rebound-Effekt.		
	Dosierung (max.)	0,2mg (1mg) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Furosemid

Lasix®

	Indikation	Lungenödem, akute Herzinsuffizienz		
	Kontraindikation	Exsikkose, Hypovolämie		
	Nebenwirkungen	Elektrolytstörung, Hypovolämie, Hypotonie mit Kreislaufbeschwerden, BZ-Anstieg		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Langsam titriert geben. Maximal 4mg die Minute. Frühestens nach 15 Minuten repetieren.		
	Dosierung (max.)	20mg (40mg) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Glukose

	Indikation	Hypoglykämie
	Kontraindikation	Hyperglykämie
	Nebenwirkungen	Venenreizung, Nekrosen bei paravenöser Injektion
	Bemerkungen/Hinweise	Bei schwerer Hypoglykämie ist sofern verfügbar ein Notarzt zur Einsatzstelle hinzuzuziehen. CAVE: Orale Gabe nur bei wachen Patienten – Aspirationsgefahr!
	Dosierung (max.)	5% Lösung / 250ml i.v. als Infusion. 20% Lösung / 100ml i.v. als Infusion. 40% Lösung / 10 ml i.v. oder p.o.
	Freigabe	Rettungssanitäter Ampel

Heparin

Liquemin®

	Indikation	Akutes Koronarsyndrom (ACS / AKS), Lungenarterienembolie		
	Kontraindikation	Unverträglichkeit/Allergie, V.a. akute Blutung, V.a. akuten Apoplex, V.a. akute Aortendissektion		
	Nebenwirkungen	Blutungsneigung		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	5.000IE / ml (25.000IE / ml) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Ipratropiumbromid

Atrovent®

	Indikation	Bronchoobstruktive Zustände, Asthma bronchiale, COPD, Anaphylaxie mit Bronchoobstruktion, Linksherzinsuffizienz, kardiales Lungenödem		
	Kontraindikation	Tachykardie, Tachyarrhythmie, Unverträglichkeit/Allergie		
	Nebenwirkungen	Tremor, Tachykardie, Extrasystole, Unruhe, Schwindel		
	Bemerkungen/Hinweise	Meist in Kombination mit Salbutamol zu verabreichen.		
	Dosierung (max.)	250µg / 2ml vernebelt		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Lorazepam

Tavor[®], Tavor expidet[®]

	Indikation	Starker Erregungszustand		
	Kontraindikation	Unverträglichkeit/Allergie		
	Nebenwirkungen	Atemdepression, unerwünschte Schlafförderung und Beruhigung, Amnesie		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Paradoxe Wirkung insbesondere bei älteren Patienten möglich.		
	Dosierung (max.)	1mg p.o.		
	Freigabe	Notarzt	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 21 von 38		

Metamizol

Novalgin[®], Novalminsulfon[®]

	Indikation	Kolik-artige Schmerzen		
	Kontraindikation	Hypotonie, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Hypotonie, Anaphylaktische Reaktion, Lokale Gewebereaktion an der Injektionsstelle		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Zur adäquaten Analgesie in Kombination mit Butylscopolamin verwenden.		
	Dosierung (max.)	1g als KI i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Metoprolol

Beloc®

	Indikation	Tachykardie Herzrhythmusstörungen		
	Kontraindikation	Herzinsuffizienz, Schock, Hypotonie, Asthma bronchiale, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Bradykardie, Hypotonie, Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Gastrointestinale Beschwerden, Kältegefühl, Dyspnoe, Bronchospasmus, Tremor		
	Bemerkungen/Hinweise	Repetieren alle 10 Minuten. CAVE: Bei zwingender Notfallindikation gibt es bei Schwangerschaft keine Alternativen.		
	Dosierung (max.)	5mg (15mg) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Midazolam

Dormicum[®], Bucculam[®]

	Indikation	Anhaltender Krampfanfall		
	Kontraindikation	Unverträglichkeit/Allergie		
	Nebenwirkungen	Atemdepression, Unerwünschte Schlafförderung und Beruhigung, Amnesie		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Paradoxe Wirkung insbesondere bei älteren Patienten möglich.		
	Dosierung (max.)	5mg / 5ml (15mg / 3ml) i.v./i.n.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 24 von 38		

Morphin (BTM)

Morphin Merck®, MSI®

	Indikation	Starke Schmerzen, kardialer Schmerz, Traumatischer Schmerz mit Kontraindikation für Esketamin		
	Kontraindikation	Unverträglichkeit/Allergie, GCS < 14, Respiratorische Insuffizienz, Bradykardie, Schwangerschaft/Stillzeit		
	Nebenwirkungen	Atemdepression, Sedierung bis Somnolenz, Übelkeit, Erbrechen, Miosis, Bradykardie, Hypotonie		
	Bemerkungen/Hinweise	Langsame Applikation kann Nebenwirkungen verringern. Gabe von 2-10mg fraktioniert.		
	Dosierung (max.)	10mg / ml i.v.		
	Freigabe	Notarzt	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 25 von 38		

Naloxon

Narcanti®

	Indikation	Opiatüberdosierung		
	Kontraindikation	Im Notfall: Keine , Unverträglichkeit/Allergie		
	Nebenwirkungen	Hypertonie, Tachykardie, Entzugerscheinungen, Unruhe, Krampfanfälle		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	0,4mg i.v. oder 0,8mg i.m. oder 2mg i.n.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 26 von 38		

Nitroglycerin

Nitrolingual®

	Indikation	Myokardinfarkt, Linksherzinsuffizienz, kardiales Lungenödem		
	Kontraindikation	Kardiogener Schock, Hypotonie, Rechtsherzinsuffizienz/-infarkt, Apoplex, Überempfindlichkeit, Einnahme von Viagra innerhalb der letzten 24 Std.		
	Nebenwirkungen	Kollaps, Flush (Hautrötung), Kopfschmerz, Verstärkung der Beschwerden		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Vor Gabe zwingend i.-v.-Zugang legen.		
	Dosierung (max.)	1 Hub á 0,4mg sublingual		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Ondansetron

	Indikation	Opiatinduzierte Übelkeit, Chemotherapieassoziierte Übelkeit, Massive Übelkeit/Erbrechen		
	Kontraindikation	Unverträglichkeit/Allergie, Schwangerschaft/Stillzeit, bekanntes Long-QT-Syndrom		
	Nebenwirkungen	Flush (Hautrötung), Hypotonie, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Dyskinesien, QT-Zeit-Verlängerungen		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	4mg / 2ml i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Piritramid (**BTM**)

Dipidolor®

	Indikation	Analgesie		
	Kontraindikation	Vigilanzminderung, Überempfindlichkeit, Atemantriebs/-funktionsstörungen, Schwangerschaft/Stillzeit		
	Nebenwirkungen	Atemdepression, Übelkeit, Erbrechen, Tachykardie, Hypotonie		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Kann Kolikschmerzen intensivieren.		
	Dosierung (max.)	7,5mg (15mg) i.v. oder 15mg (30mg) i.m.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Paracetamol

	Indikation	Hyperthermie		
	Kontraindikation	Unverträglichkeit/Allergie, Maximaldosis von 3g in den letzten 24 Std, schwere Lebererkrankungen		
	Nebenwirkungen	Anaphylaxie		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	1g als KI i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 30 von 38		

Prednisolon

	Indikation	Bronchoobstruktive Zustände, Anaphylaxie		
	Kontraindikation	Keine		
	Nebenwirkungen	Keine		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	50 – 100mg (250mg) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 31 von 38		

Propofol

	Indikation	Narkoseeinleitung		
	Kontraindikation	Kreislaufinsuffizienz, Hypovolämie		
	Nebenwirkungen	Atemdepression, Blutdruckabfall, Reduzierung des Herzzeitvolumens, Allergische Reaktionen, Erregungsphänomene		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	Zur Narkoseeinleitung 1mg/kg KG i.v. Zur Aufrechterhaltung der Narkose 1 – 5mg/kg KG i.v. pro Stunde		
	Freigabe	Notarzt	Ampel	

Reproterol

	Indikation	Bronchoobstruktive Zustände		
	Kontraindikation	Tachykardie, Tachyarrhythmie, Schock, schwere Niereninsuffizienz		
	Nebenwirkungen	Kopfschmerzen, Unruhe, Herzklopfen, Tremor		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	0,09mg / ml i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 33 von 38		

Rocuroniumbromid

Rocuronium®

	Indikation	Narkoseeinleitung		
	Kontraindikation	Im Notfall: Keine, Überempfindlichkeit		
	Nebenwirkungen	Anaphylaxie, Mundtrockenheit, Tachykardie		
	Bemerkungen/Hinweise	CAVE: Wirkungsverstärkung bei Antibiotika, Diuretika und Calciumkanalblocker.		
	Dosierung (max.)	0,5mg/kg KG i.v.		
	Freigabe	Notarzt	Ampel	

Salbutamol

Sultanol®

	Indikation	siehe Ipratropiumbromid		
	Kontraindikation	Tachykardie, Tachyarrhythmie, Überdosierung mit β^2 -Sympathomimetika, Unverträglichkeit/Allergie		
	Nebenwirkungen	Tremor, Tachykardie, Extrasystole, Unruhe, Schwindel, Hypokaliämie		
	Bemerkungen/Hinweise	Meist in Kombination mit Ipratropiumbromid zu verabreichen.		
	Dosierung (max.)	1,25mg (5mg) vernebelt		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 35 von 38		

Suxamethoniumchlorid

Succinylcholin®

	Indikation	Narkoseeinleitung		
	Kontraindikation	Hyperkaliämie, bekannte Sepsis, Unverträglichkeit, Beeinträchtigung der oberen Nervenbahnen, Verbrennungen		
	Nebenwirkungen	Arrhythmien, Bradykardie, Muskelzuckungen, Allergische Reaktionen, Nesselsucht, Erhöhung des AID, Hyper-/Hypotonie, Bronchospasmus, Hypothermie, erhöhter Speichelfluss		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	1 – 1,5mg/kg KG i.v.		
	Freigabe	Notarzt	Ampel	

Tranexamsäure

	Indikation	Lebensbedrohliche äußere oder innere Blutung <u>mit</u> hämorrhagischem Schock		
	Kontraindikation	Unverträglichkeit/Allergie, akute Thrombosen/Embolien, Zeitpunkt des Traumas mehr als 3 Stunden zurückliegend		
	Nebenwirkungen	Übelkeit, Erbrechen, Hypotonie, Thromboembolien, Sehstörungen, Krampfanfälle		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	1g / 10ml als KI i.v.		
	Freigabe	Notarzt	Ampel	

Version 1.0 / 03.2022	Freigegebene Medikamente für den Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Stettbeck	
Seite Seite 37 von 38		

Urapidil

Ebrantil®

	Indikation	Hypertensiver Notfall / Entgleisung		
	Kontraindikation	Unverträglichkeit/Allergie		
	Nebenwirkungen	Kopfschmerzen, Schwindel, übermäßiger RR-Abfall, Hitzegefühl, Übelkeit, Erbrechen, Arrhythmien		
	Bemerkungen/Hinweise	Dosierung kann alle 3 Minuten nach RR-Kontrolle bis zu 50mg gesteigert werden. Bei V.a. Apoplex sollte der RR auf einen Zielwert von 180/100mmHg gesenkt werden. CAVE: Maximale RR-Senkung von 25% des Ausgangswertes sollte im Regelfall nicht überschritten werden. CAVE: Wirkung stark verstärkt bei Einnahme anderer Antihypertonika.		
	Dosierung (max.)	5 – 10mg (50mg) i.v.		
	Freigabe	Notfallsanitäter	Ampel	

Vollelektrolytlösung

VEL[®], Jonosteril[®]

	Indikation	Volumensubstitution		
	Kontraindikation	Starke Blutung, Herzinsuffizienz, Lungenödem		
	Nebenwirkungen	Bronchospasmen		
	Bemerkungen/Hinweise			
	Dosierung (max.)	250ml (1000ml) i.v.		
	Freigabe	Rettungssanitäter	Ampel	