Teoria di Probabilità

Andrea Bonifacio

December 19, 2021

1 Definizione assiomatica di probabilità

Lo studio della probabilità si basa su assiomi e definizioni.
Alcuni concetti fondamentali sono: gli *eventi*, rappresentati come insiemi di oggetti, le *σ-algebre*, collezioni (insiemi di insiemi) di eventi e la *probabilità*, funzione che associa ad ogni evento un grado di fiducia da 0 a 1.

1.1 Eventi matematici

Definizione 1.1
Un esperimento aleatorio è un'osservazione nel mondo reale il cui risultato non è noto a priori e nemmeno deterministico, ma influenzato dal caso.

Definizione 1.2
Lo spazio campionario Ω rappresenta l'insieme degli esiti elementari possibili ω di un singolo esperimento aleatorio. Non è definito univocamente dall'esperimento.

Definizione 1.3
È detto evento un fatto a cui si può attribuire un grado di verità (vero o falso) al termine dell'esperimento. L'evento matematico A rispetto a un evento dato è l'insieme degli esiti ω in cui l'evento è verificato.

Esempi:

- Numero primo a tombola $\leftrightsquigarrow$ $A = \{2, 3, 5, \ldots, 89\} \subseteq \Omega = \{1, \ldots, 90\}$.
- Numeri uguali dal lancio di due dadi $\leftrightsquigarrow$ $A = \{(1, 1), (2, 2), \ldots\} \subseteq \Omega = \{1, \ldots, 6\}^2$.

Vi sono varie operazioni con gli eventi:

- $\varnothing$: rappresenta l'evento impossibile;
- Ω: rappresenta l'evento certo;
- A^C: evento contrario ad A;
- $A \cup B$: evento A *oppure* evento B;
- $A \cap B$: evento A *ed* evento B;
- $A \cap B = 0$: eventi *incompatibili*;
- $A \subseteq B$: A *implica* B;

Definizione 1.4
L'insieme delle parti di Ω si dice 2^Ω la collezione di tutti i sottoinsiemi di Ω inclusi Ω e $\varnothing$.

1.2 Algebre e σ-algebre

Definizione 1.5
$\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$ si dice **algebra** se:

1. $\varnothing \in \mathcal{A}, \Omega \in \mathcal{A}$
2. $A \in \mathcal{A} \Longrightarrow A^C \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ è chiusa per complementazione)

3. $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{A} \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{A}_i \in \mathcal{A}, \bigcap_{i=1}^{n} \mathcal{A}_i \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ è chiusa per unioni e intersezioni finite)

Definizione 1.6
$\mathcal{A} \subseteq 2^{\Omega}$ si dice **σ-algebra** se:

1. $\varnothing \in \mathcal{A}, \Omega \in \mathcal{A}$
2. $A \in \mathcal{A} \Longrightarrow A^C \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ è chiusa per complementazione)
3. $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{A} \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^{+\infty} \mathcal{A}_i \in \mathcal{A}, \bigcap_{i=1}^{+\infty} \mathcal{A}_i \in \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ è chiusa per unioni e intersezioni numerabili)

Alcune σ-algebre notevoli sono:

- $\mathcal{A} = \{\varnothing, \Omega\}$: la σ-algebra più piccola.
- $\mathcal{A} = \{2^{\Omega}$: la σ-algebra più grande.
- $\mathcal{A} = \{\varnothing, \Omega, A, A^C\}$: una generica σ-algebra.

Definizione 1.7
Siano Ω spazio campionario e $\mathcal{A}$ σ-algebra su Ω, la coppia $(\Omega, \mathcal{A})$ è definita uno spazio misurabile.

Definizione 1.8
Data la classe $\mathcal{C} \subseteq 2^{\Omega}$, si dice σ-algebra generata da $\mathcal{C}$ e si scrive $\sigma(\mathcal{C})$ la più piccola σ-algebra contenente $\mathcal{C}$.

Proposizione 1.1
$\sigma(\mathcal{C})$ è ben definita $\forall \mathcal{C}$

Dimostrazione. 1. Considerando la σ-algebra delle parti 2^{Ω}, per ipotesi $2^C \supseteq \mathcal{C}$. Dunque esiste almeno una σ-algebra $\mathcal{A} \supseteq \mathcal{C}$.

2. Ne esiste una più piccola di tutte?
Sia $\mathcal{A}_\alpha$ una famiglia di σ-algebre e $\mathcal{A} = \bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$ (con α finito o infinito). $\mathcal{A}$ è una σ-algebra, infatti:

   (a) $\bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$ contiene Ω e $\varnothing$: $\varnothing \in \mathcal{A}_\alpha \, \forall \alpha$ e dunque $\varnothing \in \bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$. Analogamente si può dimostrare l'appartenenza di Ω

   (b) $\bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$ è chiusa per complementazione: sia $A \in \bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$. Dunque $A \in \mathcal{A}_\alpha \forall \, \alpha$ Ciò avviene se e solo se $A^C \in \mathcal{A}_\alpha \, \forall \alpha$, essendo $\mathcal{A}_\alpha$ una σ-algebra. Dunque $A \in \mathcal{A}_\alpha \, \forall \alpha$. Ma allora $A^C \in \bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$

   (c) $\bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$ è chiusa per unioni e intersezioni numerabili:

$$\begin{aligned} A_k \in \bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha \, \forall k \in \mathbb{N} \quad &\Longleftrightarrow \quad A_k \in \mathcal{A}_\alpha \, \forall k \in \mathbb{N}, \forall \alpha \\ &\Longrightarrow \quad \bigcup_{k} A_k \in \mathcal{A}_\alpha \, \forall \alpha \\ &\Longrightarrow \quad \left(\bigcup_{k} A_k \right) \in \bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha \end{aligned}$$

Allora $\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\mathcal{A} \supseteq \mathcal{C}} \mathcal{A}$. ★

Teorema 1.1
Se $A_n \in \mathcal{A} \, \forall n \in \mathbb{N}$ allora:

$$\limsup A_n \in \mathcal{A} \quad \text{e} \quad \liminf A_n \in \mathcal{A}$$

Proposizione 1.2
$\mathcal{A}$ σ-algebra su $\Omega \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{A}$ algebra su Ω.

Dimostrazione. Siano $A_1, \dots, A_n$ eventi appartenenti alla σ-algebra $\mathcal{A}$.
Definito $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = A_n$, si ha che:

$$\bigcap_{k=1}^{n} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A} \text{ e } \bigcup_{k=1}^{n} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}$$

★

Definizione 1.9
Sia $\Omega = \mathbb{R}$. La topologia euclidea di $\mathbb{R}$ è data dalla collezione $\tau := \{A \subseteq \mathbb{R} \ : \ A$ aperto.
La **σ-algebra di Borel** è la σ-algebra generata dalla topologia euclidea di $\mathbb{R} \ : \ \mathcal{B} = \sigma(\tau)$.
I boreliani sono gli elementi di tale σ-algebra, ossia

$$B \subseteq \mathbb{R}, \ B \in \mathcal{B} \Longrightarrow B \text{ boreliano}$$

Teorema 1.2
Sia $\mathcal{B}$ la σ-algebra di Borel, allora dati $\mathcal{C} = \{(a, b) : -\infty \leq a \leq b \leq +\infty \}$ e $\tilde{\mathcal{C}} = \{(-\infty, q] : q \in \mathbb{Q}\}$, si ha

$$\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C}) = \sigma(\tilde{\mathcal{C}})$$

L'insieme $\tilde{\mathcal{C}}$ è la collezione delle semirette chiuse e limitate ad un solo estremo razionale.
Quindi $\mathcal{B}$ è un insieme più che continuo e generato da semirette di cardinalità meno che continua.

1.3 Misure di probabilità

Il grado di fiducia da 0 a 1 che un evento A si verifichi è detta probabilità $\mathbb{P}(A)$. Si tratta di una valutazione a priori.
Esistono diverse interpretazioni modellistiche al concetto di probabilità:

- **Interpretazione soggettivistica:** secondo chi calcola la probabilità, con eventi non ripetibili.
- **Interpretazione frequentista:** ripetizione degli eventi per calcolarne la frequenza

  $$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \to +\infty} f_n(A)$$

  con $f_n(A)$ frequenza relativa.
- **Estrazione da popolazioni finite non truccate:**

  $$\mathbb{P}(A) = \frac{\#\text{Casi favorevoli}}{\#\text{Casi possibili}}$$

Una definizione più rigorosa di probabilità si può ottenere da

Definizione 1.10
Dato unp spazio misurabile $(\Omega, \mathcal{A})$, una misura di probabilità è una funzione $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1]$ tale che

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\forall A_n \in \mathcal{A}$ di eventi disgiunti a coppie, ossia $A_k \cap A_l = \varnothing \ \forall k \neq l$, vale la seguente proprietà di σ-additività:
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Teorema 1.3
Sia $\mathbb{P}$ una (misura di) probabilità su $\mathcal{A}$. Allora:

1. $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$
2. Dati $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ eventi disgiunti a coppie, vale la seguente proprietà di additività:
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)$$

Dimostrazione.

1. Si crea una serie di A_n insiemi vuoti e si dimostra che la loro unione è la stessa dell'insieme vuoto.
$$\begin{aligned} A_n = \varnothing \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad &\Longrightarrow \quad A_n \in \mathcal{A},\ A_k \cap A_l = \varnothing \cap \varnothing = \varnothing \\ &\Longrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) \\ &\Longrightarrow \quad \mathbb{P}(\varnothing) = \sum_{n=1}^{+\infty} = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(\varnothing) \\ &\Longrightarrow \quad \mathbb{P}(\varnothing) = 0 \end{aligned}$$
2. Si sfrutta poi la σ-additività estendendo fino all'infinito gli A_k:
$$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \quad A_k \cap A_l = \varnothing \quad \forall k \neq l, \quad \tilde{A}_k = \begin{cases} A_k & k = 1, \dots, n \\ \varnothing & k > n \end{cases}$$
$$\begin{aligned} &\Longrightarrow \quad \tilde{A}_k \cap \tilde{A}_l = \varnothing \qquad \forall k \neq l \\ &\Longrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} \tilde{A}_k\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(\tilde{A}_k) \\ &\Longrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(\tilde{A}_k) + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \mathbb{P}(\tilde{A}_k) = \sum_{k=1}^{n} +0 \\ &\Longrightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k) \end{aligned}$$

★

Si può scrivere $\mathbb{P}(A \cap B)$ come $\mathbb{P}(A, B)$.

Corollario 1.1

- Dati $A, A' \in \mathcal{A}$ si ha che $A \subseteq A' \Longrightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(A')$
- $A \in \mathcal{A} \Longrightarrow \mathbb{P}(A^C) = 1 - \mathbb{P}(A)$, dove 1 è $\mathbb{P}(\Omega)$
- $A, B \in \mathcal{A} \Longrightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A, B)$

1.4 Successioni di eventi

Definizione 1.11
Dato $A_n \in \mathcal{A}\ \forall n$:

- $A_n \uparrow A$ significa che A_n è una successione di eventi crescente verso A:

$$A_n \subseteq A_{n+1}, \quad \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = A$$

- $A_n \downarrow A$ significa che A_n è una successione di eventi decrescente verso A:

$$A_n \supseteq A_{n+1}, \quad \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n = A$$

In entrambi i casi A è l'insieme limite della successione.

Teorema 1.4
Siano $(\Omega, \mathcal{A})$ uno spazio misurabile e $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1]$ una funzione additiva tale che $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Le seguenti affermazioni sono allora equivalenti:

1. $\mathbb{P}$ è σ-additiva (ovvero $\mathbb{P}$ è una probabilità)
2. $A_n \in \mathcal{A},\ A_n \downarrow \varnothing \Longrightarrow \mathbb{P}(A_n) \downarrow 0$
3. $A_n \in \mathcal{A},\ A_n \downarrow A \Longrightarrow \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A)$
4. $A_n \in \mathcal{A},\ A_n \uparrow \Omega \Longrightarrow \mathbb{P}(A_n) \uparrow 1$
5. $A_n \in \mathcal{A},\ A_n \uparrow A \Longrightarrow \mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$

Dai punti (3) e (5) si deduce lo scambio di limiti $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\lim_n A_n) = \lim_n \mathbb{P}(A_n)$

Dimostrazione. La dimostrazione si divide in quattro parti:

(a) casi ovvi

(b) (4) $\Longrightarrow$ (5)

(c) (5) $\Longrightarrow$ (1)

(d) (1) $\Longrightarrow$ (5)

(a)
- (3) $\Longleftrightarrow$ (5) per le leggi di De Morgan (complementarità)
- (2) $\Longleftrightarrow$ (4) per le leggi di De Morgan (complementarità)
- (3) $\Longrightarrow$ (2) e (5) $\Longrightarrow$ (4) perché sono casi particolari

(b) (4) $\Longrightarrow$ (5). Siano $A_n \in \mathcal{A}$ tali che $A_n \uparrow A$. Definita $B_n = A_n \cup A^C$. $B_{n+1} \supseteq B_n$. Allora $B_n \uparrow \Omega$ e dunque $\mathbb{P}(B_n) \to 1$. Inoltre vale

$$\bigcup_n B_n = \bigcup_n (A_n \cup A^C) = \left(\bigcup_n A_n\right) \cup A^C = A \cup A^C = \Omega$$

che si traduce in probabilità come

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_n) &= \mathbb{P}(A_n \cup A^C) \\ &= \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A^C) - \mathbb{P}(A_n \cap A^C) \\ &= \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A^C) \to \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^C) \end{aligned}$$

sottraendo da entrambi i membri $\mathbb{P}(A^C)$, si ottiene $\mathbb{P}(A_n) \to \mathbb{P}(A)$.

(c) (5) $\Longrightarrow$ (1). Siano $A_n \in \mathcal{A}$ tali che $A_k \cap A_l = \varnothing \; \forall k \neq l$. Sia $B_n = \bigcup_{k=1}^{n}$, allora

$$B_n \subseteq B_{n+1} \qquad \text{e} \qquad B_n = \bigcup_{k=1}^{n} B_k = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$$

che diventa, passando alle probabilità:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}\left(\textstyle\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) &\Longrightarrow \textstyle\sum_{k=1}^{n}(\mathbb{P}(A_k)) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) \\ &\Longrightarrow \textstyle\sum_{k=1}^{+\infty}(\mathbb{P}(A_k)) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right) \end{aligned}$$

(d) (1) $\Longrightarrow$ (5). Siano $A_n \uparrow A,\ A_n \in \mathcal{A}$. Sia la successione B_n definita come

$$\begin{cases} B_1 = A_1 \\ B_2 = A_2 \backslash A_1 = A_2 \cap A_1^C \\ \dots \\ B_n = A_n \backslash A_{n-1} \end{cases}$$

dal momento che $A_n \uparrow A$, allora i B_n risultano disgiunti e si può sfruttare la σ-additività, ripetendo la procedura del punto precedente

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B_n)$$

★

Proposizione 1.3
Data una successione numerabile di eventi $A_n \in \mathcal{A}\ \forall n$, vale la seguente disuguaglianza

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty}\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

1.5 Probabilità su spazi campionari discreti

Teorema 1.5 (Probabilità su spazi discreti)
Sia Ω uno spazio discreto, ossia con cardinalità al più numerabile, allora

1. $\mathbb{P}$ su $(\Omega, 2^\Omega)$ è caratterizzata dai valori sugli atomi, cioè

$$p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\}),\ \omega \in \Omega; \quad \text{infatti } \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A}(p_\omega) \quad \text{con } p : \Omega \to [0,1]$$

2. Sia $p : \Omega \to [0,1]$, allora

$$\exists! \mathbb{P} : 2^\Omega \to [0,1] : \mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega \Longleftrightarrow \begin{cases} p_\omega \geq 0 & \forall \omega \\ \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1 \end{cases}$$

Dimostrazione. 1. siano $\mathbb{P} : (2^\Omega) \to [0,1]$ e $A \in 2^\Omega, A \subseteq \Omega$.
Allora $A = \bigcup_{x \in A}\{x\}$ e, essendo gli atomi eventi disgiunti, per la σ-additività vale che

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{x \in A}\{x\}\right) = \sum_{x \in A} \mathbb{P}(\{x\}) = \sum_{x \in A} p_\omega$$

2. per ipotesi $\exists! \mathbb{P} : 2^\Omega \to [0,1]$; allora si può porre $p_\omega = \mathbb{P}\{\omega\} \in [0,1]$. Inoltre

$$\sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = \sum_{\omega\in\Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\omega\in\Omega}\{\omega\}\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

Inoltre, sia $\mathbb{P} : \Omega \to \mathbb{R}$ tale che $p_\omega \geq 0$ e $\sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = 1$

Posto inoltre $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega\in\Omega} p_\omega$, allora $p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\})$ e si mostra che $\mathbb{P}$ è una probabilità:

- $\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = 1$
- $\mathbb{P}$ è σ-additiva, infatti, dati $A_k \in 2^\Omega,\ k \in \mathbb{N},\ A_k \cap A_l = \varnothing\ \forall k \neq l$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right) = \sum_{\omega\in\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k} p_\omega = \sum_{k=1}^{+\infty}\left[\sum_{\omega\in A_k} p_\Omega\right] = \sum_{k=1}^{+\infty}\mathbb{P}(A_k)$$

Allora $\exists! \mathbb{P} : 2^\Omega \to [0,1]$ tale che $\mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$

★

Definizione 1.12
Siano $(\Omega, \mathcal{A})$ uno spazio misurabile e $\mathbb{P}$ una probabilità su $\mathcal{A}$, allora la tripletta $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ è definita spazio di probabilità.

Definizione 1.13
Sia dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, sia l'evento $A \in \mathcal{A}$. Se $\mathbb{P}(A) = 0$, allora l'evento A è detto improbabile, mentre se $\mathbb{P}(A) = 1$, allora A è detto evento quasi certo.

2 Probabilità condizionata e indipendenza

2.1 Probabilità condizionata

Definizione 2.1
Sia $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, $A, B \in \mathcal{A}$ con $\mathbb{P}(B) > 0$. Si parla allora di probabilità di A condizionata da B come:

$$\mathbb{P}(A|B) := \frac{\mathbb{P}(A,B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Ci sono sempre varie interpretazioni della probabilità condizionata

- Interpretazione soggettivistica, ossia considerando a priori tutto Ω. Uno punto interno può essere compreso in $A,\ B,\ A \cap B,\ (A \cup B)^C$.

$$\mathbb{P}(A) = f_r(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(B) = f_r(B) = \frac{\#B}{\#\Omega}$$

nel caso si verificasse B durante l'esperimento, allora B andreabbe a 'sostituire' Ω nel valore della probabilità di A.

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\#(A\cap B)}{\#B} = \frac{\#(A\cap B)}{\#\Omega}\cdot\frac{\#\Omega}{\#B} = \frac{\mathbb{P}(A,B)}{\mathbb{P}(B)}$$

- Interpretazione frequentista, ossia ripetendo n volte l'esperimento ($n \to \infty$)

$$\mathbb{P}(A|B) \approx \frac{f_r(A,B)}{f_r(B)} = \frac{\mathbb{P}(A,B)}{\mathbb{P}(B)}$$

  difatti con le frequenze si hanno le seguenti relazioni

$$\mathbb{P}(A) \approx f_r(A) = \frac{F(A)}{n} \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(A,B) = \frac{F(A,B)}{n}$$

2.2 Indipendenza di eventi

Definizione 2.2
Dati $A, B \in \mathcal{A}$, sono detti eventi indipendenti se $\mathbb{P}(A,B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$ e si scrive $A \perp\!\!\!\perp B$), ossia i due insiemi non si condizionano a vicenda, essendo indipendenti.

Casi degeneri ($\mathbb{P}(A) = 0$ oppure $\mathbb{P}(B) = 0$)

- A improbabile: $A \perp\!\!\!\perp B \quad \forall B \in \mathcal{A} \quad (\mathbb{P}(A) = 0)$
- A quasi certo: $A \perp\!\!\!\perp B \quad \forall B \in \mathcal{A}$. Infatti $P(B) = \mathbb{P}(B,A) + \mathbb{P}(B,A^C)$, ma $\mathbb{P}(B,A^C) = \mathbb{P}(A^C) = 0$

Pescando una carta da un mazzo di carte, si definiscono i seguenti eventi:

$$A = \{\text{esce Quadri}\} \quad \text{e} \quad B = \{\text{esce Fante}\}$$

In termini probabilistici significa che: $\Omega :$ mazzo di carte, $\#\Omega = 52$, $\mathcal{A} = 2^\Omega$. Se $\mathbb{P}$ è uniforme su $\mathcal{A}$, allora $p_\omega = \frac{1}{52}\ \forall \omega \in \Omega$. Per verificare l'indipendenza si fa

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{13}{52}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{\#B}{\#\Omega} = \frac{4}{52}, \quad \mathbb{P}(A,B) = \frac{\#(A \cap B)}{\#\Omega} = \frac{1}{52}$$
$$\implies \mathbb{P}(A,B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \implies A \perp\!\!\!\perp B$$

Teorema 2.1 (indipendenza e complementarità)
placeholder

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff A \perp\!\!\!\perp B^C \iff A^C \perp\!\!\!\perp B \iff A^C \perp\!\!\!\perp B^C$$

Dimostrazione. Dimostrando che $A \perp\!\!\!\perp B \implies A \perp\!\!\!\perp B^C$, si ottengono tutte le altre per complementarità.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A,B^C) &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A,B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^C) \end{aligned}$$

★

Definizione 2.3
Una famiglia di eventi $\{A_i\}_{i \in I}$ è detta mutuamente indipendente se, $\forall J \subseteq I$ (con J insieme finito):

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i)$$

Sia $I = \{1,2,3\}$. Gli insiemi $\{A_1, A_2, A_3\}$ sono mutuamente indipendenti se e solo se

$$\begin{cases} \mathbb{P}(A_1,A_2) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2) \\ \mathbb{P}(A_2,A_3) = \mathbb{P}(A_2) \cdot \mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_1,A_3) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_1,A_2,A_3) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2) \cdot \mathbb{P}(A_3) \end{cases}$$

La quarta proprietà non è ricavabile dalle altre e comporta che $A_1 \cap A_2 \perp\!\!\!\perp A_3$. L'indipendenza tra i singoli insiemi non garantisce la mutua indipendenza della famiglia.

2.3 Proprietà della probabilità condizionata

Teorema 2.2
Siano $B \in \mathcal{A}$ e $\mathbb{P}$ probabilità su $\mathcal{A}$, con $\mathbb{P}(B) > 0$. Allora la funzione $\mathbb{P}(\cdot|B)$ è una misura di probabilità su $\mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(\cdot|B) : \mathcal{A} \to [0,1], \qquad A \to \mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A,B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Dimostrazione. La probabilità dell'intero dominio è

$$\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega,B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$$

Va dimostrato che $\mathbb{P}(\cdot|B)$ è σ-additiva. Siano $A_n \in \mathcal{A}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad A_k \cap A_l = \varnothing, \quad \forall k \neq l$. Allora

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \middle| B\right) &= \frac{\mathbb{P}(\bigcup A_n, B)}{\mathbb{P}} = \frac{\mathbb{P}(\bigcup(A_n,B))}{\mathbb{P}} \\ &= \frac{\sum \mathbb{P}(A_n,B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n|B)\end{aligned}$$

che conferma il fatto che $\mathbb{P}$ rispetta tutte le proprietà di una probabilità. ★

Corollario 2.1
Se $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$, allora si ha

$$\mathbb{P}(A,B) = \frac{\mathbb{P}(A,B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A,B)}{\mathbb{P}(B)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B|A) \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

In tale modo si può scambiare l'ordine degli eventi, trasformando A da evento condizionato a evento condizionante.

Definizione 2.4
Siano $A_k \in \mathcal{A},\ k \in I$ con I discreto. $(A_k)_{k\in I}$ è detto partizione di Ω se

- $A_k \cap A_l = \varnothing \quad \forall k \neq l$
- $\bigcup_k A_k = \Omega$
- $\mathbb{P}(A_k) > 0 \quad \forall k$

Teorema 2.3
Siano $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, con $\mathbb{P}(A_1, \dots, A_n) > 0$. Allora si ha che

$$\mathbb{P}(A_1,\dots,A_n) = \mathbb{P}(A_n|A_1,\dots,A_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(A_{n-2}|A_1,\dots,A_{n-2}) \cdots \mathbb{P}(A_2|A_1) \cdot \mathbb{P}(A_1)$$

Dimostrazione. 1. $\mathbb{P}(A_k|A_{k-1},\dots,A_1)$ è ben definito $\forall k = 1,\dots,n$.
Infatti $A_1 \cap \dots \cap A_{k-1} \subseteq A_1 \cap \dots \cap A_n$, e allora

$$\mathbb{P}(A_1,\dots,A_{k-1}) \geq \mathbb{P})(A_1,\dots,A_n) > 0$$

2. Va ora dimostrata l'uguaglianza

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}(A_n|A_1,\dots,A_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(A_{n-1}|A_1,\dots A_{n-2}) \cdots \mathbb{P}(A_2|A_1) \cdot \mathbb{P}(A_1) \\ &= \frac{\mathbb{P}(A_n,\dots,A_1)}{\cancel{\mathbb{P}(A_{n-1},\dots,A_1)}} \cdot \frac{\cancel{\mathbb{P}(A_n-1),\dots,A_1}}{\cancel{\mathbb{P}(A_{n-2},\dots,A1)}} \cdots \frac{\cancel{\mathbb{P}(A_2|A_1)}}{\cancel{\mathbb{P}(A_1)}} \cdot \cancel{\mathbb{P}(A_1)} \\ &= \mathbb{P}(A_n,\dots,A_1)\end{aligned}$$

★

Teorema 2.4 (formula delle probabilità totali)
Siano $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, $(E_n)_n$ una partizione discreta di Ω, $A \in \mathcal{A}$. Allora

$$\mathbb{P}(A) = \sum_n \mathbb{P}(A, E_n) = \sum_n \mathbb{P}(A|E_n) \cdot \mathbb{P}(E_n)$$

Teorema 2.5
Poiché $(A \cap E_n) \cap (A \cap E_l) = \varnothing \ \forall k \neq l$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(A \cap \left(\bigcup_n E_n\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n (A \cap E_n)\right) \\ &= \sum_n \mathbb{P}(A \cap E_n) = \sum_n \mathbb{P}(A|E_n) \cdot \mathbb{P}(E_n) \end{aligned}$$

Teorema 2.6 (formula di Bayes)
Siano $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, $(E_n)_n$ una partizione discreta di Ω, $A \in \mathcal{A}$, $\mathbb{P}(A) > 0$. Allora

$$\mathbb{P}(E_k|A) = \frac{\mathbb{P}(A|E_k) \cdot \mathbb{P}(E_k)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A|E_k) \cdot \mathbb{P}(E_k)}{\sum_n \mathbb{P}(A|E_n) \cdot \mathbb{P}(E_n)}$$

La prima uguaglianza è confermata dal corollario 2.1, mentre la seconda è una conseguenza della formula delle probabilità totali.

Teorema 2.7
Sia $(A_n)_n$ una partizione discreta di Ω, e sia $\mathcal{A} = \sigma(A_n : n \in I)$ con I insieme arbitrario di indici. Allora $\exists! \mathbb{P}$ su $(\Omega, \mathcal{A})$, con $\mathbb{P}(A_n) = p_n \ \forall n \in I$, tale che $p_n \geq 0$ e $\sum_{n \in I} p_n = 1$, ossia che una misura di probabilità $\mathbb{P}$ su $(\Omega, \mathcal{A})$ è caratterizzata dai $\mathcal{P}(A_n)$ con $n \in I$.

Teorema 2.8
Siano $(A_n)_n$ e $(B_k)_k$ partizioni discrete di Ω. Siano inoltre

1. p_n tale che $p_n \geq 0 \ \forall n$ e $\sum_n p_n = 1$
2. $q_{k|n}$ tale che, $\forall n \in \mathbb{N}$ fissato, $q_{k|n} \geq 0 \ \forall k$ e $\sum_k _k|n = 1$

allora $\exists! \mathbb{P}$ su $\sigma((A_n)_n, (B_n)_n)$ tale che $\forall n, \ k \in \mathbb{N}$, si ha che

$$\mathbb{P}(A_n) = p_n \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(B_k|A_n) = q_{k|n}$$

3 Costruzione di una probabilità

3.1 Estensione di una probabilità

Definizione 3.1
La definizione di probabilità si può riformulare su una algebra e non su una σ-algebra. Allora, essendo $(\Omega, \mathcal{A})$ uno spazio misurabile e $\mathcal{A}_0 \subseteq 2^\Omega$ algebra su Ω. $\mathbb{P} : \mathcal{A}_0 \to [0, 1]$ è una probabilità se valgono le seguenti condizioni.

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\mathbb{P}$ è σ-additiva: dati $A_n \in \mathcal{A}_0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, allora

$$A_k \cap A_l = \varnothing \ \forall k \neq l, \ \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}_0 \Longrightarrow \mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mathbb{P}(A_n)$$

Teorema 3.1

Siano Ω uno spazio campionario, $\mathcal{A}_0$ una algebra su tale spazio e $\mathbb{P}_0$ una probabilità su $\mathcal{A}_0$. Allora $\exists! \mathbb{P}$ probabilità su $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{A}_0)$ che estenda $\mathbb{P}_0$, ossia

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}_0(A) \ \forall A \in \mathcal{A}_0$$

Definizione 3.2
Una collezione $\mathcal{C} \subseteq s^{\Omega}$

- è chiusa per intersezioni finite se

$$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{C} \Longrightarrow \bigcap_{k=1}^{n} A_k \in \mathcal{C}$$

- è chiusa per limiti crescenti se

$$\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}, \ A_n \uparrow A \Longrightarrow A \in \mathcal{C}$$

- è chiusa per differenze se

$$A, B \in \mathcal{C}, \ A \subseteq B \Longrightarrow B \backslash A = B \cap A^C \in \mathcal{C}$$

Teorema 3.2 (Classi monotone)
Sia $\mathcal{C} \subseteq 2^{\Omega}$ una collezione chiusa per intersezioni finite, con $\Omega \in \mathcal{C}$. Inoltre, sia $\mathcal{D} \subseteq 2^{\Omega}$ la più piccola collezione di insiemi tale che $\mathcal{D} \supseteq \mathcal{C}$, chiusa per limiti crescenti e per differenze. Allora

$$\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{C})$$

Corollario 3.1
Siano $(\Omega, \mathcal{A})$ spazio misurabile, $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ probabilità su $\mathcal{A}$ e $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ classe chiusa per intersezioni finite e tale che $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{A}$. Se $\mathbb{P}(A) = \mathbb{Q}(A); \forall A \in \mathcal{C}$, allora $\mathbb{P}(A) = \mathbb{Q}(A); \forall A \in \mathcal{A}$, ossia $\mathbb{P} = \mathbb{Q}$.

Questo garantisce l'unicità dell'estensione di una probabilità su una classe che rispetti opportune ipotesi. Se due probabilità coincidono sugli insiemi di una suddetta classe, allora coincideranno anche su tutto il dominio, essendo, di fatto, la stessa probabilità.