

# PRAKTIKUM 4

ATOME, MOLEKÜLE, KONDENSIERTE MATERIE

---

## Versuch 401: Elektronische Übergänge in Atomen

---

GRUPPE A201

PARTH GADHAVI

JAFFAR AL NAGGAR

Versuchsdurchführung 28/29. April 2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Zeemann-Effekt</b>	<b>2</b>
2.1	Theoretischer Hintergrund . . . . .	2
2.1.1	Subsection . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Franck-Hertz-Versuch</b>	<b>3</b>
3.1	Section . . . . .	3
3.1.1	Subsection . . . . .	3

# 1 Einleitung

In Versuch 401: *Elektronische Übergängen in Atomen* werden elektronische Übergänge zwischen diskreten Energieniveaus in Atomen anhand zweier experimenteller Methoden untersucht.

Im ersten Versuchsteil wird die Aufspaltung atomarer Spektrallinien im externen Magnetfeld, der *Zeemann*-Effekt, betrachtet. Anhand eines ausgewählten Übergangs im Cadmium(Cd)-Atom ( $5^1D_2 \rightarrow 5^1P_1$ ) wird die Abhängigkeit der Linienaufspaltung von der Magnetfeldstärke sowie die Polarisations-eigenschaften der emmittierten Strahlung untersucht. Zur hochauflösenden Darstellung werden ein Fabry-Pérot-Etalon und eine CCD-Kamera verwendet.

Im Rahmen der Auswertung werden das *Bohrsche-Magneton* sowie die Finesse und das Auflösungsvermögen des Etalons bestimmt.

Der zweite Versuchsteil befasst sich mit dem *Franck-Hertz*-Versuch, der die diskrete Energieaufnahme von Atomen bei Elektronenstößen untersucht.

Durch Aufnahme der Anodenstrom-Spannungs-Kurve und deren Analyse wird die Anregungsenergie von Quecksilber(Hg)-Atomen ermittelt.

Zusätzlich werden die Einflüsse von Temperaturänderung und variabler Gegenspannung auf die Form der Stromkurve untersucht, um die Wechselwirkung zwischen freien Elektronen und Hg-Atomen unter verschiedenen Bedingungen zu analysieren.

Der gesamte Versuch dient dazu, die Quantelung atomarer Eigenschaften experimentell nachzuweisen und daraus charakteristische Größen herzuleiten.

## 2 Zeemann-Effekt

Für den Übergang von Cadmium  $5^1D_2 \rightarrow 5^1P_1$  wird der normale Zeemann-Effekt untersucht. Dafür folgt zunächst ein theoretischer Einschub.

### 2.1 Theoretischer Hintergrund

Der Zeemann-Effekt beschreibt die Aufspaltung von Spektrallinien, und somit Aufhebung der Entartung der Energieniveaus gleicher Gesamtdrehimpulse  $J$ , in einem externen Magnetfeld. Diese Aufspaltung ist auf die Wechselwirkung des magnetischen Moments der Atome mit dem äußeren Magnetfeld zurückzuführen. Unterschieden wird zwischen dem *normalen* ( $S = 0$ ) und dem *anormalen* ( $S \neq 0$ ) Zeemann-Effekt.

Da beide Niveaus des Cd einen Gesamtspin von  $S = 0$  besitzen, ist nur der normale Zeemann-Effekt relevant. Der Hamiltonian des Elektrons im Atom und im Magnetfeld folgt mit:

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar}{2m} \vec{\nabla}^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}}_{H_0} + \underbrace{\beta \frac{\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}}}{\hbar^2}}_{H_{\text{Spin-Bahn}}} + \underbrace{\mu_B \frac{\hat{\vec{L}} + 2\hat{\vec{S}}}{\hbar} \vec{B}}_{H_{\text{Zeemann}}} \quad (2.1)$$

mit dem *Spin-Bahn*-Kopplungsterm  $H_{\text{Spin-Bahn}}$  aus der Feinstruktur und dem *Zeemann*-Kopplungsterm  $H_{\text{Zeemann}}$  aus der Wechselwirkung mit dem äußeren Magnetfeld mit Richtung  $\vec{B} = B\vec{e}_z$ .

Da jedoch  $S = 0$  fallen einige Terme weg. Die guten Quantenzahlen, also die, die sich nicht ändern, sind  $L, S, J$  und  $M_J$  (wobei  $J = L + S = L$ ) und die Energiekorrektur zum Hamiltonian ist:

$$\Delta E = \mu_B g_J M_J B \quad (2.2)$$

mit dem Landé-Faktor  $g_J$ :

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \quad (2.3)$$

Die Aufspaltung der Energieniveaus ist also linear in  $B$  und die Änderung der Energie ist proportional zu  $M_J$ .

#### 2.1.1 Subsection

##### Subsubsection

# 3 Franck-Hertz-Versuch

## 3.1 Section




Abbildung 3.1: Franck-Hertz-Schaltung

### 3.1.1 Subsection

#### Subsubsection