

GEOGRAFIA DA BAHIA: ASPECTOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

GEOGRAFIA DA BAHIA


BIOMAS

É o conjunto de ecossistema que funcionam de forma estável, caracterizado por um tipo vegetal, mas podendo existir diversas vegetações.

Nesses biomas os seres vivem de forma integrada. O Brasil possui uma enorme biodiversidade.

VEGETAÇÃO

A vegetação sempre responde ao clima.



ANOTAÇÕES



Bioma 1: muita luminosidade, muita umidade com intensa biodiversidade. Floresta Amazônica (maior floresta equatorial).

Bioma 3: muita luminosidade, baixa umidade com pouca biodiversidade. Deserto.

Bioma 2: pouca luz, umidade intermediária, biodiversidade intermediária. Tundra.

Critérios da vegetação

Quanto ao porte (tamanho), a vegetação pode ser:

- a) herbácea: pequeno porte ou rasteira. Ex.: gramíneas e briófitas.
- b) arbustiva: médio porte. Ex.: caatinga e cerrado, pteridófitos.
- c) arbórea: grande porte. Ex.: gimnospermas e angiospermas.

Quanto à umidade, a vegetação pode ser:

- a) hidrófila: aquática. Ex.: vitória régia.
- b) higrófila: precisa de muita água. Ex.: floresta amazônica.
- c) mesófila: precisa mais ou menos de água. Ex.: Mata atlântica.
- d) tropófila: precisa de pouca água. Ex.: cerrado.
- e) xerófila: árido/semiárido. Ex.: caatinga.
- f) halófila: formadores de sal. Ex.: mangues e restingas.

Obs.: “fila” significa afinidade.

Quanto à durabilidade:

- a) perenifólias: folhas não caem. Ex.: pinheiro.
- b) caducifólia: folhas caem. Ex.: ipê amarelo.



Quanto à luminosidade:

- a) heliófila: exposta à luz direta.
- b) ombrófila: luz indireta.

Quanto à espécie:

- a) homogênea: predomínio de uma espécie.
- b) heterogênea: várias espécies.


Quanto aos tipos de folha:

a) latifoliada: folhas longas, com grande incidência de luz, grande transpiração, de clima úmido. Ex.: bananeira.

b) aciculifoliada: em forma de agulha, pouco raio solar, pequena transpiração, de clima seco. Ex.: caatinga.



A partir desses critérios, temos a divisão do Estado da Bahia:



15m

Caatinga (mata branca)


Localização: sertão nordestino.

- É uma vegetação xerófila (adaptada a baixa umidade) com clima árido (médias pluviométricas em torno de 750 mm/ano).
- Plantas xerófilas: possui raízes profundas, armazenam água, folhas aciculifoliadas (forma de agulha) e caducifólias.
- Possui grande biodiversidade.
- O solo é bastante fértil dificultado pela ausência de água (litossolos).

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Desenvolvimento na depressão sertaneja (relacionado à seca).
- Existe dificuldade de chegar umidade na região devido a Serra da Borborema.



- Sofre com extração vegetal (carvão).



- É um dos biomas mais afetados.
- É um local de expansão agropecuária e fruticultura no vale do São Francisco.
- Os solos estão em acentuado processo de desertificação.
- Apenas 2% da vegetação está protegida em unidades de conservação.

ANOTAÇÕES



- Estende-se por mais da metade da Bahia (54%).




- É um complexo vegetacional no qual dominam tipos de vegetação constituídos de árvores e arbustos decíduos durante a seca, frequentemente armados d espinhos, e de cactáceas, bromeliáceas e ervas, estas quase todas anuais.


É costumeira a divisão da caatinga em duas faixas de vegetação, que também são dois tipos distintos de paisagem, com base nos graus de umidade: **AGRESTE**, possuidor de maior umidade, por estar próximo ao mar, e solo mais profundo, com vegetação mais alta densa; **SERTÃO**, mais seco, com solo raso e/ou pedregoso, e vegetação mais baixa e pobre, ocupando enormes extensões para o interior.



Áreas de desertificação no Nordeste



Fonte: Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 1992.



Áreas com grave e moderada do processo de desertificação.

Folhas



ANOTAÇÕES

DIVISÃO DO NORDESTE

Único bioma exclusivamente brasileiro com 10% do território abrangendo 10 unidades federativas.



CERRADO

Esse é Cerrado baiano. É predominante no oeste da Bahia, mas ocupa pequenas áreas da Bahia, inclusive em Salvador. Localizado no agreste baiano.

O cerrado, assim como a Mata Atlântica, é um hotspot: $\frac{3}{4}$ da vegetação devastada e uma grande possibilidade da extinção das espécies locais.



ANOTAÇÕES

Como você pode observar há no cerrado árvores de pequeno porte, isoladas ou agrupadas, sobre tapete graminóide, serpenteada às vezes por florestas de galeria.

Vegetação arbustiva, os galhos são tortuosos (solo ácido, rico em alumínio), raízes profundas e casca grossa (queimada natural e queimada antrópica). Processo de calagem (cal viva, neutralização do solo).



30m



SOLO DO CERRADO

- O solo é antigo e profundo (latossolo), ácido e de baixa fertilidade, e tem altos níveis de ferro e alumínio. Porém foi recuperado e é utilizado na produção de algodão e soja.
- O fenômeno associado à monocultura de soja no Brasil é denominado de fronteiras agrícolas.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.