

GEOGRAFIA DA BAHIA: ASPECTOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

Nesta aula, vamos dar continuidade ao estudo dos biomas do Estado da Bahia.

O cerrado possui vegetação arbustiva (médio porte), galhos tortuosos, raízes profundas e casca grossa.

O cerrado, assim como a Mata Atlântica, é um hotspot: $\frac{3}{4}$ da vegetação devastada e uma grande possibilidade da extinção das espécies locais.

O cerrado se encontra nessa condição devido ao capitalismo predatório.

A introdução da monocultura da soja, fruto do movimento da Revolução Verde. Este movimento ganhou força nos EUA na segunda metade do século XX. O Brasil aderiu ao movimento visando aumentar a produtividade, comprou adubo, pesticidas, fertilizantes e máquinas agrícolas e introduziu a monocultura da soja, sendo um produto interessante para o mercado interno (produção de ração bovina) e externo (alternativa à proteína animal extremamente onerosa em razão da especulação imobiliária e ausência de terras para criação de gado).

O movimento foi pautado em expansão para o norte, sudeste, sul e região nordeste (MATOPIBA – Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

SOLO DO CERRADO



ANOTAÇÕES

- O solo é antigo e profundo, ácido e de baixa fertilidade, e tem altos níveis de ferro e alumínio. Porém foi recuperado e é utilizado na produção de algodão e soja.
- O fenômeno associado à monocultura de soja no Brasil é denominado de fronteiras agrícolas.
- Agricultura comercial ou especulativa: não se produz de acordo com o clima e solo, mas sim de acordo com a demanda do mercado externo. Por isso a região de MATOPIBA.

São causas da implantação da soja no Cerrado:

- Topografia Plana: é um planalto central.
- Cursos d'água perenes.
- Regularidade de cultivo (clima).
- Solos férteis (basalto).
- Preço das Terras, principalmente MATOPIBA.
- Intervenção do estado por meio de programas e incentivos governamentais.
- Desenvolvimento de pesquisas.
- Valorização da soja e dos biocombustíveis.
- Modernização da produção agrícola.
- Impacto social: A mecanização impactou a Bahia com o êxodo rural, intensificando o processo de metropolização. Causando, assim, a macrocefalia urbana (ausência de serviços básicos como moradia, educação, alimentação, etc.), conurbação (encontro entre duas cidades), formação de áreas subnormais, periurbanização (periferia).

DEVASTAÇÃO NO CERRADO (OESTE DA BAHIA)

Além do impacto social, grandes áreas foram desmatadas para dar lugar a pastagem e monoculturas.

Com isso, ocorre grande devastação, contaminação do solo com metais pesados.

A pecuária é responsável pela arenização provocada pelo pisoteamento. É um passo anterior ao processo de desertificação, extremamente marcante no oeste da Bahia e sertão baiano com a presença da caatinga e clima marcado pela irregularidade pluviométrica.

ANOTAÇÕES



CALAGEM NO CERRADO

O cerrado é marcado pelo solo rico em alumínio e pode ser corrigido através da calagem.

O processo consiste em: ao solo ácido (rico em metais) é adicionado o CaO óxido de cálcio denominado cal virgem ou cal vivo. $\text{Ácido} + \text{base} = \text{sal} + \text{água}$. Promovendo três coisas:

- Neutralização do solo
- Nutrição do solo
- Hidratação do solo.

Com esse processo há o aumento da produtividade (quantidade por área).



ANOTAÇÕES

QUEIMADAS NO CERRADO

Ameaças à biodiversidade do Cerrado estão relacionadas com a monocultura intensiva de grãos, a pecuária extensiva de baixa tecnologia e a utilização indiscriminada de agrotóxicos e fertilizante. E TUDO EM NOME DO PROGRESSO.



Há dois tipos de queimadas:

- a) queimada natural: seleção natural em que os mais adaptados sobrevivem.
- b) queimada antrópica: mais nociva e mais barata. Bactérias decompositoras sapróvoras/saprófogas responsáveis pelo fenômeno da serapilheira.

CAMPO RUPESTRE

- Os campos rupestres possuem estrutura arbustiva e/ou herbácea, geralmente nos cumes litólicos das serras.
- Caracteriza-se por uma ruptura na sequência natural das espécies circunvizinhas, sendo comum a presença de plantas escuras, além de árvores e arbustos tortuosos.

Há a presença de diversos tipos de cerrado:

- Campo limpo: vegetação rasteira.
- Campo sujo: vegetação rasteira e alguns arbustos.
- Cerrado tradicional: metade arbustivo e metade arbóreo.
- Cerradão: predomínio da vegetação arbórea.
- Mata ciliar: encontra-se às margens dos rios evitando o assoreamento (erosão dos rios).



15m

ANOTAÇÕES




Esse campo rupestre, Vegetação típica de ambientes montanos e altomontanos, em altitudes superiores a 900m . Encontra-se em geral distribuido no Centro da Bahia.

Exemplificando: Morro do Chapéu na Chapada Diamantina.

Morro do chapéu marcado pelo clima tropical de altitude (temperaturas amenas):



Chapada Diamantina (campo limpo e campo sujo):




PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA

Cidades que compõem o Parque Nacional da Chapada Diamantina

O Parque Nacional da Chapada Diamantina abriga 28 cidades e mais de 150 vilarejos numa área total de 70 mil quilômetros quadrados.

Atualmente o turismo representa uma grande fonte renda para os mais de 400.000 habitantes do Parque.


Entre os seus aspectos mais atraentes estão as cidades que foram sedes de garimpos de diamantes que atraíram aventureiros de todo o mundo como a cidade de Lençóis e de Mucugê.



MANGUEZAIS

Os manguezais são uma vegetação halófila formadoras de sal, que faz um papel de filtro biológico: filtra água doce para encontrar a água salgada, vice-versa. As raízes são aéreas, denominadas de pneumatóforas, que possuem bactérias nitrificadoras que vão captar o nitrogênio presente na atmosfera, aumentando a fertilidade dos mangues.

ANOTAÇÕES



Os mangues possuem uma flora de água doce e água salgada.



Esse é o Manguezal baiano. Localiza-se em áreas litorâneas.

É um ambiente extremamente interessante. As raízes de suas plantas são aéreas, pois o solo não é oxigenado o suficiente, então elas foram procurar oxigênio fora do solo.

ANOTAÇÕES




Essa é a riquíssima fauna dos manguezais baianos.



ANOTAÇÕES

AS MATAS DE GALERIA (ou mata ciliar)



Neste ambiente halófito desenvolve-se uma flora especializada, ora dominada por gramináceas e amarilidáceas, que lhe confere uma fisionomia herbácea, ora dominada por espécies arbóreas.

RESTINGAS

Esta é a Restinga, presente ao longo do litoral baiano, também considerada por depender mais da natureza do solo do que do clima.



ANOTAÇÕES

Parque das Dunas




Áreas com presença de sedimentos, de origem marítima ou fluvial, sendo classificadas como: móveis, semimóveis ou fixas.



ANOTAÇÕES

MATA ATLÂNTICA



Essa é Patamares em Salvador, onde ainda tem resquícios de Mata atlântica.

Cerca de 5 a 12% da vegetação original em razão da colonização e especulação imobiliária.

As florestas atlânticas são ecossistemas que apresentam árvores com folhas largas e perenes.



A mata atlântica também encontra-se na condição de hotspots.

Ecossistemas com formação vegetal de porte elevado e grande diversidade de espécies, folhas largas, sempre verdes; podendo apresentar diversos estágios sucessionais e vários estratos, com a presença de serapilheira, cipós, epífitas e trepadeiras.

ANOTAÇÕES



A região cacaujeira baiana teve no cultivo de cacau um aliado importante na conservação da Mata atlântica. Isso porque o cacau é cultivado no sistema de cabruca, que consiste em plantá-lo sob a sombra de árvores nativas.



RESUMINDO

Destacamos três vegetações que são marcantes no Estado da Bahia:

- Região da Zona da Mata: mata atlântica, mangues e restingas.
- Agreste baiano: presença do cerrado, médio porte, galhos tortuosos, raízes profundas, cascas grossas.
- Sertão baiano: caatinga, bioma exclusivo do Brasil. Marcado por ser uma vegetação xerófila, folhas em forma de agulha.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
