

GEOGRAFIA DA BAHIA: ASPECTOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

Geomorfologia: parte da Geografia que estuda relevo. Ao destacar a geomorfologia, torna-se fundamental a compreensão da estrutura geológica brasileira, que é a classificação da litosfera de acordo com as suas origens e a composição de suas rochas.

No mundo, basicamente, há três grandes unidades geomorfológicas: crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos. O Brasil não possui dobramentos modernos, pois encontra-se no centro da placa sul-americana. Desse modo, não havendo a presença de montanhas, há os chamados planaltos: superfície mais ou menos plana, cujo processo de erosão supera a acumulação.

O Brasil é marcado pela presença dos crátons e das bacias sedimentares.

Os **crátons** são relevos bastante antigos, da era pré-cambriana. Marcados pela presença de rochas magmáticas e metamórficas. As rochas magmáticas são formadas pelo extravasamento do magma e podem ser intrusivas, extrusivas ou hipoabissais. Já as rochas metamórficas são formadas por outras preexistentes, devido ao aumento da temperatura ou pressão. O relevo brasileiro é formado 36% por crátons, por isso, uma intensa e enorme variabilidade mineralógica: quadrilátero ferrífero, Maciço do Urucum, Serra dos Carajás, Vale dos Trombetas, Serra do Navio, entre outros.

No Brasil também há a presença de **Bacias Sedimentares**: formadas por um relevo mais recente, da Era Paleozóica. As Bacias Sedimentares são marcadas pela presença de rochas sedimentares, formadas por restos animais, minerais e/ou vegetais. Além disso, podem ser detríticas, orgânicas e também podem ser rochas químicas, um pouco mais recorrentes, formadas pela evaporação da água. Ex.: os sais. Onde há rochas sedimentares há uma grande presença do petróleo e do carvão mineral. No Brasil, as bacias sedimentares representam 64% do relevo.

Estrutura geológica do Brasil

A estrutura geológica é a classificação da litosfera terrestre de acordo com suas origens e as composições de suas rochas (base para o relevo).

ANOTAÇÕES

A litosfera é o conjunto da crosta terrestre e da camada logo abaixo, mais pastosa, denominada de astenosfera, responsável por diminuir os choques entre as placas tectônicas que ocasionam os terremotos.

Existem somente três estruturas geológicas:

- Crátons.
- Bacias sedimentares.
- Dobramentos modernos.
 - Os crátons são formados por rochas metamórficas e rochas magmáticas. Além disso, há a presença de minerais metálicos. Trata-se de um relevo bastante antigo, da era pré-cambriana, sendo que 36% do relevo brasileiro é formado por crátons.
 - As bacias sedimentares correspondem a 64% do relevo brasileiro, apresentando rochas sedimentares, desse modo, conclui-se que na região apresenta-se petróleo e carvão mineral.
 - O Brasil não possui dobramentos modernos.

Divisão da estrutura geológica brasileira


A Bahia possui as bacias sedimentares e os escudos cristalinos (crátons):



Em se tratando do estado da Bahia, é importante destacar 9 unidades geomorfológicas: Planície do Litoral, Chapada Diamantina, Serra Geral do Espinhaço, Planalto Sul Baiano, Espigão Mestre, Recôncavo Baiano, Depressão Sertaneja, a Chapada Ocidental do São Francisco e o Rebordo do Planalto, região localizada entre duas grandes formas de relevo.

A Bahia tem a presença de 3 unidades geomorfológicas: planaltos, planícies e depressões.

Planalto: de acordo com Aziz Ab'Saber, o planalto é uma superfície mais ou menos plana, onde o processo de erosão supera a acumulação, porém, se a acumulação superar a erosão, tem-se então uma planície.



Erosão > Acumulação = planalto.

Erosão < Acumulação = planície.

A depressão, por sua vez, é uma percepção defendida por Jurandyr Ross. A partir do ano de 1989, ele introduziu esta ideia no Brasil. A depressão é uma região mais baixa em relação às demais envolvidas; trata-se de uma área caracterizada pela acumulação de sedimentos e pela retirada (a planície caracteriza-se apenas pela acumulação de sedimentos), por isso é uma região mais rebaixada.




10m

ANOTAÇÕES

Relevo do estado da Bahia

Planície Costeira ou baixada litorânea (1)



- Rochas sedimentares formadas por restos animais, minerais e/ou vegetais.
- Principalmente a rocha sedimentar detrítica, pois é formada por restos minerais.
Ex.: areia.
- Drenagem exorreica.
- A planície costeira se estende do Rio Grande do Norte até o estado da Bahia.
- +- 1900 km, sendo que 903 km correspondem ao litoral baiano.

Drenagem é a característica de um rio responsável por um deslocamento de um volume de água em determinado intervalo. Há os rios de drenagem endorreica e os rios de drenagem exorreica. Os rios de drenagem endorreica deságuam dentro do continente, e os de drenagem exorreica deságuam fora do continente.


Em relação à hidrografia do estado da Bahia, existe um conjunto de rios vinculados à Bacia do São Francisco, assim como existe um conjunto de rios vinculados à Chapada Diamantina, que, por sua vez, possuem como vazão o local de deságue através da sua foz no Oceano Atlântico, por isso são considerados rios de drenagem exorreica.



15m

ANOTAÇÕES

Chapada Diamantina (2)



A Chapada Diamantina é um **planalto**. Trata-se de um planalto horizontal, onde houve um processo de erosão diferenciado: a base deste relevo possui mais resistência. Desse modo, o topo deste relevo é mais suscetível ao processo de erosão, por isso foi aplainado.

Há dois tipos de bacias sedimentares: as bacias ligadas à Bacia do São Francisco e as bacias ligadas à Chapada Diamantina. Além disso, há os rios genuínos ou exclusivos e os rios ou bacias federais. Em se tratando da Chapada Diamantina, ela **possui diversas nascentes**, e seus rios são de drenagem exorreica, com vazão para o Oceano Atlântico. Além disso, na Chapada Diamantina há a presença de duas rochas: rochas sedimentares (aplainadas) e rochas cristalinas (base rígida).


As nascentes da Chapada Diamantina contribuem para o abastecimento do rio São Francisco. Em relação a este importante rio, ele é considerado o rio da integração nacional, pois perpassa por cinco estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, PE, Alagoas e Sergipe; desaguando entre Alagoas e Sergipe. Ademais, trata-se de um rio de planalto caracterizado pela produção de energia, porém consegue ter grande navegabilidade de Pirapora, Minas Gerais, até Juazeiro na Bahia. Ressalta-se que Juazeiro faz parte de uma Região Integrada de Desenvolvimento (RID), uma área análoga à uma região metropolitana, porém possui municípios pertencentes a unidades federativas distintas.



20m


ANOTAÇÕES

Serra Geral do Espinhaço (3)



A Serra Geral do Espinhaço é um divisor de águas: da Bacia do litoral com a porção mais sudeste, uma vez que faz divisa com Minas Gerais.

Planalto Sul-Baiano (4)



O planalto sul baiano possui rochas extremamente rígidas (rochas cristalinas). Ademais, essa região tem proximidade com o estado de Minas Gerais, em direção ao Espírito Santo Espigão Mestre (5):

- Algodão e soja.
- Altitude entre 800 a 1200m.


ANOTAÇÕES

- Divisor de águas entre leste e norte.

O Espigão mestre é o divisor de águas entre o leste e o norte e possui uma altitude de 800 e 1200m. Um ponto importante sobre a região é seu Desenvolvimento Econômico, que é marcado pela presença de uma monocultura de soja e algodão.

A Revolução Verde foi um movimento que se estabeleceu nos Estados Unidos, na segunda metade do século XX. Trata-se de um movimento que produziu tecnologia com um alto valor agregado e, para países como Brasil, a responsabilidade se deu por meio de commodities (qualquer matéria-prima no estado primitivo ou semi-industrializado de comercialização global, como a laranja). O Brasil aderiu a ideia proposta pela Revolução Verde, adquirindo adubos, fertilizantes, pesticidas, máquinas agrícolas etc. Desse modo, promoveu uma monocultura de soja, no Planalto Central, que se expandiu para outras regiões, inclusive, para uma região chamada de Matopiba: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia,

Recôncavo Baiano (6)



- Baía de Todos os Santos.
- Petróleo = Camaçari.




O Recôncavo Baiano é uma área que está vinculada à baía de Todos os Santos, caracterizada pelo polo petroquímico de Camaçari, onde ocorre a extração de petróleo. A baía de todos os Santos possui uma porção de 56 ilhas e uma área de mais ou menos 1152 m².

ANOTAÇÕES

A extração do petróleo, no Brasil, ocorre com mais frequência no litoral, uma vez que o petróleo do continente no Brasil é de má qualidade, chamado de petróleo pesado. É por esse motivo que o Brasil faz a extração de petróleo no mar territorial e na zona econômica exclusiva, sendo considerado uma referência na extração de petróleo em grandes profundidades (lembre-se do Pré-sal – 7.000m a 8000m de profundidade).

Depressão sertaneja (7)



A depressão sertaneja é onde o Rio São Francisco deságua entre os estados de Alagoas e Sergipe, trata-se de uma área que recebe um grande volume de sedimentos tendo em vista que é o portal da foz.




Chapada Ocidental do São Francisco (8)

A Chapada Ocidental do São Francisco é marcada pela presença do relevo aplainado: presença de rochas sedimentares e rochas cristalinas.


ANOTAÇÕES

Rebordo do Planalto (9)



O rebordo do Planalto é uma área rebaixada de transição. Encontra-se entre a planície costeira e a chapada Diamantina.

Relevo do Estado da Bahia



- O relevo baiano é caracterizado por: planícies, planaltos e depressões.
- Os planaltos ocupam quase todo o estado – o planalto semiárido, localizado no sertão brasileiro, caracterizado por baixas altitudes.

ANOTAÇÕES

- As planícies estão situadas na região litorânea, onde a altitude não ultrapassa os 200 a 300 metros (praias, dunas, restingas, pântanos).
- Quanto mais se anda rumo ao interior, mais surgem terrenos com solos relativamente férteis, onde aparecem colinas que se estendem até o oceano.



- O Recôncavo baiano é fruto do recorte do relevo litorâneo, cuja superfície apresenta solo pouco fértil em algumas áreas, enquanto em outras a fertilidade é favorecida pela presença do solo massapê, formado por terras de origem argilosa.
- No interior, a Bahia é caracterizada por uma região acidentada próxima ao litoral, que vai se tornando mais plana à medida que se aproxima dos cerrados da região central do Brasil.
- Na área acidentada, destaca-se a existência de grandes chapadas e chapadões, a mais conhecida das quais a Chapada Diamantina.
- Essa chapada foi modelada pela contínua erosão dos picos da Serra do Espinhaço, uma cadeia de "montanhas" que se estende, com diferentes nomes, de Minas Gerais (Serra da Mantiqueira) até Pernambuco (Serra da Borborema).
- Um conjunto de chapadões situados a oeste recebe, na altura do estado, o nome de Espigão Mestre.

Planícies aluviais

- Formam a partir dos rios Paraguaçu, Jequitinhonha, Itapicuru, de Contas, e Mucuri, que descem da região de planalto, enquanto o rio São Francisco atua na formação do vale do São Francisco, onde o solo apresenta formação calcária.

ANOTAÇÕES

- O território do Estado da Bahia se caracteriza por planaltos, tendo em vista que 90% do relevo situa-se acima dos 200 a 300 metros.
- Diversas áreas do estado apresentam altitudes acima dos 900 metros, as quais se concentram na região central e centro-leste do estado.

A Bahia é constituída por oito unidades morfológicas:

- Planície Litorânea.
- Bacia sedimentar do Recôncavo.
- Rebordo do planalto. (Considera-se 8, porque o Rebordo do planalto é uma área de transição)
- Planalto sul-baiano.
- Chapada Diamantina.
- Chapadão Ocidental do São Francisco.
- Serra Geral do Espinhaço.
- Depressão Sertaneja.
- Espigão Mestre.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Júlio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
