

OFFICE 365 – EXCEL VIII

13)

=CONT.SE(D1:D6;">=4")

D1:D6

">=4"

	B	C	D	E	F	G	H
1				10			
2				3			
3				8			
4				1			
5				5			
6				4			
7							
8				=CONT.SE(E1:E6;">=4")			
9							
10							

A função acima conta quantos valores maiores ou iguais a 4 há no intervalo D1:D6.

	B	C	D	E	F	G	H
1				10			
2				3			
3				8			
4				1			
5				5			
6				4			
7							
8				4			
9							
10							

14) =CONT.SES(D1:D6;">=4";E1:E6;"<5")

D1:D6

">=4"

E1:E6

"<5"

	A	B	C	D	E	F
1				10	5	
2				3	8	
3				8	2	
4				1	0	
5				5	4	
6				4	3	
7						
8				=CONT.SES(D1:D6;">=4";E1:E6;"<5")		
9						

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A função acima conta quantos valores maiores que 4 há no intervalo D1:D6 e quantos valores menores que 5 há no intervalo E1:E6. Para que seja contada, é necessário haver a combinação das duas condições na linha.

	A	B	C	D	E	F
1				10	5	
2				3	8	
3				8	2	
4				1	0	
5				5	4	
6				4	3	
7						
8					3	
9						

15) =CONT.NÚM(D1:D4)

	A	B	C	D	E	F	G
1				35			
2				ZERO			
3				4			
4				6			
5							
6			=CONT.NÚM(D1:D4)				
7							
8							
9							
10							
11							
12							

A função acima conta quantos números há no intervalo D1:D4. A palavra ZERO não é número, logo não será contada.

	A	B	C	D	E	F	G
1				35			
2				ZERO			
3				4			
4				6			
5							
6				3			
7							
8							
9							
10							
11							
12							

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

16) =CONT.NÚM(D1:D4;3)

	A	B	C	D	E	F	G
1				20			
2				2			
3				8			
4				16			
5							
6				=CONT.NÚM(D1:D4;3)			
7							
8							
9							
10							
11							
12							

A função acima conta a quantidade de números no intervalo D1:D4 e o número 3. Com o número 3, o resultado é 5 números.

	A	B	C	D	E	F	G
1				20			
2				2			
3				8			
4				16			
5							
6				5			
7							
8							
9							
10							
11							
12							

17) =MÍNIMO(D1:D4)

	A	B	C	D	E	F	G
1				25			
2				12			
3				30			
4				80			
5							
6				=MÍNIMO(D1:D4)			
7							
8							
9							
10							
11							
12							

A função MÍNIMO retoma o menor valor do intervalo D1:D4.

	A	B	C	D	E	F	G
1				25			
2				12			
3				30			
4				80			
5							
6				12			
7							
8							
9							
10							
11							
12							

18) =MENOR(D1:D6;3)

	A	B	C	D	E	F	G
1				10			
2				2			
3				3			
4				5			
5				2			
6				8			
7							
8				=MENOR(D1:D6;3)			
9							
10							
11							
12							

A função MENOR estabelece um valor menor específico. No caso do exemplo, a função retoma o terceiro menor valor. Caso fosse preciso retomar o segundo menor valor, a função ficaria =MENOR(D1:D6;2) e assim por diante.

	A	B	C	D	E	F	G
1				10			
2				2			
3				3			
4				5			
5				2			
6				8			
7							
8				3			
9							
10							
11							
12							



19) =MÁXIMO(D1:D5)

	A	B	C	D	E	F	G
1				22			
2				15			
3				32			
4				8			
5				9			
6							
7				=MÁXIMO(D1:D5)			
8							
9							
10							
11							
12							

A função acima retoma o maior valor dentro do intervalo D1:D5.

	A	B	C	D	E	F	G
1				22			
2				15			
3				32			
4				8			
5				9			
6							
7				32			
8							
9							
10							
11							
12							

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

20) =MAIOR(D1:D5;2)

	A	B	C	D	E	F	G
1				40			
2				15			
3				35			
4				60			
5				18			
6							
7				=MAIOR(D1:D5;2)			
8							
9							
10							
11							
12							

A função acima retoma o segundo maior valor dentro do intervalo D1:D5.

	A	B	C	D	E	F	G
1				40			
2				15			
3				35			
4				60			
5				18			
6							
7				40			
8							
9							
10							
11							
12							

21) =MED(D1:D5)

	A	B	C	D	E	F	G
1				5			
2				1			
3				2			
4				3			
5				4			
6							
7				=MED(D1:D5)			
8							
9							
10							
11							
12							

A função MEDIANA não é calcular a média, mas retomar o valor central do intervalo. Para calcular manualmente, é preciso digitá-lo na ordem crescente, no caso do exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. O valor que está no meio é 3.

	A	B	C	D	E	F	G
1				5			
2				1			
3				2			
4				3			
5				4			
6							
7				3			
8							
9		1	2	3	4	5	
10							
11							

22) =MED(D1:D4)

	A	B	C	D	E	F	G
1				7			
2				3			
3				5			
4				3			
5							
6			=MED(D1:D4)				
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Esta é outra hipótese do cálculo da função MEDIANA. Trata-se dessa vez de uma quantidade par de valores. Para fazer o cálculo manualmente, colocam-se todos os números em ordem crescente. Pelo fato de haver uma quantidade par de valores, não há um valor central visível. Nesse caso, é preciso pegar os dois valores do meio e calcular a média entre eles. No exemplo acima, serão os valores 3 e 5, que resultará na média 4.

	A	B	C	D	E	F	G
1				7			
2				3			
3				5			
4				3			
5							
6				4			
7							
8			3	3	5	7	
9							
10							

23) =MODO(D1:D6)

	A	B	C	D	E	F	G
1				8			
2				2			
3				5			
4				1			
5				4			
6				0			
7							
8			=MODO(D1:D6)				
9							
10							
11							
12							

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A função acima retoma o valor que mais se repete dentro do intervalo D1:D6. Como no exemplo não há repetição de valores, o resultado é N/D (não disponível). Trata-se de um resultado amodal.

	A	B	C	D	E	F	G
1				8			
2				2			
3				5			
4				1			
5				4			
6				0			
7							
8				#N/D			
9							
10							
11							
12							

24) =MODO(D1:D6)

	A	B	C	D	E	F	G
1				10			
2				7			
3				12			
4				1			
5				7			
6				9			
7							
8				=MODO(D1:D6)			
9							
10							
11							
12							

A função acima retoma o valor que mais se repete dentro do intervalo D1:D6.

	A	B	C	D	E	F	G
1				10			
2				7			
3				12			
4				1			
5				7			
6				9			
7							
8				7			
9							
10							
11							
12							

25) =MODO(D1:D6)

	A	B	C	D	E	F	G
1				20			
2				16			
3				9			
4				23			
5				9			
6				20			
7							
8				=MODO(D1:D6)			
9							
10							
11							
12							

Trata-se da mesma função explicada nos itens 24 e 25. No entanto, nesse exemplo, há dois valores que se repetem a mesma quantidade de vezes. É uma situação chamada de bimodal. Caso houvesse mais de dois valores que se repetissem a mesma quantidade de vezes, seria uma situação polimodal. Em uma situação bimodal ou polimodal, a lógica do Excel é pegar o primeiro valor que se repete. Logo o resultado no exemplo acima será 20.

	A	B	C	D	E	F	G
1				20			
2				16			
3				9			
4				23			
5				9			
6				20			
7							
8							
9							
10							
11							
12							

26) =RAIZ(E1)

	A	B	C	D	E	F	G
1					25		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

A função RAIZ calcula a raiz quadrada do número.

	A	B	C	D	E	F	G
1					25		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

ANOTAÇÕES

27) =CONCATENAR(D1;D2)

	A	B	C	D	E	F	G
1				2			
2				3			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

A função CONCATENAR une os valores dentro de um intervalo, no caso do exemplo, o intervalo D1;D2.

	A	B	C	D	E	F	G
1				2			
2				3			
3							
4							
5				23			
6							
7							
8							
9							
10							



28) =CONCATENAR(F1;" ";F2)


	C	D	E	F	G	H
1				JEFERSON		
2				BOGO		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Nesse caso, a função CONCATENAR unirá texto. As aspas usadas na função servem para o Excel interpretar como texto. Há espaço entre as aspas porque, por padrão, o Excel junta sem espaços. Logo, caso seja preciso ter espaço, esse será indicado pelo espaçamento dentro das aspas.


	C	D	E	F	G	H
1				JEFERSON		
2				BOGO		
3						
4						
5				JEFERSON BOGO		
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

29) ="5+6="&D1+D2



Essa é mais uma função do CONCATENAR. Na função ="5+6="& D1+D2, o que está entre aspas ("5+6="), será considerado como texto. O & é o operador de concatenação que unirá o texto e o resultado da soma dos valores no intervalo D1+D2.




30) =SE(D1>D2;"MAIOR";"MENOR")

D1>D2

"MAIOR"


"MENOR"



ANOTAÇÕES

A função condicional o resultado do teste lógico a ser falso ou verdadeiro. Se D1 for maior do que D2, o resultado será VERDADEIRO, mas se for menor, o resultado será FALSO.

No caso do exemplo, o valor de D1 é 6 e o de D2 é 8, logo D1 não é maior que D2 e o resultado será FALSO. Sendo falso, o resultado da função é MENOR.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
