


Atividade AA-07

Nesta tarefa deve-se (i) propôr um autômato finito determinístico **mínimo** D que reconheça as cadeias da linguagem selecionada e, a partir de D , construir uma gramática que gere as cadeias reconhecidas por D ; (ii) propôr um autômato finito não-determinístico N que reconheça as cadeias da linguagem selecionada e, a partir de N , construir uma gramática que gere as cadeias reconhecidas por N . O autômato N pode ser um NFA ou NFA- ε , com pelo menos uma transição não determinística ou uma transição ε . A gramática obtida a partir do DFA D deve ser regular e a gramática resultante do NFA N não necessariamente será regular! **Atenção:** NFA's criados a partir do simples acréscimo de transições $\delta(s_i, \varepsilon) = s_i$ (ε -laços) a um DFA não serão considerados corretos, por não permitirem uma avaliação razoável do aprendizado dos conceitos abordados nesta atividade avaliativa. (Cada aluno(a) deve consultar na descrição da atividade AA-ã, na disciplina INF0333A da plataforma Turing, qual é a linguagem associada ao seu número de matrícula. A descrição da linguagem está disponível no arquivo “lista de linguagens regulares” da Seção “Coletânea de exercícios”).

Iury Alexandre Alves Bo (202103735)

- $\mathcal{L}_{36} = \{w \mid w = |2k|, k \in \mathbb{N}, w \text{ não contém } 11\}$.
- $ER(\mathcal{L}_{36}) = (10 \cup 0(10)^*0)^*(\varepsilon \cup 0(10)^*1)$.

DFA mínimo que reconhece as cadeias de \mathcal{L}_{36}




Gramática G_1 que gera as cadeias de \mathcal{L}_{36}

$G_1 = (V, \Sigma, P, S) = (\{A, B, C, S\}, \{0, 1\}, P, S)$, com:

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow 0B \mid 1A \mid \varepsilon, \\ A \rightarrow 0S, \\ B \rightarrow 0S \mid 1C, \\ C \rightarrow 0B \mid 1D \mid \varepsilon \end{array} \right\}.$$

NFA que reconhece as cadeias de \mathcal{L}_{36}



Gramática G_2 que gera as cadeias da linguagem \mathcal{L}_{36}

$$G_2 = (V, \Sigma, P, S) = (\{A, B, C, S\}, \{0, 1\}, P, S), \text{ com}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow 1A \mid \varepsilon B, \\ A \rightarrow 0S, \\ B \rightarrow 0C \mid 1A \mid \varepsilon, \\ C \rightarrow 0B \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow 1A \mid B, \\ A \rightarrow 0S, \\ B \rightarrow 0C \mid 1A \mid \varepsilon, \\ C \rightarrow 0B \end{array} \right\}.$$