① Найти частные производные первого и второго порядка. Убедиться в равенстве смешанных производных

$U = x^3 + 3xy^2 + z^2 - 39x - 36y + 2z + 26$

$U'_x = 3x + 3y^2 - 39$; $U''_{xx} = 3$;

$U'_y = 6xy - 36$; $U''_{yy} = 6x$

$U'_z = 2z + 2$; $U''_{zz} = 2$

$U''_{xy} = 6y$ остальные смешанные производные $= 0$

$U''_{yx} = 6y$

② $U = \frac{256}{x} + \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + z^2$

$U'_x = -\frac{256}{x^2} + \frac{2x}{y}$; $U''_{xx} = \frac{512}{x^3} + \frac{2}{y}$

$U'_y = -\frac{x^2}{y^2} + \frac{2y}{z}$; $U''_{yy} = \frac{2x^2}{y^3} + \frac{2}{z}$

$U'_z = -\frac{y^2}{z^2} + 2z$; $U''_{zz} = \frac{2y^2}{z^3} + 2$

$U''_{xy} = -\frac{2x}{y^2}$; $U''_{yz} = -\frac{2y}{z^2}$

$U''_{yx} = -\frac{2x}{y^2}$ $U''_{zy} = -\frac{2y}{z^2}$


ESPIRITU
DE CHILE
Gran Reserva

③ Найти производную функции
$U = x^2 + y^2 + z^2$ по направлению вектора $\vec{c}(-9, 8, -12)$
в точке $M(8, -12, 9)$

$U'_{\vec{c}} = (\vec{c}_0 \cdot \text{grad}U)$; $\text{grad}U = (U'_x, U'_y, U'_z)$

$U'_x = 2x$; $U'_y = 2y$; $U'_z = 2z$; $\text{grad}U = (2x, 2y, 2z)$

$|\vec{c}| = \sqrt{-9^2 + 8^2 - 12^2} = \sqrt{81 + 64 + 144} = 17$

$\vec{c}_0 = \left(\frac{-9}{17}; \frac{8}{17}, \frac{12}{17}\right)$

$\text{grad}U = (16, -24, 18)$

$U'_{\vec{c}} = \frac{-9}{17} \cdot 16 - \frac{8}{17} \cdot 24 + \frac{12}{17} \cdot 18 = -\frac{144}{17} - \frac{192}{17} + \frac{216}{17} = -\frac{120}{17}$

---

④ Найти производную функции $U = e^{x^2+y^2+z^2}$
по направлению вектора $\vec{c}(4, -13, -16)$ в точке $A(-16, 4, -13)$

$U'_x = e^{x^2+y^2+z^2} \cdot 2x$; $U'_y = e^{x^2+y^2+z^2} \cdot 2y$; $U'_z = e^{x^2+y^2+z^2} \cdot 2z$

$\text{grad}U = (-e^{441} \cdot 32, e^{441} \cdot 8, -e^{441} \cdot 26)$

$|\vec{c}| = \sqrt{4^2 - 13^2 - 16^2} = 21$

$\vec{c}_0 = \left(\frac{4}{21}, -\frac{13}{21}, -\frac{16}{21}\right)$

$U'_{\vec{c}} = e^{441}\left(-\frac{128}{21} - \frac{104}{21} + \frac{416}{21}\right) = e^{441} \cdot \frac{184}{21}$

⑥ Исследовать на экстремум функцию

$$U = x^2y + \frac{1}{3}y^3 + 2x^2 + 3y^2 - 1$$

$U'_x = 2xy + 4x$; $U'_y = x^2 + y^2 + 6y$

$$\begin{cases} 2xy + 4x = 0; \\ x^2 + y^2 + 6y = 0; \end{cases} \quad 2xy = -4x; \; y = -2$$

$x^2 + 4 - 12 = 0$

$x = \pm\sqrt{8}$

две точки $(\sqrt{8}, -2)$ $(-\sqrt{8}, -2)$

$U''_{xx} = 2y + 4$, $U''_{yy} = 2y + 6$, $U''_{xy} = 2x$, $U''_{yx} = 2x$

$\Delta_1 = U''_{xx} = 0$ – матрица не работает

Полный дифференциал

точка $(\sqrt{8}, -2)$

$$dU^2 = (2y+4)dx^2 + 4x\,dx\,dy + (2y+6)dy^2 =$$

$$= 4\sqrt{8}\,dx\,dy + 2dy^2 > 0$$ – точка минимума

точка $(-\sqrt{8}, -2)$

$$dU^2 = -4\sqrt{8}\,dx\,dy + 2dy^2 < 0$$ – точка максимума