GASP I: Gas stripping phenomena in galaxies with MUSE

Bianca M. Poggianti (INAF-OaPD), Alessia Moretti, Marco Gullieuszik, Jacopo Fritz, Yara Jaffe, Daniela Bettoni, Giovanni Fasano, Callum Bellhouse, George Hau, Benedetta Vulcani, Andrea Biviano, Alessandro Omizzolo, Angela Paccagnella, Mauro D'Onofrio, Antonio Cava, Y.-K. Sheen, Warrick Couch, Matt Owers

GASP (GAs Stripping Phenomena in galaxies with MUSE) 114 галактик на z=0.04-0.07 В группах и скопдениях разных масс "jellyfish galaxies" = медузки Масштабы – до 50-100 kpc (>10 re!)


Изучение состояние выброшеного газа и звездооразования в нем, как функции окружения и массы

MUSE: 4*675 sec (rotated 90 deg) IDL software KUBEVIZ (Fossati et al. 2016)

Отбор кандидатов:

WINGS: multiwavelength survey of 76 clusters (UBVJK imaging + spectra INT,WHT,UKIRT)

OMEGAWINGS: extension of the WINGS with 1 deg FOV





arXiv:1704.05086


Padova Millennium Galaxy and Group Catalogue:

B-band imaging with WFC@INT + spectra

JO2066 (z=0.0513, WINGS J211347.41+022834.9)







Рассчет удерживающих сил и лобового давления, выметание возможно, только для r>20 кпк, что и наблюдается..

Примерно 15% газа покинуло галактику

Ожидают дополнительную информацию о холодном газе:

APEX – CO JVLA – HI

JO206 - пример массивной галактики под сильный лобовым давлением в маломассивном бедном скоплении

GASP II. A MUSE view of extreme ram-pressure stripping along arXiv:1704.05087 the line of sight: kinematics of the jellyfish galaxy JO201

C. Bellhouse, Y. L. Jaffe, G. K. T. Hau, S. L. McGee, B. M. Poggianti, A. Moretti, M. Gullieuszik, D. Bettoni, G. Fasano, M. D'Onofrio, J. Fritz, A. Omizzolo, Y.-K. Sheen, B. Vulcani




Figure 3. RGB image from JO201 GASP observation produced using 1000Å slices integrated from the datacube (B:5000-6000Å, G:6000-7000Å, R=7000-8000Å). East is to the left and north to the top. A series of bright knots to the east of the galaxy are seen con-





Figure 9. 3D visualisation of H α gas extracted from KUBEVIZ fit produced using the method presented in Vogt et al. (2016a) and Vogt et al. (2016b). X and Y axes show projected distance, with the Z axis representing the wavelength/velocity and linewidth/sigma. Surface



GASP III. JO36: a case of multiple environmental effects at play?

arXiv:1704.05088

Jacopo Fritz, Alessia Moretti, Bianca Poggianti, Marco Gullieuszik, Gustavo Bruzual, Benedetta Vulcani, Fabrizio Nicastro, Yara Jaffe', Bernardo Cervantes Sodi, Daniela Bettoni, Giovanni Fasano, Stephane Charlot, Callum Bellhouse, George Hau




Figure 3. Left panel: Stellar velocity map. Right panel: gas velocity map. The solid lines in both figures are $H\alpha$ continuum surface brightness contours in four logarithmically spaced levels. Regions labelled with letters from "A" to "F" are described in the text. The grey and red arrows point toward the BCG and the cluster X-ray emission, respectively. A cut of 4 in S/N was applied in the gas velocity map. North is up, east is left.

Менее красивый случай, разобранный в деталях:

Недавняя (20-500 млн.лет назад) вспышка звездообразования, индуцированая первым столкновением с газом скопления.

Далее – исчерпание газа + обовой давления =HII truncated disc

Обсуждение нового пакета для фиттинга спектров в кубах: SINOPSIS vs. GANDALF

: http://web.oapd.inaf.it/gasp/

