

GUIA TRIAPERFORMANCE

Decidir no quilômetro 30

As três metas, o procedimento quando o plano falha, e a folha que você leva junto

Três seções do Guia de Execução de Prova da Triaperformance: como escrever as suas metas A, B e C antes da prova, o que exatamente decidir quando o ritmo cai e o objetivo se afasta, e o modelo de decisões que resolve o dia por você.

Escopo deste guia

Isto é material de treino. Não é orientação médica nem psicológica.

Cobre uma coisa só, e cobre por inteiro: **como executar uma prova, e o que fazer quando o plano para de funcionar.**

Não cobre ansiedade nem depressão, não cobre perda de motivação como questão clínica, não cobre dependência de exercício, nem a sua relação com a comida ou com o seu corpo.

Também não trata "força mental" como um traço de caráter que precisa ser consertado. Não porque essas coisas não importem — importam muito — mas porque não são o meu trabalho. Sou seu treinador, não seu psicólogo, e essa diferença não é um detalhe técnico: é a linha entre o que posso defender com a minha experiência e o que exige um registro profissional.

Sobre alimentação, este guia não repete nada: tudo sobre combustível, hidratação e sódio está no **Kit de Combustível**, e é lá que você deve procurar.

Converse com um profissional antes de aplicar qualquer coisa daqui se:

- Você tem uma lesão ativa, ou dor que ainda não foi avaliada por um médico
- Você tem uma condição cardiovascular, respiratória ou metabólica diagnosticada
- Você está grávida ou tentando engravidar
- Você toma medicação de forma regular
- Você tem menos de 18 anos

Converse com um profissional de saúde mental se:

Isto não é uma lista de diagnóstico. São observações que você pode fazer sobre si mesmo, com um limite de **tempo ou de função**, não de humor.

- A queda depois de uma prova dura **mais de duas semanas**, ou atrapalha você no trabalho, em casa ou com as pessoas ao seu redor
- Você perdeu o interesse em coisas que não têm nada a ver com esporte
- Seu sono desandou e não volta ao normal
- **Você não consegue tirar um dia de descanso**, ou treina doente ou lesionado porque parar parece impossível
- Sua alimentação ou seu peso decidem se você treina ou não

Se aparecerem pensamentos de se machucar, isso não é uma consulta que se marca para a semana que vem. Procure ajuda hoje.

O que eu faço e o que não faço

Eu ajusto o plano, redistribuo carga para os esportes que não doem, e seguro o calendário junto com você. Não diagnostico, não avalio risco de lesão, não oriento sobre medicação e não

faço acompanhamento de peso. Quando alguma coisa cai desse lado da linha, eu encaminho você. Essa é a regra, e ela não tem exceções.

Mais uma, e ela organiza tudo o que vem a seguir: **diminuir o ritmo, caminhar e parar são decisões com um custo, não fracassos de caráter.** Este guia não vai tratar nenhuma delas como desistência.

Uma palavra do seu treinador

Você treina a sério. Faz as séries, cumpre os longos, acompanha os dados. Chega no dia da prova com o motor construído.

E aí acontece o de sempre: o motor estava bom e a prova saiu ruim.

Durante anos isso foi explicado com a palavra *cabeça*. Que faltou cabeça ao atleta, que ele não foi forte o suficiente, que desistiu. É uma explicação confortável e quase sempre errada. O que acontece numa prova não é um colapso de caráter. **É uma série de decisões tomadas na ordem errada, com informação ruim, e que nunca foram praticadas.**

Os dados são bem claros sobre onde isso acontece. Numa análise de mais de dois milhões de registros de maratona, a queda de ritmo começa em média aos **29,6 km** nos homens e aos **29,3 km** nas mulheres, e se sustenta pelos dez quilômetros seguintes. Acontece com 28% dos homens e 17% das mulheres. Não na largada, onde todo mundo está concentrado. No quilômetro 30, quando você já investiu tudo e o objetivo começa a se afastar.

Essa é a parte da prova para a qual ninguém treina você.

Este guia treina. Não vai dizer que você seja mais forte. Vai te dar o plano escrito, as três metas, o teto de ritmo dos primeiros quilômetros e — acima de tudo — **o procedimento para decidir no quilômetro 30**: seguir, baixar de meta, caminhar ou parar.

Uma regra só organiza todo o resto:

Nada é decidido pela primeira vez no quilômetro 30.

Tudo o que você vai decidir quando estiver vazio, você já decidiu hoje, sentado, com a cabeça limpa. No dia da prova você não pensa. Você executa.

Mãos à obra.

Iván

Founder & Head Coach, Triaperformance

1. Suas três metas: A, B e C

Este é o exercício mais importante do guia. Se você fizer só um, faça este.

A maioria dos atletas chega à largada com **uma** meta. Um número. E esse número tem uma propriedade perigosa: ou ele é cumprido, ou é quebrado. Não tem estados intermediários.

Quando esse número se torna impossível — e em uma maratona a cada quatro ele se torna — o atleta fica sem objetivo no pior momento possível. Não há onde se segurar. É aí que a prova desmonta, e não por falta de pernas: por falta de estrutura.

A correção é simples e precisa ser feita antes da semana de prova, por escrito.

Meta A — o dia perfeito

O tempo que você consegue fazer **se tudo der certo**. Clima bom, sem vento, combustível executado a 100%, sem problema de estômago, sem câibras, com duas noites decentes de sono.

A meta A é condicional e precisa estar escrita com as condições ao lado. Não é "3:15". É: **"3:15, se a temperatura estiver abaixo de 18°, se eu tomar os seis géis, e se eu fizer os primeiros 21k a 4:38."**

Quando você escreve as condições, a meta A deixa de ser uma promessa e vira uma hipótese. E uma hipótese pode ser descartada sem que a prova desabe em cima de você.

Meta B — o dia normal

O tempo que você consegue fazer **num dia comum**. Alguma coisa dá um pouco errado — sempre dá — e mesmo assim você corre bem.

Esta é a meta real. É a que mais se cumpre, a que deve ser treinada, e a que deveria governar o seu ritmo nos primeiros quilômetros. A distância entre A e B costuma ser de 2 a 4%: numa maratona de três horas e meia, entre quatro e oito minutos.

Se, ao escrevê-las, você perceber que A e B estão a trinta segundos uma da outra, você não tem duas metas. Tem uma com dois nomes.

Meta C — o dia ruim

O que você faz quando o dia quebra. Calor extremo, estômago fechado, uma câibra aos 28 km, um ritmo que não aparece.

A meta C não é definida por um tempo. É definida por uma condição que depende só de você: *terminar caminhando e trotando, sem me lesionar, e cruzar a linha*. Ou, numa prova com tempo limite: *passar dentro do corte*.

A meta C é a mais importante das três porque é a única que continua disponível quando as outras duas já morreram. Um atleta com uma meta C escrita não tem uma prova arruinada. Tem uma prova diferente.

A quarta linha: quando hoje não é dia de prova

Embaixo das três metas, escreva uma quarta linha. As condições sob as quais você **não corre**, ou não termina:

*Não largo se estiver com febre ou com uma infecção ativa.
Paro se aparecer qualquer coisa da lista da seção 9.*

Isso não é pessimismo. É o que um piloto faz antes de decolar: os critérios de aborto se definem em terra, não no ar.

Como usar

- **Escreva três a quatro semanas antes**, depois da prova de simulação (seção 4), quando você já tem evidência real do seu ritmo.
- **Leia as três na manhã da prova**, em voz alta se ajudar.
- **Baixe um degrau por vez, nunca dois.** De A vai para B. De B vai para C. Um atleta que pula de A direto para C no quilômetro 30 quase sempre está desistindo, não ajustando.

Isso não é uma técnica mental. É planejamento de objetivos, igualzinho a periodizar um bloco: você define o resultado esperado, define o cenário conservador, e define o piso.

2. Quilômetro 30: quando o plano falha

O resto do guia existe para que você consiga executar esta seção.

Chega um momento em muitas provas longas em que isso acontece: o ritmo está caindo, o objetivo está se afastando, e **você começa a fazer contas sobre desistir.**

Essa conta mental — seguir ou não seguir, quanto falta, o que acontece se eu parar — é o momento que este guia treina. Não é fraqueza e não é falta de caráter: é o que acontece quando você já investiu muito numa meta que deixou de ser alcançável. Acontece com quase todo mundo, e acontece mais ou menos no mesmo lugar.

O que distingue um atleta que resolve bem esse trecho não é aguentar mais. **É ter um procedimento.**

Reconhecer

O sinal é concreto: **você está calculando em vez de correr.**

Quando se pegar fazendo a conta, não continue fazendo no piloto automático. Esse é o ponto em que se entra no procedimento.

E a primeira coisa é nomear as opções, porque são três e não duas:

1. **Sustentar a meta atual**
2. **Baixar um degrau de meta**
3. **Parar**

A maioria dos atletas em crise só enxerga a primeira e a terceira. Essa é a armadilha: transforma uma prova que dava para salvar numa escolha binária entre sofrer e desistir. **A opção 2 existe, é a correta quase sempre, e precisa ser nomeada em voz alta para aparecer.**

As três perguntas

Não decida por sensação. Decida com estas três, nesta ordem. Levam uns vinte segundos.

Pergunta 1 — Tem alguma coisa da lista de parar?

Vá até a lista mais abaixo nesta seção. Se a resposta for sim, não existe pergunta 2. Você para.

Pergunta 2 — Tem alguma coisa que dê para consertar?

A maioria das crises de quilômetro 30 tem uma causa reparável, e o conserto leva de cinco a dez minutos para fazer efeito:

- **Quando foi o seu último gel?** Se faz mais de trinta minutos, a crise pode ser simplesmente fome. Coma alguma coisa agora e se dê dez minutos antes de decidir qualquer coisa.
- **Quando você bebeu?** O mesmo.
- **Você está indo mais rápido do que acha?** Olhe o parcial real, não a sensação.

- **Tem uma câibra ou um incômodo mecânico?** Diminua trinta segundos por quilômetro durante dois quilômetros e reavalie.

Não tome uma decisão grande de estômago vazio. É a regra mais útil desta seção inteira. Um número enorme de desistências são hipoglicemias mal interpretadas como falta de vontade.

Pergunta 3 — Eu sustento este ritmo até o próximo posto?

Não até a chegada. Até o próximo posto de hidratação. Se a resposta for não, o ritmo está errado e precisa baixar — o que, na maior parte das vezes, significa baixar de meta.

Baixar de meta

Baixar de meta não é desistir. É a decisão técnica correta quando mudam as premissas com que você montou o objetivo. Exatamente igual a ajustar o plano da semana porque você ficou doente.

Como se faz, em ordem:

1. **Você baixa um degrau, não dois.** De A para B. De B para C.
2. **Você recalcula o ritmo** para o novo objetivo. Se você está na meta B e faltam 12 km, em que ritmo você precisa ir? Esse é o seu número novo, e ele é mais lento — esse é o ponto.
3. **Você solta o anterior.** Para de olhar o parcial da meta que acabou de descartar. Continuar comparando com um objetivo que não existe mais é a forma mais rápida de transformar um dia ruim numa desistência.
4. **Você volta a segmentar.** Você não corre mais 12 km. Corre até o próximo posto. Ganha aquele trecho, e depois o seguinte.

Segmentar funciona **depois** de você decidir qual é a meta. Ao contrário não: "um quilômetro por vez" sem ter resolvido o que você está perseguindo é só adiar a decisão.

Caminhar

Caminhar não é fracassar. Caminhar é uma ferramenta de ritmo, e a maioria dos atletas amadores usa tarde demais e mal demais.

O que caminhar custa, com números. A 6:00/km, um minuto correndo te dá uns 165 metros. Um minuto caminhando rápido te dá uns 110. Caminhar esse minuto te custa por volta de **vinte segundos**. Faça a conta no seu próprio ritmo e vai ver que quase sempre é menos do que você teme.

O que caminhar compra: batimentos mais baixos, um gel que você realmente consegue engolir, água que entra de verdade em vez de molhar o seu rosto, e — esta é a importante — a capacidade de voltar a correr depois.

As duas formas de caminhar, e só uma serve:

Caminhar por decisão	Caminhar por colapso
Escolhido, com um limite definido antes	Acontece sozinho, quando já não há opção
"Caminho os 30 segundos do posto"	"Não sei quando vou conseguir voltar a correr"
Você volta a trotar no ponto que definiu	A caminhada se estende sozinha
Custa vinte segundos	Custa vinte minutos

Como se faz direito:

- **Caminhe os postos de hidratação.** Todos. Desde o primeiro, não desde o km 30. Trinta segundos caminhando permitem que você beba de verdade, e esse é o objetivo do posto.
- **Se precisar caminhar fora de um posto, coloque um limite antes de começar:** até aquele poste, até contar sessenta, até a curva. O limite se define **antes** do primeiro passo caminhando, não durante.
- **Trotar-caminhar é uma estratégia, não uma derrota.** A partir do km 32, alternar quatro minutos de trote com um de caminhada costuma ser mais rápido — e bem menos miserável — do que a marcha lenta contínua em que muita gente termina.

Quando parar

Esta é a única parte do guia sem nuance, e onde nenhuma meta importa.

Pare imediatamente e procure assistência médica se aparecer qualquer uma destas:

- **Dor aguda e localizada que muda o seu jeito de pisar.** Não incômodo: dor que altera a sua mecânica.
- **Dor óssea focal** — um ponto específico num osso que dói ao apertar.
- **Dor no peito, falta de ar desproporcional ao esforço, ou batimentos irregulares.**
- **Confusão, desorientação, não entender onde você está ou que quilômetro é.** Esta é a mais perigosa porque é a mais difícil de detectar em si mesmo.
- **Tontura com náusea, pele fria, ou parar de suar** em condições de calor.
- **Urina muito escura junto com dor muscular severa.**

Sobre problemas de sódio e hidratação — incluindo hiponatremia, que é grave e é confundida com desidratação — o **Kit de Combustível** tem a seção completa. Não repito aqui porque aquele guia é o que manda nesse assunto.

Três regras em volta desta lista:

1. **Nenhuma meta justifica ignorá-la.** Nem a A, nem a C, nem terminar. Nenhuma.
2. **Se você parar por alguma coisa desta lista, você vai ao médico.** Não "vamos ver como eu acordo". No mesmo dia.
3. **Se você não consegue se avaliar com clareza, essa é a resposta.** Confusão não se autodiagnostica. Se você está duvidando da sua própria capacidade de julgar, já tem o dado.

E uma regra geral que vale para tudo o que é médico, dentro e fora de prova: **eu não diagnostico**. Se qualquer coisa disso aparecer, eu encaminho você e a minha parte termina ali. Isso não é cautela jurídica — é que não é a minha competência.

O tempo limite

Se a sua prova tem cortes, a aritmética se faz **antes**, não correndo.

O que você precisa saber antes de largar:

- Em que quilômetro está cada corte
- A que hora exata ele fecha — normalmente é hora de relógio, não tempo desde a sua largada
- Se o cronômetro corre desde o tiro ou desde que você cruzou o tapete. **Isso muda a conta e muita gente descobre tarde.**

A tabela que você leva junto. Para cada corte, o ritmo médio que você precisa a partir de onde estiver. Escrita, plastificada, ou no verso do número de peito:

Corte no km 30, fecha 14:30 · larguei 9:00 → tenho 5:30 para 30 km → **11:00/km em média**

Se no km 21 meu relógio marca 3:10, sobram 2:20 para 9 km → **15:33/km**. Dá para caminhar.

Esse segundo cálculo é o que salva provas, porque transforma um pânico num número. Muitos atletas desistem num corte que iam passar com folga, simplesmente porque não fizeram a conta.

A regra: se o número de que você precisa é mais lento que a sua caminhada rápida, você segue. Se é mais rápido que o seu ritmo atual e não há margem, você baixa para a meta C e aceita o corte como o objetivo do dia.

3. Modelo — Meu manual de decisões

Entre seis e dez linhas. O gatilho precisa ser algo que você possa ver ou medir.

SE acontecer isto (algo que eu vejo ou meço)	ENTÃO eu faço isto (uma ação concreta)

Isto é uma parte do guia completo

O Guia de Execução completo acrescenta o plano de prova escrito, o teto de ritmo dos primeiros quilômetros, onde colocar a atenção conforme a intensidade, a semana da prova, o debrief e quatro modelos para imprimir. Está dentro do Triaperformance All-Access, junto com o resto da biblioteca.

Ver All-Access →

Prefere que a gente adapte isso à sua prova? Me escreva. coach@triaperformance.com · [WhatsApp](#)