

GUIA TRIAPERFORMANCE

Como alimentar seus treinos longos

A fórmula do pré-treino, quantos gramas por hora, e como treinar o intestino para tolerá-los

Quatro seções do Kit de Combustível da Triaperformance: o que comer antes, quanto colocar por hora conforme a duração e o esporte, como subir essa quantidade sem arrebentar o estômago, e o que fazer no dia em que ele fechar assim mesmo.

O que esta guia cobre

Isto é material de treinamento. Não é orientação médica nem aconselhamento nutricional individual.

Cobre uma única coisa, e cobre por completo: **como alimentar suas sessões e suas provas.**

Não cobre dietas, perda de peso, composição corporal nem suplementação. Não porque isso não importe, mas porque não é o meu trabalho. Sou seu treinador, não seu nutricionista, e essa diferença não é um detalhe técnico: é a linha entre o que posso defender com a minha experiência e o que exige registro profissional.

Converse com seu médico ou com um nutricionista registrado antes de aplicar qualquer coisa daqui se você:

- Tem diabetes de qualquer tipo
- Tem doença celíaca, síndrome do intestino irritável ou outra condição digestiva
- Tem hipertensão ou doença renal
- Está grávida ou tentando engravidar
- Usa medicação de forma regular
- Tem histórico de transtornos alimentares
- Tem menos de 18 anos

Nada do que vem a seguir foi escrito para essas situações sem acompanhamento profissional.

Mensagem do treinador

Você treina sério. Levanta antes do sol, fecha as séries mesmo quando queimam, passa horas no selim. Você está construindo um motor.

O problema é que a maioria dos atletas que eu treino chega com o motor bem construído e o combustível improvisado. Ensaiam o ritmo, ensaiam a cadência, ensaiam a transição. A alimentação fica decidida na véspera.

Esta guia existe para fechar essa lacuna. Ela não vai te dizer como comer no dia a dia. Vai te dizer **quanto, quando e de que forma colocar combustível dentro e ao redor das suas sessões**, com números que você aplica amanhã.

Uma regra organiza todo o resto: **o intestino é treinável, e nada se estreia no dia da prova.**

O atleta que ensaia a alimentação com a mesma disciplina dos intervalados para de sobreviver às provas e começa a competi-las.

Mãos à obra.

Iván

Founder & Head Coach, Triaperformance

1. Antes da sessão

A regra: um grama por quilo, por hora que faltar

É a única fórmula que vale memorizar.

Carboidrato (g) = seu peso (kg) × horas até a largada

Um atleta de 70 kg:

Tempo até o início	Carboidrato	Exemplo
3–4 horas	210–280 g	Arroz branco com frango e uma fruta; tigela grande de aveia com banana e mel
2 horas	140 g	Sanduíche de peito de peru em pão branco + banana; tigela de cereal com leite desnatado
1 hora	70 g	Duas fatias de pão branco com geleia; bebida esportiva
30 minutos	35 g	Um gel com água; meia banana madura; sachê de purê de fruta

Quanto mais perto da largada, menos fibra e menos gordura. Os dois atrasam o esvaziamento gástrico, e o que ainda estiver no seu estômago quando o esforço começar é o que estraga a sessão.

A janela que vale evitar

Se você vai tomar carboidrato antes de um esforço intenso, faça isso **mais de 60 minutos antes** ou **nos últimos 10–15 minutos**. O meio do caminho — entre 30 e 45 minutos antes — é onde alguns atletas sentem uma queda de energia nos primeiros quilômetros.

Não acontece com todo mundo, e um bom aquecimento reduz o efeito. Mas se você já largou uma prova se sentindo vazio depois de um café da manhã correto, esse é o motivo mais provável, e a correção é de graça: mude a hora do gel.

Treinar em jejum

Serve, e serve para uma coisa específica: **trabalho aeróbico leve e curto**. Aí é uma ferramenta legítima.

Para qualquer sessão com intensidade, treinar sem combustível vai limitar seu ritmo e não vai te dar nenhuma adaptação que você não consiga alimentado. Essa questão não está encerrada na literatura — existem protocolos sérios de "treinar baixo" usados no alto rendimento — mas para um atleta com trabalho, família e 8 a 12 horas semanais, o custo supera o retorno.

Regra simples: jejum só em rodagens leves. Todo o resto vai alimentado.

2. Durante a sessão

É aqui que a sessão longa se ganha ou se perde. E é aqui que a maioria dos atletas fica aquém.

A escada: quanto por hora

Duração	Meta por hora	Observação
Menos de 45 min	Nada	Água se estiver calor.
45–75 min em alta intensidade	Bochecho, ou 15–30 g	O benefício é do sistema nervoso, não do músculo. Bochechar bebida esportiva por 5–10 segundos e cuspir já funciona.
1–2 horas	30–60 g	
2–3 horas	60–90 g	Você vai precisar misturar fontes. Veja abaixo.
Mais de 3 horas	90 g, e até 120 g na bike	Só com o intestino treinado.

O teto muda conforme a modalidade

Quase nenhuma guia separa isso, e é a diferença entre um plano que funciona e um que te deixa vomitando no quilômetro 30.

Modalidade	Teto prático	Por quê
Bike	100–120 g/h	Sem impacto, você está sentado, o estômago tolera mais.
Corrida	60 g/h de base, até 90 g/h com intestino treinado	Impacto e postura reduzem a tolerância.
Natação	Não se aplica	Não dá para comer nadando. Isso se resolve antes de entrar na água.

Comece cedo. Aos 20–30 minutos, não quando sentir fome. Quando a fome aparece numa sessão longa você já está atrasado, e recuperar terreno com o estômago comprometido quase nunca dá certo.

Acima de 60 g/h você precisa de dois açúcares

Seu intestino absorve glicose por um transportador e frutose por outro. A via da glicose satura perto de 60 g/h. Se você tentar passar disso com um açúcar só, o excedente fica no intestino e causa problema.

Procure produtos que combinem glicose (ou maltodextrina) e frutose numa proporção perto de 1:0,8. Está no rótulo de qualquer produto moderno. Com um açúcar só, seu teto real é 60 g/h por mais que você treine.

O que usar

Contexto	Opções
Corrida, ou alta intensidade	Géis, jujubas, bebida esportiva. Digestão imediata.
Bike, intensidade estável	Tudo acima, mais barrinhas, banana, batata cozida com sal, bolinho de arroz prensado.
Últimos 20 min antes de correr	Só líquido. Esvazie o estômago antes de descer da bike.

Conte em gramas, não em unidades. Gel não é medida: varia de 20 g a 40 g conforme a marca. Leia o rótulo uma vez, anote o número e monte seu plano em gramas. "Três géis por hora" não significa nada; "75 gramas por hora" significa.

3. Treine seu intestino

Esta é a seção mais importante da guia.

Você pode saber exatamente de quantos gramas precisa e mesmo assim não conseguir absorvê-los, porque a capacidade do seu intestino de processar carboidrato durante o exercício **é treinável, igual ao motor**. Um atleta que nunca passou de 40 g/h no treino não vai tolerar 90 g/h no dia da prova. Vai tolerar náusea.

Um aviso honesto: a evidência sobre o mecanismo exato é mais frágil do que costuma ser apresentada, e os estudos não são totalmente consistentes. O que é consistente — e qualquer pessoa que treine atletas de longa distância confirma — é que **a prática repetida reduz os sintomas e aumenta a quantidade que você tolera**. Isso basta para construir um protocolo.

O bloco de 6 semanas

Faça **apenas na sessão longa ou específica da semana**. Nunca numa rodagem regenerativa: ali não serve para nada e ainda te deixa pesado sem contrapartida.

Semanas	Meta por hora	Como
1–2	30–40 g/h	Um produto só. O que você vai usar na prova.
3–4	60 g/h	Acrescente a segunda fonte (glicose + frutose).
5–6	80–90 g/h correndo · 100–120 g/h na bike	Em ritmo de prova, com os produtos da prova.

As quatro regras do bloco

1. **Uma variável por vez.** Se aumentar a quantidade, não troque a marca naquela semana.
2. **Anote os sintomas de 1 a 10** depois de cada sessão longa. Inchaço, náusea, cólica, urgência.
3. **Acima de 5, você fica mais uma semana naquela dose.** Não avança. O bloco se estica; não se força.
4. **Em ritmo de prova, não em ritmo leve.** Tolerar 90 g/h trotando não diz nada sobre tolerar em ritmo de maratona. O sangue que digere é o mesmo que move as pernas.

Quando recuar

Vômito, cólica que te obriga a parar, ou diarreia no meio da sessão: **desça um degrau e fique ali duas semanas**. Não é o plano falhando, é informação. Seu teto de hoje está um passo abaixo do que você testou.

E a regra que resume tudo

Nada novo no dia da prova. Nem marca, nem sabor, nem concentração, nem horário de café da manhã. Se você vai usar gel de uma marca no seu Ironman, treina com ele meses antes.

4. Quando o estômago fecha

Vai acontecer. A pergunta não é se, é o que você faz.

Diagnóstico, depois da sessão

Se você terminou com diarreia ou desconforto digestivo, há duas causas prováveis e elas se distinguem fácil:

- 1. Tolerância ao produto.** Normalmente você já sabe: uma marca ou um sabor específico sempre te cai mal. Troque e siga.
- 2. Concentração contra velocidade de ingestão.** A mais comum, e a que ninguém calcula. **Recalcule os gramas pelos minutos reais em que você os consumiu**, não pela hora inteira. Se tomou 90 g em 20 minutos, seu intestino não recebeu 90 g/h: recebeu o equivalente a 270 g/h naquele intervalo. A correção é diluir mais, ou distribuir melhor.

No meio da prova

Quando o estômago fecha, nesta ordem:

- 1. Reduza a intensidade.** É a única coisa que devolve fluxo sanguíneo ao intestino. Não é negociável, e vem primeiro.
- 2. Abandone os sólidos.** Passe para líquido.
- 3. Dilua.** Mais água para a mesma quantidade de carboidrato.
- 4. Corte a cafeína** pelo resto da prova.
- 5. Caminhe nos postos de hidratação.** Engolir correndo piora tudo.
- 6. Reduza a meta por hora** e aceite ir com menos. Terminar com 40 g/h é melhor do que abandonar com 90.

Quando assentar, volte a subir aos poucos. Não tente recuperar o que deixou de comer: não se recupera, e a tentativa é o que provoca o segundo episódio.

E o que eu digo aos meus atletas: vai acontecer na prova? Vai. É por isso que a gente treina isso.

Isto é um quarto do guia completo

O Kit de Combustível completo acrescenta hidratação e sódio, cafeína, carga de carboidratos, calor e altitude, e um modelo de prova para nove distâncias. Está dentro do Triaperformance All-Access, junto com o resto da biblioteca.

[Ver All-Access →](#)

Prefere que a gente adapte isso à sua prova? Me escreva. coach@triaperformance.com · [WhatsApp](#)