

MPP02_Problem_svojstvenih_vrijednosti_i_SLP

October 19, 2017

1 Problem svojstvenih vrijednosti i SLP

1.1 Matrični problem svojstvenih vrijednosti

Neka je $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ kvadratna realna matrica.

Tražimo **svojstvene vrijednosti** $\lambda \in \mathbb{R}$ i **svojstvene vektore** $x \in \mathbb{R}^n \neq 0$, takve da je

$$Ax = \lambda x.$$

Dakle, A djeluje na vektor x tako da ga produži ili skрати, eventualno promijeni orijentaciju, dok smjer ostaje isti.

Vrijedi

$$Ax - \lambda Ix = (A - \lambda I)x = 0.$$

Ovo je homogeni sustav linearnih jednadžbi koji ima netrivialna rješenja ($x \neq 0$) ako i samo ako je matrica sustava $(A - \lambda I)$ singularna, odnosno ako i samo ako je

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Ovo je polinom stupnja n u varijabli λ s realnim koeficijentima, koji, po osnovnom teoremu algebre, ima n nultočaka koje su ili realne ili dolaze u konjugirano kompleksnim parovima.

Teorem. Svojstveni vektori koji odgovaraju različitim svojstvenim vrijednostima su linearno nezavisni.

Dokaz: Zaista, neka je

$$Ax = \lambda x, \quad Ay = \mu y, \quad x, y \neq 0, \quad \lambda \neq \mu.$$

Pretpostavimo da su x i y linearno zavisni, odnosno,

$$\alpha x + \beta y, \quad |\alpha| + |\beta| > 0.$$

Vrijedi

$$A \cdot (\alpha x + \beta y) = \alpha \lambda x + \beta \mu y = A \cdot 0 = 0.$$

Množenje prve jednakosti s λ daje sustav

$$\begin{aligned}\lambda\alpha x + \lambda\beta y &= 0 \\ \alpha\lambda x + \beta\mu y &= 0.\end{aligned}$$

Oduzimanje prve jednadžbu od druge daje

$$\beta(\mu - \lambda)y = 0$$

pa je, zbog $\mu - \lambda \neq 0$ i $y \neq 0$, nužno $\beta = 0$. Uvrštavanjem u originalnu linearnu kombinaciju, zbog $x \neq 0$ slijedi $\alpha = 0$ pa su x i y linearno nezavisni.

Teorem. Ako je A simetrična matrica, $A = A^T$, tada su sve svojstvene vrijednosti realne i imaju ortogonalni skup svojstvenih vektora, odnosno postoji matrica U takva da je

$$U^T U = U U^T = I A = U \Lambda U^T, \quad A U = U \Lambda, \quad A = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i u_i^T.$$

In [43]: # Primjer

```
A=Symmetric(rand(-8:8,6,6))
```

Out [43]: 6×6 Symmetric{Int64,Array{Int64,2}}:

```
-7  6  -8  -4   0   6
 6  8   5   7   7   0
-8  5   4  -5   3   6
-4  7  -5   3  -7  -6
 0  7   3  -7  -1   0
 6  0   6  -6   0   6
```

In [44]: $\lambda, U = \text{eig}(A)$

Out [44]: $([-18.9381, -9.9433, 2.98192, 6.74406, 14.3287, 17.8267], [0.683217 \ -0.335871 \ \dots \ 0.0660323 \ -0.10183 \ -0.22692 \ -0.517302 \ 0.485577 \ -0.347346 \ -0.560448])$

In [45]: λ

Out [45]: 6-element Array{Float64,1}:

```
-18.9381
-9.9433
 2.98192
 6.74406
14.3287
17.8267
```

In [46]: U

Out [46]: 6×6 Array{Float64,2}:

```
0.683217 -0.335871 0.0755598 0.632428 0.0660323 -0.10183
-0.381708 -0.246295 -0.00899145 0.157673 0.846879 -0.22692
0.418296 -0.244523 -0.276391 -0.641983 0.0954024 -0.517302
0.363632 0.459459 -0.479116 -0.0586546 0.433464 0.485577
0.220898 0.634424 0.618219 -0.0531574 0.207461 -0.347346
-0.177531 0.391332 -0.553236 0.395937 -0.195969 -0.560448
```

```
In [47]: U'*U
```

```
Out[47]: 6×6 Array{Float64,2}:
 1.0      -5.26043e-16 -2.6124e-16 ... -7.09367e-17 2.07645e-16
-5.26043e-16 1.0      -1.66434e-16      4.75438e-17 3.38965e-16
-2.6124e-16 -1.66434e-16 1.0      2.49002e-18 4.02315e-16
 1.87856e-16 8.86391e-17 9.31361e-16 -5.68134e-16 1.33724e-16
-7.09367e-17 4.75438e-17 2.49002e-18 1.0      6.40281e-17
 2.07645e-16 3.38965e-16 4.02315e-16 ... 6.40281e-17 1.0
```

```
In [48]: U*U'
```

```
Out[48]: 6×6 Array{Float64,2}:
 1.0      -3.8976e-16 -6.47721e-17 ... -6.42835e-17 -3.70698e-16
-3.8976e-16 1.0      3.78523e-16      3.58119e-16 -2.11454e-16
-6.47721e-17 3.78523e-16 1.0      -5.82141e-16 3.00969e-16
-3.56237e-16 -2.97497e-17 1.95424e-16 7.90006e-17 -3.00248e-16
-6.42835e-17 3.58119e-16 -5.82141e-16 1.0      1.88406e-16
-3.70698e-16 -2.11454e-16 3.00969e-16 ... 1.88406e-16 1.0
```

```
In [49]: U*diagm(λ)*U'
```

```
Out[49]: 6×6 Array{Float64,2}:
-7.0      6.0      -8.0 -4.0 1.84951e-14 6.0
 6.0      8.0      5.0 7.0 7.0      -8.23788e-16
-8.0      5.0      4.0 -5.0 3.0      6.0
-4.0      7.0      -5.0 3.0 -7.0      -6.0
 1.8385e-14 7.0      3.0 -7.0 -1.0      -5.30606e-16
 6.0      -7.95734e-16 6.0 -6.0 -5.67657e-16 6.0
```

```
In [50]: sum([λ[i]*U[:,i]*U[:,i]' for i=1:size(A,1)])
```

```
Out[50]: 6×6 Array{Float64,2}:
-7.0      6.0      -8.0 -4.0 1.83187e-14 6.0
 6.0      8.0      5.0 7.0 7.0      -8.88178e-16
-8.0      5.0      4.0 -5.0 3.0      6.0
-4.0      7.0      -5.0 3.0 -7.0      -6.0
 1.83187e-14 7.0      3.0 -7.0 -1.0      -4.44089e-16
 6.0      -8.88178e-16 6.0 -6.0 -4.44089e-16 6.0
```

1.1.1 Primjer - rješavanje algebarskih problema pomoću svojstvenih vrijednosti i vektora

Riješimo problem (prema [Logan, Applied Mathematics, str. 205](#))

$$Ax = \mu x + f.$$

Neka je A simetrična, $A = U\Lambda U^T$ i $\mu \neq \lambda_i$. Stupci matrice U su ortogonalni i tvore bazu n -dimenzionalnog prostora, odnosno svaki vektor se može prikazati kao njihova linearna kombinacija:

$$x = \sum_{i=1}^n c_i u_i, \quad f = \sum_{i=1}^n f_i u_i.$$

Imamo

$$A \cdot \left(\sum c_i u_i \right) = \mu \left(\sum c_i u_i \right) + \sum f_i u_i,$$

odnosno,

$$\sum c_i \lambda_i u_i = \mu \left(\sum c_i u_i \right) + \sum f_i u_i.$$

Izjednačavanje koeficijenata daje

$$c_i \lambda_i = \mu c_i + f_i$$

pa je

$$c_i = \frac{f_i}{\lambda_i - \mu}.$$

Riješimo problem $Ax = \mu x + f$, gdje je $\mu = 2$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & 10 \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

```
In [51]: μ=2
         A=[1 2 3 4;2 5 6 7;3 6 8 9;4 7 9 10]
         f=[1;2;1;2]
```

```
Out[51]: 4-element Array{Int64,1}:
          1
          2
          1
          2
```

```
In [52]: λ,U=eig(A)
```

```
Out[52]: ([-0.805485, 0.184914, 0.558036, 24.0625], [-0.725314 0.329765 -0.56047 -0.225938; -0.3
```

```
In [53]: # Izračunajmo koeficijente od f u bazi U
         fU=[f·U[:,i] for i=1:4]
```

```
Out[53]: 4-element Array{Float64,1}:
          -0.317782
           0.913253
           0.368942
          -2.98812
```

```
In [54]: c=fU./(λ-μ)
```

```

Out [54]: 4-element Array{Float64,1}:
          0.113272
         -0.503146
         -0.255861
         -0.135439

In [55]: x=sum([c[i]*U[:,i] for i=1:4])

Out [55]: 4-element Array{Float64,1}:
         -0.0740741
         -0.333333
          0.481481
          0.037037

In [56]: # Provjera
          A*x-μ*x-f

Out [56]: 4-element Array{Float64,1}:
        -6.66134e-16
        -4.44089e-16
        -1.44329e-15
          0.0

```

1.2 Linearni operatori

Operator je preslikavnje $L : X \rightarrow X$ gdje je X vektorski prostor.

Neka su $x, y \in X$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Operator je **linearan** ako je **aditivan**,

$$L(x + y) = L(x) + L(y),$$

i **homogen**,

$$L(\alpha x) = \alpha L(x).$$

Oba svojstva zajedno možemo pisati kao

$$L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y).$$

1.2.1 Primjer - matrica je linearni operator na skupu vektora

Uz definiciju

$$A(x) \equiv A \cdot x,$$

vrijedi

$$A(x + y) = A(x) + A(y), \quad A(\alpha x) = \alpha A(x),$$

odnosno

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y).$$

1.3 Skalarni produkt, norma, ortogonalnost i baza

Neka su zadani vektori $x, y \in \mathbb{R}^n$. Definiramo sljedeće:

Skalarni produkt: $(x, y) = x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Norma: $\|x\| = \sqrt{(x, x)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i x_i} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Ortogonalnost: $x \perp y \Leftrightarrow (x, y) = 0$

Baza: Skup od n vektora, x_1, x_2, \dots, x_n je **potpun** (baza) ako za svaki vektor y vrijedi

$$y = \sum_{i=1}^n \xi_i x_i.$$

Ukoliko su, dodatno, vektori x_i međusobno ortogonalni, tada je

$$\xi_j = \frac{(y, x_j)}{(x_j, x_j)} \equiv \frac{(y, x_j)}{\|x_j\|^2}.$$

```
In [57]: # Primjer za vektore - ortogonalnost i norma
         U[:,1]·U[:,3], U[:,3]·U[:,3]
```

```
Out[57]: (5.551115123125783e-17, 1.0000000000000004)
```

```
In [58]: # Baza
         n=size(A,1)
         x=rand(n)
         # Računamo koeficijente po bazi stupaca od U
         ξ=Array{Float64}(n)
         for i=1:n
             ξ[i]=x·U[:,i]
         end
         # Proujera
         y=sum([ξ[i]*U[:,i] for i=1:n])
         [x y]
```

```
Out[58]: 4×2 Array{Float64,2}:
          0.180746    0.180746
          0.301728    0.301728
          0.00980711  0.00980711
          0.696575    0.696575
```

1.3.1 Primjer - vektorski prostor funkcija

Neka su zadane funkcije $f, g \in C[a, b]$, gdje je $C[a, b]$ skup svih funkcija neprekidnih na intervalu $[a, b]$.

Napomena. Umjesto skupa $C[a, b]$ može se uzeti i neki skup, na primjer, skup svih kvadratno integrabilnih funkcija na intervalu $[a, b]$, $L^2[a, b]$.

Definirajmo **skalarni produkt**:

$$(f, g) = f \cdot g = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Odavde slijede sljedeće definicije:

norma: $\|f\| = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\int_a^b f(x) \cdot f(x) dx} = \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx}$

ortogonalnost: $f \perp g \Leftrightarrow (f, g) = 0$

baza: Skup od ∞ funkcija, f_1, f_2, \dots je **potpun** (baza) ako za svaku funkciju g vrijedi

$$g(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \xi_i f_i(x).$$

Ukoliko su, dodatno, funkcije f_i međusobno ortogonalne, tada je

$$\xi_j = \frac{(y, f_j)}{(f_j, f_j)} \equiv \frac{(y, f_j)}{\|f_j\|^2}.$$

1.3.2 Numeričko računanje

Julia ima više paketa pomoću kojih možemo računati određene integrale.

Najjednostavnija je funkcija `quadgk()` iz paketa [QuadGK.jl](#) (`th/QuadGK.jl`).

Mi ćemo za definiranje skalarnog produkta koristiti funkciju `integrate()` iz paketa `SymPy.jl`.

```
In [59]: # Učitavanje paketa
          using SymPy
```

```
In [60]: ?integrate
```

```
search: integrate deltaintegrate trigintegrate line_integrate Integral
```

Out[60]:

The `integrate` function has its limits specified with tuples of the type `(var, a, b)`. This provides a simpler interface for one-dimensional integrals: `integrate(ex, var, a, b)`

Symbolically integrate a function

Symbolically integrate a function over `[a, b]`

`integrate`: a SymPy function. The SymPy documentation can be found through:

<http://docs.sympy.org/latest/search.html?q=integrate>

Specific docs may also be found at [SymPy Docs for matrices](#)

`integrate`: a SymPy function. The SymPy documentation can be found through:

<http://docs.sympy.org/latest/search.html?q=integrate>

```
In [61]: # Definirajmo skalarni produkt
          import Base
          ·(f,g,a,b)=integrate(f*g,(x,a,b))
```

Out[61]: dot (generic function with 12 methods)

1.3.3 Primjer - Fourierov red

Promotrimo periodične funkcije s periodom 2π na intervalu $[-\pi, \pi]$.

Funkcije

$$1, \sin x, \cos x, \sin(2x), \cos(2x), \sin(3x), \cos(3x), \dots$$

su međusobno ortogonalne, Vrijedi $\|1\| = \sqrt{2\pi}$, a norma svih ostalih funkcija je $\sqrt{\pi}$. Skup je potpun, odnosno svaka periodična funkcija f se može prikazati kao

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i f_i(x), \quad \zeta_i = \frac{(f, f_i)}{(f_i, f_i)},$$

u smislu teorema o konvergenciji Fourierovog reda. Ovo su standardne formule za razvoj funkcije u Fourierov red.

```
In [62]: # Definirajmo simboličku varijablu x
x=Sym("x")
```

Out [62]:

$$x$$

```
In [63]: ·(sin(x), sin(x), -π, π), ·(sin(2*x), cos(3*x), -π, π)
```

Out [63]: (3.14159265358979, 0)

```
In [64]: m,n = symbols("m,n", integer=True, positive=True)
```

Out [64]: (m, n)

```
In [65]: ·(sin(m*x), sin(n*x), -PI, PI)
```

Out [65]:

$$\begin{cases} \pi & \text{for } m = n \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Razvijmo funkciju definiranu formulom $f(x) = x^2$ na intervalu $[-1, 1]$ u Fourier-ov red.

```
In [66]: f=x^2
```

Out [66]:

$$x^2$$

```
In [67]: f0=x/x
```

Out [67]:

$$1$$

In [68]: $\cdot(f_0, f_0, -1, 1)$

Out[68]:

$$2$$

In [69]: $a_0 = \cdot(f, f_0, -1, 1) / \cdot(f_0, f_0, -1, 1)$

Out[69]:

$$\frac{1}{3}$$

In [70]: *# Funkcija je parna pa imamo smao članove uz kosinuse*
 $an = \cdot(f, \cos(n \cdot \text{PI} \cdot x), -1, 1) / \cdot(\cos(n \cdot \text{PI} \cdot x), \cos(n \cdot \text{PI} \cdot x), -1, 1)$

Out[70]:

$$\frac{4(-1)^n}{\pi^2 n^2}$$

1.4 Diferencijalni problem svojstvenih vrijednosti

Skup $C^2[a, b]$ je skup svih funkcija koje na intervalu $[a, b]$ imaju dvije neprekidne derivacije.

Operator druge derivacije $A \equiv \frac{d^2}{dx^2}$ je linearan operator.

1.4.1 Primjer

Riješimo problem svojstvenih vrijednosti

$$\frac{d^2}{dx^2} \Phi = \lambda \Phi, \quad 0 < x < l, \quad \Phi(0) = \Phi(l) = 0.$$

Razlikujemo slučajeve $\lambda = 0$, $\lambda < 0$ i $\lambda > 0$.

Slučaj $\lambda = 0$.

Vrijedi $\Phi(x) = ax + b$. Iz rubnog uvjeta $\Phi(0) = 0$ slijedi $b = 0$ pa je $\Phi(x) = ax$. Iz rubnog uvjeta $\Phi(l) = 0$ slijedi $al = 0$ pa je i $a = 0$. Dakle, $\Phi(x) = 0$, što ne može biti svojstvena funkcija, pa $\lambda = 0$ nije svojstvena vrijednost.

Slučaj $\lambda > 0$.

Vrijedi (vidi [Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima](#))

$$\Phi(x) = ae^{\sqrt{\lambda}x} + be^{-\sqrt{\lambda}x}.$$

Iz rubnog uvjeta $\Phi(0) = 0$ slijedi $a + b = 0$ pa je $b = -a$.

Iz rubnog uvjeta $\Phi(l) = 0$ slijedi

$$a(e^{\sqrt{\lambda}l} - e^{-\sqrt{\lambda}l}) = 0$$

pa je $a = 0$. Dakle, $\Phi(x) = 0$, što ne može biti svojstvena funkcija, pa niti jedna $\lambda > 0$ nije svojstvena vrijednost.

Slučaj $\lambda < 0$.

Vrijedi

$$\Phi(x) = a \sin(\sqrt{-\lambda}x) + b \cos(\sqrt{-\lambda}x).$$

Iz rubnog uvjeta $\Phi(0) = 0$ slijedi $b = 0$ pa je $\Phi(x) = a \sin(\sqrt{-\lambda}x)$.

Iz rubnog uvjeta $\Phi(l) = 0$ slijedi

$$a \sin(\sqrt{-\lambda}l) = 0$$

pa je ili $a = 0$, što opet ne daje svojstvenu funkciju, ili

$$\sqrt{-\lambda}l = n\pi, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dakle, svojstvene vrijednosti su

$$\lambda_n = -\frac{n^2\pi^2}{l^2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

a pripadne svojstvene funkcije su

$$\Phi_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right).$$

Funkcije $\Phi_n(x)$ su međusobno ortogonalne i čine bazu promatranog prostora.

1.5 Regularni Sturm-Liouvilleov problem (SLP)

Problem glasi:

$$\begin{aligned} A(\Phi) &\equiv -(p(x)\Phi')' + q(x)\Phi = \lambda\Phi, \quad a \leq x \leq b, \\ \alpha_1\Phi(a) + \alpha_2\Phi'(a) &= 0, \\ \beta_1\Phi(b) + \beta_2\Phi'(b) &= 0, \end{aligned}$$

gdje je

$$\Phi \in C^2[a, b], \quad p \in C^1[a, b], \quad q \in C^0[a, b], \quad \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{R}.$$

Operator A je linearan (provjerite!).

Teorem. Za regularni SLP vrijedi:

1. Postoji beskonačno mnogo svojstvenih vrijednosti λ_n , $n = 1, 2, 3, \dots$, koje su sve realne i vrijedi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\lambda_n| = \infty.$$

2. Svojstvene funkcije koje odgovaraju različitim svojstvenim vrijednostima su ortogonalne.
3. Skup svih svojstvenih funkcija $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \dots$ je potpun u smislu da se svaka funkcija $f \in L^2[a, b]$ može razviti u red

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \zeta_n \Phi_n(x), \quad \zeta_n = \frac{(f, \Phi_n)}{(\Phi_n, \Phi_n)}$$

koji konvergira u $L^2[a, b]$.

Konvergencija u $L^2[a, b]$ znači

$$\|f - \sum_{n=1}^N \xi_n \Phi_n\| \equiv \int_a^b (f - \sum_{n=1}^N \xi_n \Phi_n)^2 dx \rightarrow 0 \quad \text{kada } N \rightarrow \infty.$$

Na primjer, teorem vrijedi za regularni SLP iz prethodnog primjera, gdje je

$$p(x) = -1, \quad q(x) = 0, \quad a = 0, \quad b = l, \quad \alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = 0, \quad \beta_1 = 1, \quad \beta_2 = 0.$$

Dokaz 2. tvrdnje (prema [Logan, Applied Mathematics, str. 209](#))

Neka su λ i μ dvije različite svojstvene vrijednosti sa svojstvenim funkcijama ϕ i ψ , redom. Tada vrijedi

$$\begin{aligned} -(p\phi')' + q\phi &= \lambda\phi, \\ -(p\psi')' + q\psi &= \mu\psi. \end{aligned}$$

Pomnožimo prvu jednadžbu sa ψ i drugu sa ϕ te ih oduzmimo:

$$\phi(p\psi')' - \psi(p\phi')' = (\lambda - \mu)\phi\psi.$$

Integriranje od a do b daje

$$\int_a^b (\phi(p\psi')' - \psi(p\phi')') dx = (\lambda - \mu)(\phi, \psi).$$

Parcijalna integracija daje

$$\int_a^b \phi(p\psi')' dx = \left\{ \begin{array}{l} u = \phi, \quad du = \phi' dx \\ dv = (p\psi')' dx, \quad v = p\psi' \end{array} \right\} = \phi(p\psi')|_a^b - \int_a^b p\psi'\phi'q dx,$$

i, slično,

$$\int_a^b \psi(p\phi')' dx = \psi(p\phi')|_a^b - \int_a^b p\psi'\phi'q dx.$$

Dakle,

$$p(\phi\psi' - \psi\phi')|_a^b = (\lambda - \mu)(\phi, \psi).$$

Iz rubnih uvjeta slijedi da je lijeva strana jednaka nuli: na primjer, ako su sva dijeljenja definirana, tada je

$$\frac{\phi(a)}{\phi'(a)} = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{\psi(a)}{\psi'(a)}$$

pa je $\phi(a)\psi'(a) - \phi'(a)\psi(a) = 0$. Slično se analiziraju i ostali slučajevi.

Dakle,

$$0 = (\lambda - \mu)(\phi, \psi).$$

Ako je $\lambda \neq \mu$, onda je $(\phi, \psi) = 0$, odnosno, $\phi \perp \psi$.

Primjere rješavanja regularnog SLP ćemo dati kasnije.

```
In [ ]:
```